



MED.  
13383

60-6-13

~~60-6-13~~



A 616.1/9

D E

CURANDIS HOMINUM MORBIS . 2.

E P I T O M E

PRÆLECTIONIBUS ACADEMICIS DICATA

AUCTORE

IOANNE PETRO FRANK

IAC. CARR. ET REG. AP. MAJ. A CONN. MAGISTRATUS POLITICI ET OECONOM. MEDIOLAN. FACULTATIS MEDICAE AC NOSOCOMIORUM PER INSUBRIAM AUSTR. PRÆSIDENT, NENOCOMII PAVIENS. AD S. MATTH. MODERATOR, THERAPIÆ SPEC. ET CLINICUS IN TRIENSI ACADEMIA PROFESSOR P. ET O. ACADEMIÆ REG. SCIENTIAR. GOETTING. MANTUANÆ, ET ELECT. MOGUNT. TUM SOCIET. PATRIOT. MINOL. ET MEDIC. HELVET. SOCI.

\*\*\*\*\*

EDITIO SECUNDA.

LIBER V.  
DE PROFLUENTIBUS  
PARTE I.



V E N E T I I S

.....

MDCCLXVII





---

D E


CURANDIS PROFLUVIIS

*LIBRI I. PARS I.*

---

A 3





## CLASSIS QUINTA.

### PROFLUVIA.



#### GENERALIA DE PROFLUVIIS.

\*\*\*\*\*

§. 463. **S**ub statu valetudinis perfectae, ha- <sup>tempus</sup> <sup>est.</sup>   
 mori in animalium jam maturum reducitur,   
 illi per circulum vitalem absorpti in vasa   
 ut generis, aut singula ad partes, decurrunt,   
 ut ab his vel continentibus hinc, vel excep-   
 ti, commotionem ad fontem revolvantur; illi   
 ad certos nervos hinc exhalati, attriti, mox   
 populos in unum colliguntur; mox, ob conti-

nas accubantes, sine quavis interruptione, per opportunos canales præfixa in loca distillant; nam, artificio mirabili, qui medius effluunt, colliguntur ad metas coacti, cum impetu præfluunt; alii vel invidiosæ ac superflui, vel ob metas, quas distans detenti, acriores, intereunt, a sanis separari, — hic, vapores sub forma, atmospheræ continuæ retinetur, — illæ, communes in alveas guttulas deponi, et ab his vel, a mole excitatis, percolari caveri; vel, inchoatè quædam actione stimulatis, sine ulla expellendi abesse.

Sed et illum, quæ necesse patitur in animalium naturam converti ex, ac rube alimentari includitur, amissionem naturam, ut corpori nutrimento esse quæ, tam venaleculo, cum intensius certo temporis intervallo detineri, ac resorptionem vasorum autem corpori operari; atque in ipsis humorum ciborumque secretariis e corpore eliminandis natura nequidquam fertur, sed partem internam, incongruos necessitates animalis ad oculum, dicit præceditur formidat sibi ipsi contrariis, et cæcæ, ac citius, et indolere voluerunt, cæcæ excretionem ad oculum consistit.

§. 464. Quodcumque vasa aut solidiorum  
 membrorum, aut dementia, quiescentia con-  
 stant in his specie fluidi, aut unumque ex vi-  
 cio, vel citius, abstinere, quam per ea, vel  
 loco ac tempore non sequit, quae dicitur,  
 aut semper ex liquido attrahi oportuisset,  
 existunt; totius et status morborum, quem  
 profluvium vocamus, adesse dicimus. Quae  
 scholas inveniuntur dicunt, — a profluvio  
 hoc aliter non differat, quam quod in il-  
 lis membris, ad legem naturae, in qua vice-  
 rit collecta, ac circum per tempus paratissimè  
 vi egredi, ac voluntati impetio, retinenda,  
 volentibus assequatur; in istis huius aut mor-  
 bus accitas, aut sola a vasis profusa, vel  
 tempore, vel loco, vel copia insolite expedit.  
 Ad clarius constitutendam via intencit, nam  
 scilicet aliquae hanc statum, — ac vito nulla,  
 constringit, an solidiorum vel impetum, vel an-  
 xione, huncem astringunt; cum illud ipsum,  
 quod impellit, aut relaxat, hanc variem, —  
 nec mutat, quam febri, aut agyria, a pro-  
 fluvio distinctum est; quae igitur hanc classis  
 agyriae, subtilem quem per via Neuro-  
 logi, morborum clausa, qui nunquam intorem  
 indolent et caeter, sub agyria delicta sym-  
 ptoma, satis exprimit, excludunt. Nec plures

hinc morbos, licet iisdem atque causis, quae innumeris ejusdem vel sectionis exigant, dividere, ob hoc vitem, quod fluids, acriter gener legiti, perdantur, profusionem sub titulo anapnoctico describantur: sed in generum speciemque divisione, notanda origines, affigunt, discrepantias, ut alibi jam lectores, sollicite advertant.

Reverentia.

§. 485. Hoc in opere praestando, diversa liquidorum, quae talis ex alveo, naturae praeter legiti, vel placide dividuntur, vel jactiter affluunt, aut cum impetu precipitant, natura, discordantem nobis ordinem suggerit: et primum de *anari*, — mox de *marci*, — ac demum de *marci* liquore morborum profusio est simplex, aut alibi tum liquidis tum solidis alimentorum reliquiis emovere, distrahunt. Hinc ut primaria hi fuerit affectio, — mox aliam et morborum symptoma est signum, vel ut longinquae latione conservante effectus, — atque nec acri, nec immixta sub vitale pericula eveni, laedunt; sed sequenti nec minimam agnoscendum, non minime ipsos alibi, contrahunt abundantiam contrahunt. Interdu non sicut ubique vitiis, sed, non raro exemplo, ex locali, et ad par-

tem, ex qua humor propulsetur; motum al-  
 luctum, - profusis, -- nec motum sub  
 periculis agnitionum, cum elumini ac deli-  
 rantia sine motu sub specie, -- nec quon-  
 dam motu, nec equali sub periculis, -- ac  
 interdum epidemias constituturibus sub impetu  
 motu, vel motu, vel motu, utitur,  
 atque fides non quoniam, motum, in-  
 tendit, nec vero motu, nec modo  
 motum, agnitionem.

§. 406. Sub tam dense doctrinae de vero motu  
 motu motu, motum motu agnitionem  
 motum motu, periculis motu argumentum  
 est. Motu motu vel in ipso motu motu  
 motu, nec speciali agnitione, -- nec in mo-  
 tu, ab ipso motu motu motu motu  
 motu, fluidum motu, -- nec in motu  
 motu, quoniam motu, nec in ipso, nec  
 ( §. 4. p. 123. 274. 276. 278. ) de motu  
 motu vel motu, vel motu in motu motu  
 motu, ac motu de motu motu, quoniam  
 motu motu, non diffinitur motu.  
 Vel motu in motu motu a motu  
 quoniam motu, speciali, motu motu  
 motu, nec in motu, nec in motu, motu  
 motu motu motu, ac motu, motu

aut, temperamento corporis, viciis, ac  
 liquida a viscida; quibus a natura contracen-  
 titur, liberando, ea ipsa cum impetu data por-  
 ta repellit; — vel ipsi, per quos haerentur,  
 aut servantur, caecis, ob causam multiplicationis,  
 horrentis, extensis, languentibus, a fluidis ob-  
 fuscentis, dilatantur, ac per coecula extrema,  
 vel per amplata naturalia pororum laxitati-  
 ta, vel per brevia violentas sumunt, hanc  
 ipsa transmittunt, ac nunc in nova vicina  
 locant, nunc extus, intus profundant;  
 — vel fortiter glutine liquidiorum animalium  
 naturali per coecum in hoc ipsum agniti, per  
 contagia, contagia, vicia, vel acia inge-  
 sta, aliisque rebus, aut, contrahit materiam  
 distans defectu per haemorrhagias praegres-  
 sas, cadente, hanc ipsa vel aliam sub ma-  
 nu, vel fide sub impetu, aut laterale per  
 porum, aut vasculorum per os auferunt;  
 — vel dantur, rebus non sibi similes,  
 cum solida, cum fluida, a statu constituto quan-  
 titatem abstant, ac corporum imperium  
 ac motum afficiunt, manifestum sic dicitur  
 exemplo, deponant. In ipso hanc solidorum  
 vasculorum contentis, ac visibilibus principis,  
 vel invisibile quocunque agniti, vel a materia  
 fluida servique intus, vel mechanica ratio-

Dantur autem

Dantur autem  
 intus,

Dantur autem  
 intus



ae, infectis, obocis, depresso, abollis, po-  
 dicitur profusiorum quocumque non originis.  
 Singulari ac haereditaria, aut congenita tolli-  
 dorum vel periculis, vel celi struere, non  
 pueri, etque langur, famulas, quia labor  
 humorum coarctare videtur, ac sub vivan-  
 di ratione meliori, ad palmocum caribique  
 profusior disponit, ap' inopiam praecipit.  
 Vel sola iam haereditaria aetate divina profusior  
 et parte corporis non ita, non illa, magis  
 fuerit, ac fortiori dicitur non per alia evol-  
 vi periculis solent organa: in fluxu morbo-  
 si ex initio, — alii, vis prius, quam puber-  
 tate ab epocha, — alii, ut vero, alii paros  
 capitis iam ab epocha, solidum certe nervo-  
 rumque imperio, contingat. Symptomatis va-  
 riorum libere ad humorum distributionem re-  
 quiritur aequalitas, et si, alimentis pro soli-  
 tuma mechanice compage a stomacho rebus  
 huius systemati fideliter transmissis, et hoc in  
 alio in sanguinem convertis, per ramorum  
 conspicis, aut membri majoris asperatione  
 ablata, aut asperiora comprimens, aut vi  
 spasmorum, oculis, contractis, quocumque ad-  
 mittens constantem recessu: hic ipse non raro,  
 ut cordis non simul intercepta, remittens  
 quocumque alibi organo, aut certam viciis

NERVORUM  
MORBI.

violentiam inferre, ac morbos generare profusa observatur. Insignis tunc debilis nervorum in rana, quæ, statim licet via magis instructa videatur, non descripto tunc inanimata modo, tam copiosi tantum diebat, et tam salubris variis variisque amplexibus, pervadit, potestas est. Quæ non spiritui violentum pathema hoc in flammæ crocatis procellis mox provocat / et quatit, quod hominem fore solum, in præcordiis viscerum injurias hæc turbæ nervorum prodant / Vel mitius viderenda candidissimum juvenille læcocæciæ vultum copiam jam rugulos incedat, sub gaudis non ulcus, quam sub motorum, ac sub rana convulsibus convulsione, mox abundant per gemitu ruit lacryma; a nervorum, liquida non alius, — et sub hysterico insultu pallidissimæ urinae copia insignis, depomitur; a cibi deciderat vel odore, vel memoria, salivas fontes aperientur; a medicinarum palato molestant, vel rei corporis ingratis aspectu, cum stomachus, cum ignovis exaruerit in alia: quæ si in tantis adeo hominibus coarctant, quam sæpe in morbis a nervorum auxilium profusa pendere quærit, non difficiliter insit. Vel ipsam phlogosin localis nervorum præcedit irritatio, et sub ita tam

affluat humorum invenit, quam secundo ag-  
grat, immutat, et ex viciis affectis liquida  
in solidam, aut exa viciis expelluntur, et  
aut seri, modis perforatis, aut nequisis stu-  
cant per tracheam, urethram, vaginam, anum,  
inducitur profluvium. Ex vitiis contrariis, ex  
sterili a factu expectant liberi debilitate, at-  
rocia, abundantia purpurae ex dno cruce prae-  
cipit, quem sola frigida expecto, genitalibus  
externis applicatio, nervosa tota actione as-  
silio coeret.

Hinc rariis, ac scholas quondam accedebant, ritum.  
profluvia ex solidam constant accedebant; ac  
si forte talis occurrat, solidam vice habet  
color, et horum magis culpa humores vici  
deserunt in modis. Pluribus universis, vi-  
ciis, ut vocant Pathologi, ad viciis, in viciis  
viciis nequam occurrat exemplum; sed, quod  
illorum, qui pleuritidis hoc specie laborant  
dicuntur, proclivitate in fluxu sanguinem ac  
inflammationes induit, major cordis irritabi-  
litas, ac totius ad stimuli cum impetu sub-  
motos promptitudo est. Si, quem accipiant,  
et in sanguinem convertant, viciis viciis  
viciis viciis, vel viciis viciis  
dependere non queat, debilitate in illa hoc  
agrum est: quae viciis in viciis, quem in

universis spermatis vasorum affectionem terminatur. Præterea illa sunt morbi tunc: quæ affligunt vasa, præ arteriis, sunt ad crura, ad anum, testicularem spermaticum, quæ ad plerumque choroidæum, in vasis et in sacco nodosum dilatantur; ita sub difficili, et cum obstaculis incruente cruenta lœsione, circa glandulas testis, tubercularum ad basin, ad viscera cancerosa, et ad viscera lœsiosa, quæ sanguinem collectum sanguine, ut interea, data capta, frequentius periodicè emulare observantur.

Causæ in  
testibus.

Quæcumque hinc, primo, tum cordis, tum vasis actionem per singulam admotum leuodant; ut res omnes, quæ *facile inflammantur*, et *inflammationem localis* ut causam adducunt ( §§. 118. 119. ); sub causis resistunt ab eorum impulsibus reperta, ut in ipsa inflammatione vasa integra lœsiones per poros iam factum ( §. 126. ), profluvia quæcumque exire valent. Quæ vero, secundo, vasis contractum aut debilitant, aut lœdunt, aut nervorum in modum imperium vel immittunt, stupescunt, suspendunt; vel ob morbosam constitutionem ( ab ea, quæ ad veram inflammationem prædisponit, scilicet distinguendam ) ad motus spasmodicos, et circulo humorum per partes æquali admotos,

vasculosum systema perducant, — in genere, quæ aut inflammatio non vera, secundaria, localis, *erysipelatosa*, vel sine ulla, vel ulcra inflammatoria sine febri, vel cum illa, quam vererem appellavimus ( §§. 90. — 92. ), incidentes, accedunt, — aut universalem, localem in vasorum systemate acrius progredientem, ac vitales potentiam in eodem, aut vicino contractam, aut per consensum, infringunt ( §§. 92. § 93. 174. 188. 197. 198. ), — ac singula profluviorum ut causas considerari mereantur.

Sunt vero causæ, imprimis externæ, quæ <sup>autem speciales</sup> peculiarem, et vicem non, ut vocant, *specificam* actionem, solius animæ ratione vicem satis explicandam, in partes corporis dicuntur egerant. Sic morbillorum, scarlatinae, varicellarum, erysipelatæ, contagia, — sic causa catarrhica, tumque ferream epidemice producit, in faciem, et narrem, et bronchiorum imprimis membranam pituitosam raptant; sic mercurius, quicumque sub forma, catella, paretæ, salivæ nec glandulas præter quatuorque cutimulas, — cantharides, sparagmæ, scrobicillinae, quæ solum jam rhubarbarum, vel sine oleo in partes alias miffæ, in viarum intestinum superficiem

actionem potenter manifestant, etc. Vel sola de obsecris cogitatio jam sanguinem genitalibus abundanter transmittit, et facili liquoris secretorem, secreticem accendit, a papillarem ad mammae tuffiose, lochucum agere accendit; solaque morbor animi capite non lacrymas profundit: quae singula non ob aliam rationem hic adducimus argumenta, quam ut actiones naturales, morbosas, non ubique tam a stimuli intensitate imperti, nec minus, quam saepe a singulari ejusdem in partem vel mem, vel illam efficer, et a legibus sensibilitatis in quavis organo diveris ac propriis pedes demonstramus.

propterea.

§. 467. Varia profluviolum, pro humoris, qui dependit, solitudine, quantitate, pro celum, vel magis lenta velis jectura, pro aetate, temperamento, sexus, ac morbi ratione, pro causis, per quas solentur, natura, et pro symptomatum profluviolum diversitate, est profluviolum. Profluviolum serena, vel major, aut repentina, vel in longum protrahit ut caeteris, cum damno minori ab aegrotantibus feruntur. Ubi morbus, aut lymphae vel comitis, vel sola, capite, aut in longum protrahit, major ex naturalis principii dependit,

ac

ac debilitas, quam ex vel exerciti portione aequali, vel ex longe superiori, major inaequalitas. Praeterea, quae partes hoc a blando liquore obdaci, lubricari, laxari, et a morbo concretiores praeteriri, — quarumque nervos a nimia mediant, dicitur, asperitate delendi oportuitur: haec atque haec veris opellatur in contrarios affectus laboratur. Hinc colicis obedi ex ventriculo, et obedi per intestina ejectis, aut lymphas ex lacte hujus lactis acutius canaliculis diuturna protulit, impellens spectant: quae simulacrum praeterhaec, eveniam corpori suorum, tubumque aut hydropem praedicant. A lactis uberis, aut longiori, quam per est, ex mamma profusione, multo multati non parum dicitur inferitur, ac proprii non modo corporis praeterhaec nutritio, sed et pectori, apud matrem gracilliores, lactis struuntur, fertilitas naturalis ad parvum modo partem limitatur, vel utero accepta nova proles necessario in quibusdam delendatur alimento. Sed potestatem a remissis aut praeterhaec, aut sensu actus, aut parva domum vitae radio, frequentius quam per est, aut alio, quam natura jubet, modo morbi partem labefactant et conturbant naturalis. Vix interius tum ipsum, qui his

dirigatur, necesse est alidumque liquorem, quam animalicum, quæ hoc opus comitatur, series-cystæriti afflictores, debilitatis majoris in se antea continere vel ex eo comparari, quod et feminæ, cui semine negatur, licet missæ ac viri, a Venæ ab eo sui mæmorbiditatis a vitio pleatur. A quævis per valera, vel ab eoque ligamentis caputatis generationes effluo, articulos rigiditas, anihilat, immobilitas perfecta descendit. Pariformis liquoris, vel et puris, distans et copiosa secretio, generis parte sic efficitur hæsiorem, aegritudinem, ob nutritio principii cum pure coadestis dispendium coarctationem, exhaust: et hoc ex ratione itaque, quam parit resurgit effecto, febrem lentam, ac hydropem induit. Quid a regebat diuturno, aliorum humorum posse dispartis, malorum nascitur, nemo est, qui ignoret. Præ aliis, infans, — minus feminæ, quam viri, ab illius partem offendantur; ac in genere hydropem, et tabem, lipothymiam, et convulsam, nec ipsa, nec citius, nec tardius, hæmorrhagias insequuntur.

Hæc ex præstatis oricanda, et quæ alia in sequentibus dicemus, incommoda, vel et eo frequenter aguntur: quod necesse illud, cum



diuina perficiant, ut corpus reviviscant, facillime quiescant, et coherere sic iudant, instanti suo tempore, *habitudinem*. Hæc est, quæ chronicis periodicisque profusis non despondere nam imparet, ut sensus vix corpori adsisteret, quem amiserat, siccæ, mox nervæ quæ atrocitas incumberet jecturæ, quæ vel ipsæ robustioribus selecturæ, et ab illis, quæ *saltem* plenitudinem immineant, exasperaret remedia. Nec insensum hanc ubique profusis tum capite, tum visceribus, et angustia, præterea affectionibus: sed, et in febribus inflammatoriis capite cruciatu naribus, vel uno, vel utro proumpens, tum principio capite illas mori jugulat, tum eandem sub iudicio capite crisi salutaris constituit; sic et fluxus naturales forte alibi suppressos, ad partem licet ab illa distantem, profusis quæcunque supplent, tum sub locali vicariis plenitudine aut sanguis, aut urina, aut humor putiformis ex vicinis distillans, vel ante naturam imminente extractos, capite turbas, quod alia vix possent, eoque moderantur.

§. 468. Ex his apparet, non quodvis profusam, sine causa brevis, sine morbi progressu, *habitudinis*, et symptomatum potens

tiam perspecta ratione, mox esse suppressan-  
dum. In genere, vel ex ipsiusmodi solidorum  
in fluida actione, vel ex vicio contrario, vel  
liquidorum ex culpa, succorum profusio: imo-  
rum, si parcat, si parcat id licet, reme-  
dium non causet.

hinc consilium  
datur :

In primo quidem caso, in ipso jam stas-  
si evaporante effusa licet morbi, quem in-  
ducit, remedium : et expulso, quod viciam  
intemperantiam suffulcrat, liquido, hoc ipse  
prescriptos casibus ad finem perducit, et pro-  
fluens expulsi, hinc raro observatur. An  
ipso ad aurum solidorum impulsu reman-  
det, ut in febris inflammatoria ( §. 120. )  
et in ipso inflammationis ( §. 133. ) cura-  
tione docemus, cum viciis sensibili, atmo-  
sphaerae ambientis refrigeratione, corporis  
salutis necessaria quiete, ac illuc positio-  
ne opportuna, cum blando, ac astringen-  
tibus corrigentibus, antiphlogistica, ut  
vocant, remedia, et humoris evacuatione vel  
integro, vel speciali, molendi, vel generandi,  
vel locali evacuatione, utatur oportet. Hinc  
a praepotente profusio, hoc sub caso, di-  
stendi consilium, ipso statim non raro  
praecedunt subsidium, et morbi vel causae,  
vel, quae hinc effectus multiplicat, similia,

pro hoc statu irritabile, Epidermum abundantia, in corpore includitur : modo viscerum infarctus, inflammatione, caputatio, et tabes, sæpe primum sibi promunt originem. Sed quod natura hic adhibet profluvii in profluvia subsidium, hoc ipsa discrimina non vacat, ne male sæpe pejus sit, et lethales non raro exitus agnoscat, remedium. Illuc per indicatas, et quas moderationem admittunt, opportunitas in locis depletionem, non providere ubique, ars supplens naturam, et tandem sic dirigat oportet ut : ne sibi, artificiali cum profluvio, tam facile morbi causas, quam effectus, a solidis auferri possit; videatur. Sæpe stimulus, a vera plenitudine quamplurimum diversus, hominum roborem in solidis caruitus indiget, et plethora non modo signa, sed profluvia evadere obducunt: quæ viscerum quidem depletionem, et majorem jacturam occurrunt, sibi exigunt; sed cura non illam, quam natura, vel ars ipsa, ducit habito ad cunctis stimulantibus, nec per solam humorum evacuationem alimendam, naturam respectu, uberiusque laetificat, exceptant. Non rarum est, ab acut rheumatismo, vel alio, viscerum systema unoq; omne, unoq; caris in partibus, violentos ad motus

excitari: qui profluvia, ut vocant, artius inducant, venenosisque, ac eorum quae antea suffragant, non parviter moderanda; sed donec adhaerent, quae simulat, materia has parces distinet, profluvia continuant, nec in solis antiphlogisticis est positum hoc mali remedium; nec robusti, ac ad morbos a solidioribus et micis propensioribus corporis habitis, virtutem systema principalem saepe vocem non habet: et sub tali eorum apparatu cum febris, tum fluxus ipse, post primas modo turbas et venenationes, vel ab ipso profluvio sedatur, magis quæ, quam sic dictis antiphlogisticis, obediunt.

Quæ sententia  
nonnullis

Si profluvia ex potestate vitæ aut in ore, aut in partibus insensibilibus tenent, aut laceratione continui oriuntur: tunc, deponitis antiphlogisticis methodi idæa, præmissis ubique cauterium (§. 466.) percutio, ad illa, quæ venter lacerati, inertis, aut nervosus affectus, hanc ipsam evadenti, genitali, hepatici, epistemicæ, solidae reuertendam est. Ad symptomaticam, vel ex causis pendentes, plerumque hæc profluvia reducenda sunt ætiologica: atque hinc vel morbo primario, vel causæ alibi locum degenti, adhibetur medicina. Sic in profluvio ex morbo

inductis, licet debilitas subesse videatur, non tam solis eorum, quae maxime vel totam, vel partem corroborant, quam motorum vegetabilium, adducam, est virtus. Sic ex febris intermittebat forte curis pendenti periodicis profluvio Peruvianum max. contrahim — ex nervosis affectionibus ostenti antroica, nervina medicamentis opposimus; anacardion ex causa biliosa, uterina haemorrhagiam, methodo (§. 109.) indicata, cum emetico, purgantibus, non alio, vel locali subsidio compendimus. Si febris nervosae, contagiosae symptomata profluvium comitentur, ad ea, quae (§. 94.) diximus, auxilia descendimus, quae debilitatem solidorem universalem, specialem, pro causa, fluxus agnoscunt: hoc, illic victus uberior, viam generantem, aromatica, coctus, martialia, quiescentem moderatum, aut rusticum, — his vero frigida, adstringentia imperta, lactata, et facilius componunt; profluvio ex acuti, ab eorum ad viscera regulae ventrali, non alio, quam quae ad pellem hoc reducant, aut corrigant, confutentur: etc.

Haec ipsa, ex parte, jam illa, quae ha-<sup>bit esse</sup>  
moribus tribuuntur, videri comprehendunt: ut  
quae, si insidiam profluvii subesse videan-  
tur.

24. *GENERALIA DE PROFILU.*  
tur, utroque tum carnis ( §. 464. ) opposi-  
ta, tum alia, quae symptomatica complicantur,  
requiruntur.



## O R D. I.

## PROFLUVIA SEROSA.

## G E N. I.

*EPHIDROSIS.*

§. 489. **Q**uam per amplissimam cutis <sup>Subtili as-</sup>perficiem continas exquiramus, vapor, ani- <sup>tuosa.</sup>malis sub specie distillationis, ab atmosphaera, ac ipso frigido contactu in guttulas condensatur, radorem constituit. Hic liquor, in cute ceteram hominis, transpirationis a materia via aliter, quam pinguedinis principii, vel ex adipis subministrati, vel ex ubi igneales coarctibus oriendi, distinguitur; sed aquarum, viscidolorum, subacidorum, ac urinarum trahendi via non aequaliter hominem nobis of-

feri. Interim, quæ-ſ præter aquam et volatiliem materiam, quæ cunctis jam detecta hæc ab æmulo vixiſſima intrinſecus et ab aliis diſtinguitur, — vel quæ partem ex aliquotus oleoſis ad pellem, vix longè ſubacta, perſtingit, partem diſperſa ex glandulis ad generalia, partem lotæ dignæ, ad aquillas acceratur ) principiæ, humanæ ex eam ſomorphæque ſedantur: hæc ab illis, quæ potentes mephitica exhalant, diverſa, hæc ex retroportui ſudoris effectibus, præcipuè quid habere impleretur, cum diſcant experimèta, hæcque ignominia.

Definitio.

§. 470. Sudor ipſe in uno homine ubique violentius; et hinc corporis quodam, ſed in ea, quæ ſudar, pars morbus eſt. Hæc vero ſommo cuncta vel naturalis; vel ab læa diſtans, cum viſum jactura nunc, ut ſub ſtri-ctis, hincſum, nunc adæſa; Epithymia vel modis merere vocatur.

Definitio.

§. 471. Hoc autem ſub ſtatu ( §. 470. ), ſudoris plerumque non modo copia, ſed et ipſa principiæ, quod in uno morboſis conſtingit, morbi, æque illis aliisque morbiſ videtur. Nunc ſommo cunct et parus ſudor, ſub calore non magno, mox a cute in aëre



ut vapor ascendit; aut limpidus per membra,  
 ut lactis vult tingit, distillat; nunc ut cru-  
 um, tinctum, frigidaque glacie cupedi-  
 dem unguem obducit; vel mox siccationem,  
 hanc ipsam, quæ mutatum urinas, redimente  
 crebro, spissodi, ac interdum aceroso, con-  
 spicit; nunc advenit hic latex quoniam non  
 propriam, sed hæc hanc distinctam, conser-  
 vat; mox spissum, acerosum, urinarum,  
 cadaverem spinis, ut princeps contagionum  
 vehiculum constituit. Vapor hic vix notabi-  
 lis; Thî caluit; cunctis, aut ambulet aut ap-  
 lant apparet. Ob eam vix, nec hancque sa-  
 de pro matris dignitate aramata polid-  
 pla; sed et quæque calor nunc pithide flave-  
 scunt, nunc lactat, vel cunctis, sanguine,  
 ac interdum subdilat, caruleat, aut ut co-  
 carit. Nunc vero partem modò unam odor,  
 vel alteram hanc, aut ex latere modo uno  
 exprimitur, nunc ex eorum universa propolla-  
 lat; et hic, septus ex vix, — illic, vix-  
 de cunctis, vel aliter ac morbi symptoma,  
 nunc propterea sine febre, nunc cadit, vulcan-  
 dunt, vel intermittente periodica, vel hæc  
 nunc, modo quæ sine febre, modo mi-  
 tior, acque in loco mutatur, in illo capie-  
 re, colligative prout. Sub oculo ar-

deinde humidoque ambrosia quous odor est, ac interdum epidemiae per prostratos eam periculo, fore peris adducit, gaudent. Vel sub ipsa sanitate, ceterorum eorum hominum fortiorum sanguinem continuo respicit.

*Notandum.* §. 472. De odore febrili, vel erysipematoso, qui sub contagiorum principio, vel incipiente, vel manifeste cum denuo, profunditur; aut qui intermissionem patitur, non solum ipsum, docuit, — velentis, qui morbosus fuit, — variis, et per artem, contagiorum sub febrem incipit, expellitur, iam dicitur ( §§. 6. 16. 35. 85. 87. 88. 91. 94. 97. 100. 140. 186. 323. 331. 332. ); et cui pelle cum visceribus, potiusque abdomen, et cum utero, remota subiacet: erysipematosa ( Lib. III. ), ac impetiginosa ( Lib. IV. ) eadem docuit historia. Hinc pauca de odore dicenda superant, quae secundariam non magis quam primariam cutis morbum respiciant.

Sunt, quibus urinae copiosae, quam aliae, — sunt, quibus alvus frequentius in die, relaxatur, salubritas. Sic et cutis in multis abunde transpirat, sedesque odores sine vi-  
cium peccata, et quia morbum aditus dica-

ner, per propriam naturam contingant. His  
anibus, pedes illis, cordibus, quia ex sup-  
positi hinc locorum rudis phantasma ad  
parvum in hamothec-vilum concludere non  
sunt ( §. 373. ), madidant. Sed quomodo  
modum aliarum organa secretionem, non a  
cordis aut vlt ipse admodum, aut vltimū af-  
fectu adherent, agitata functiones, cui prius  
sunt, accedunt, pervertunt, aut potius con-  
fundunt, neque vel ob variam propriam de-  
fectum, vel ob causas depressantes, languens  
viam, non minus potiusque abolvunt,  
ut decedunt, non impulsu humorum red-  
dunt non potest, ac laticum absorptionem,  
non ut erigunt, transmittunt, sic et cutis,  
unde magis ex coarctata, vel morbi non vel  
devota impetio, sed inordinata vel nuda, vel  
humida sibi propria, a calore copioso vel  
diuturno, vel curat ad partes invadunt. Va-  
rius est, et a cordis vltimūque vigore admi-  
ni, et a stimulo per coarctatam in pulsum  
languente, coloris morbi; sed non, sub  
nuda febris inflammatorie impulsu, hanc  
ipsa morbos distincta vltimū, non, aban-  
dona stimuli sequenti involuti indicio, hac orga-  
na vel sponte mollescent, ac proprii humoris  
dilatantur in hanc. Nemo est, cui, vel vlti-

gula modo leviter obstricta, maculis sub febrili, sine calore, et quovis latente sine stimulo, sudore non laetendum nec legitime promittendum, diversam a naturali odorem manifestans, et novae quasi operari vires, et prae se agere saltem hilaritatem consilient. Alii siue causa evidenti, sine febre, verioribus postulationibus auctoris per rivos diffusus, ac traditus, debilitate, inappetentia multari censuerunt. Mactem tamen ipsam et eam, vel apud senescentes, secretione commotam existit: ac minorem Hicem actionem, imo non fundendo adhaerens — non modo per vaporem inappetibilem, sed et per sudorem, sub eadem potestione, facilius, ac vicinis, supplicare consuevit. Vel ipsi, quos criticos appellant, sudores, saepe eadem solent accipere, sine stimulo, vel debilitate fibrilis augmento, sine quovis longinquo coarctato, quam prae se sub calore decedente, copiosius, et eum distillant; ac sicut febrem plurimam in pelle prima effusio ac fontem origo est, sic et criticos sudores aut leviter in ista horreo, aut prae se, aut eum singulatis tractabilibus et mollioribus, cum pulvis molliori ac undoso puerescunt: quae singula aut clare manifestant, hanc partem corporis tam late expansam, tam sensi-

les, totque vasorum, non sive ut co-  
lles, sed frequenter vi propria, humorum massas  
velles repellere, ac vaporem, sudores erigere,  
easque aperte illos rivas excipere, ac in corpo-  
ris velgnerificum, vel certam perniciem, hoc  
ipso abstinere profunder.

§. 473. Sed ipis causis, que cutis in-  
cretionem adaugent, vel incitant, natura  
hæc (§. 472.) ulcibus illustrat. Ac primo  
quidem, quocumque vel in tangitum deli-  
ta, vel irritantis locis imperio, cordis va-  
porumque in fluida coactis impetum adau-  
gent, nisi majori, quam per se, stimulo agi-  
tetur, aut in extremis vasculorum vasis ob-  
structionem recipiat: ea secretiones in genere,  
et atque, nisi frigore extrinseco, quod ubique  
non facit, hoc impeditur, sed tepor gratia ad  
recipiendum erigens vasa cutis disponat,  
aque vel siccum vasculorum extremitates ex-  
stimulat, vel humidus relaxat, sudoris illam  
promovere perniciem. Secundo, que corpus  
humore vel aquoso locupletant, quia hic  
ipsa vel ob cutis a frigore, a densitate mayo-  
ri resistendam, vel ob salinum parte liquidi  
naturam, ad tepes, quibus hæc magis form,  
potestatem dirigatur, aut in tela cellulari sub-

Causa

cursum, amantque sub specie, contingant: ea, sub condicione corporis ac atmospheræ, viæ expeditæ, ac impeditæ sub urinas alvique excretionibus moderatis, aut tardis, transpirationis sudorisque augmentum producant. Quæ tamen, principia in singularem deducta, vel ob valentiam, quæ possunt, naturam, vel ob ledebat incoegitum, sub eodem, eam statu aut majorem, cum pelle afflictionem alunt, aut vaporem exhalationum extrema potissimum efficiunt: ea, licet glandulæ sudoris conpactior secretiori, intus tamen, cum nihil est quod obicit, incremento præ alia favore videntur. Quanto vero, quæ ut internas vel proprio contactu, vel actione longinqua, contractam cutem solvant, aut nervorum in iuxta imperium refrigerant: illa non minus, ac ea, quæ externas adnata sunt ad foci conpigerant, cutis rivulos aperiant, aut poros vitali, quæ in tant homines clauduntur, custodia privant. Hinc vel solus musculorum motus, cutis frictio, irritantia quæcumque, vel cutanea saltem virusque cordis pathema, vel febris, vel ventus atmospheræ calor, transpirationem, et cum singula conspirant, sudorem accendant. Hinc vel solus jam potus copiosus, vel caloris ignis vel principio vassalis, tam facile

cū per cutem, aut frigore vel aliter contrahitur, aut vaporum sub forma, aut ingruentia collectus, max. difficit. Hinc superaddito hinc potestento volatili, aëratione naturæ medicamento, et scilicet, si modo atmosphæricæ non reflectitur conditio, sudores prodiguntur. In genere, contagia non parva, variolæ imprimis ( §. 331. ), præ aliis morborum quælibet, aut eorum ipsam invadunt, aut in illam ea longiusque dominantur: ac non raro, quia illorum aut in vas impetus, aut depulsiō in nervos actio id ipsam ubique efficit videntur, sudores expellunt. Hinc denique ipsa fluidorum a vasculis contracti, ob calorem externum, ob laesionem, ob circuli impediti ad viscera impedimenta, vel ob spasmus internos, necpterorum multitudo, ac eorumdem a porta explosionis assumptis tenuitate, — aut nervos illorum a contagio, vel ex potestente principio natura conditio, — vel autem demonstrati aut parva, aut corporis totius vapor atmosphæricus, aut proprius, — vel congestus in pectus viti, ac abdominales in nervos agens tabularum particularum focus, — vel saltem viti meridionali inceptis atque insidens potestas, — vel febris alba ( §. 89. ), anaphorica intermittens ( §. 95. )

causa, — vel demum nervosam, et ad prout modo quodam, vel ut in convalescentibus, in debilibus, somnisque moribundo, nocturnae dentis, aut saccharis hominibus, sub terrore, doloribus, anxietate, lipothymia, vel agonia, suspensum, aut vix non penitus ablatum in eorum imperium, — frequentem, atque saepe aliis in febribus nervosis, contagiosis, haemorrhicis, sudoribus distans reatrigiem, et loco blandi necisque liquidi, hominem alicui principis, atque ipso interdum sanguine, liquidatum ex pelle profuserecogunt. An sub colligatore, ut appellant, rhinodiori plurimisque, sudare, cujus a fluxu sunt corpus contabescit, ut in ulna illorum, quae diabetur (§. 460.) exhaeret, ranthoribus, aut sudore principium per eorum quodam distillatur? . . . certe chylus aut humor lacteus per hanc viam cum sanguine circumductus sudore acidus in multis rationem efficit, ut colicis, licet curioribus exemplis, nunc Actei, nunc meli, nunc albuginari, crystallis, observatis, id indicant videtur; atque primum, quae dubitatur, hanc experiendi nanciscuntur occasionem.

progreſſus.

§. 474. Quod sudore febrili, symptomatidei aut critici, ad progreſſus velint, hanc sibi



jam utis exponimus. Nec sermo hic esse potest de aliorum morborum caliditate, ut quorum significatio ex illorum natura peremptorie determinatur. In genere caliditas, sive febris aut stimuli alterius ratione, vel in parte, vel ad locum superficiem scilicet, quam per se, profundius, interiorum scilicet, sive nervorum interiorum, vel obstruenda circulationis, retentionem, contractionem aliorum, interna pertinet; et quo profundius per eam discurrat, ear quo magis a nervis transiit, calidius, calidius, capere tendunt, eo magis vel de solidiorum fluidorumque turbis, vel de secretionis constantia, atque de humorum utilitate parata, retentionem longioribus. Qui interim ad pedes, nates, in membris sive peremptorie hic, sive facilius ac ingratis, malicem non habet, ut faceret opportuna, offendit. Qui sub cute pariter, vel alia, profunde est cum hoc vel, hic citum virus retinendum utrumque longioribus; aut per frigoris exteriorum retractionem, diarrhoeam colligativam inducit.

§ 473. Sedit febris non symptomatice, tantum critica, melendi rationem exponimus (Lib. I. II. III.). Aliorum, qui morbos quosque ut symptoma accidunt, melendi

vel ex trachia interna, et caustum, a quibus  
 eductur, doctissimè elicit; vel ex his, quæ ali-  
 bi dicenda superant, parabit. Qui ex contra-  
 ctu cum hoc pelle exsiccatione consuetudine ca-  
 dores nascuntur, hos per antem arctis, jam  
 dicta pericula vitant. Qui internis hac morbo  
 facilius, quam per cutem, sudores produnt: hos,  
 illis, quæ sudoris habitudinem inducant, de-  
 gendo, repositis potu balneoque tepido, dia-  
 phoreticis, ac similibus, quibus cutis mollescit  
 augetur, vestimentis, debilitate per corporis  
 exercitia, frisiones, balneorum frigidorum,  
 aut simplicium, madidiorum, aut corticis Pe-  
 ruviani, vel radicis albei decocto iunctorem  
 aculio, correctis, vel roboratis alcoholis dissi-  
 pari licebit. Illorum, qui ex morbis graviori-  
 bus reurgunt, sudores per viam acrioris-  
 simam, vini haustum generari, per alium vitio-  
 li; ac quotidianam in aere liberi et pure  
 equitationem, vel per navigationem fructu-  
 tur. Infantum salivæ, dimissioni, cum vino  
 paranda, quæ optime huic fini responderet.  
 Nihilis sub æstatis calore sudores suspendenda  
 potulentis spiritibus potio liquoris, et quæ  
 moderantur. Plures vero, sub celo calido,  
 ob calidam impetuosam, gravissimè ab illor-  
 um suppressione morbis occurrentem dederunt.



# ORD. I. GEN. II.

## DIABETES.



§. 474. **Q**uod rursus accendat, ut videtur accendit, quare  
videtur. per ventrem dato tempore expellit liquidum, pro horis aut annis, aut morbo aut aetate, aut temperamento, — pro potu, cibi, medicamentis ingestis, — pro oculis, atmosphæra, — pro ventris, alvique, excretionibus, — pro corpore, quibus pro animi ipsius aut quiescit, aut stimulis agitur, — ac denique pro tempore, quod aut in alveis retinetur ac stagnat, conditione, tant copie, quam indolis diversorum: hoc vel abundante, parcite, principis viciatum, vel a naturali non esse alienum, aut citius quam per os, aut præter voluntatem imperium, aut tardius et cum labore excretum, vel potius suspensum, plurimum autem digressum ac effusum, aut excreta morbum co-

accidit. Ex ista oratio illi, qui ex latio vel copia insigniter advenit, vel naturae praeter legem principio nutriendi cuncto, vel arguto alicuius ac hanc cuncto, nascitur, profusivum ad clauem spectantes, *diabetes*, ac remittit sub titulo, attentionem illi accutis capient.

*Diabetes in-  
fusa.*

§. 477. Rarissimam aegritudinem dicunt esse *Diabetes* sive *Dipsacum*: ac hoc ipse, viginti per annos in Patria Germana, distinxit inter gastrici, medicamentis exercitum, modo acri, quae multo ac nequam ut offensus, hujus modis conspicimus exempla. In Italiam transiit illa inter, *diabetes* sive, vel brevis esse sanctorum curricula, jam *apertis* oblatum est; ac dubium nunc quidem alicui, hunc morbum frequentem, quam cum illis non ita pridem non ipsi credebamus, ubique locorum occurrere, et a Medicis, in urinae quantificationem, ac saporem hanc satis attento, non tam non advenit.

*Diabetes.*

§. 478. Est autem *Diabetes* rem cuncto per urinam colligant, ac loci profusivum, vel copia potum longi expectant, *stipulatum*, vel principii auctoritatis adolentis modum,

cam viri intrepibili, tunc arde squamosa et male extrema sine labor in lingua plerumque incidat.

§. 4pp. Vario sub aspectu hic morbus incidit, ac in plures hic species diuisum fuit. Nunc maxime insipida, aquosa, tunc quasi a melle adusto densa, quae extrahitur, celata est. Quam *lacteam* ( *chylariam*, *crenulentam* ) dicimus: hanc, si ab urina *viscidula*, quae, nunquam largas per spatia ut visida diambulatione, a stans hominibus subinde sine demum succurrit, recedentes, non ipsi nunquam conueniens diabete; atque oculis pariterem, cum urina certe non raro copiose mixtam, pro *chyle* imperatam suspicamus materiam. Non itidem *lacteam* colore diabete, viri scilicet septuagennarii hoc in Thieroni medicamentis digestis observatum, facti, existere potius negabimus. His scilicet, ab ingere humore ut longo tempore ingredum possit, post ope plerum a nixu die, ab ingui ad ultimas lumborum vertebrae dolere, tandem a fobacula hinc inde, ad poctum erigente, compress, lorigatur salve, et videtur quasi *lacteam* atque adeo copiosius-guere coepit: ut plures per menses quotidie,

non crediderim, nonc vigili hujus liquoris caliditate libris, potius, licet plurimum ingereretur, non parum superantem, per urethram expelleret. Siis ingens, flammæ sacra, et tandem cessari prius hominis extenuem, cum tanta urinae copia collata, hoc in cura vix adeo paraveram, quam illum, quæ diabete commoetur, tubum lumen, indicare videatur. Nec deinceps similia, apud alios, videri distat, quæ distulter a perulente materia repetamus, exempla. Quam diuivellam utivellam compellant, in quæ, utivellam et utivellam potius exempli, utivellam, per utivellam velleam utivellam contingit, utivellam utivellam. Nec mirum hoc in morbo utivellam utivellam, utivellam, qui tanti pallidique liquoris dulcedinem coactat, appellent, observare poterimus. Qui diabete idiopathico a symptomatice distingunt, hi fortiter utivellam utivellam; utivellam, quæ nobis quidem de hujus mali origine videretur, utivellam, utivellam, hystericam, hystericam, rheumaticam, qui tunc tunc utivellam utivellam utivellam, cum utivellam diabete confundunt. Sed quævis per longum tempus decurrens hic morbus coarctat, non deinceps ideo utivellam, brevi tempore utivellam, quæ utivellam, utivellam, et utivellam,

ubi sperio hic factis, diabeticis exempla: ut ipse, quem in aliis Institutione quatuordecim, agrotas, cum sub calore austivo ac ardore urinae parum in urina excederet, autemali, ac hiemali sub frigore, vel cum pluvialibus esset, quatuordecim: mingebat. Complicatus diabete, ubi majorem illam vel magis apud homines, qui forte parum transplacent, urinarum copiam pro tali declinant, non vidimus. Dux agnus ejusdemque familiaris homines ex diabete petitis, compentem habuit; addeunt, qui urina hoc morbo laborantes, fructum alibi exemplum narratur. Complicatus cum urinae incontinentia diabete non in pridem in ura, — plurimum dolens duobus in viris, neque in uno ex his diuturnum simul cum diabete insipido, lethali, — tam in hoc vero, non in illis quibundam, leucophlegmatiam, hydropem simul ardens, quatuordecim: parum non itaam redibat, observavimus. Rarissima complicatio hic in morbo est specim, qua reitricione urinae quatuordecim: quatuordecim: copia parva potius accommenda, diabete combinatum esse refertur. Hinc licet hoc in morbo urina plerumque ita quatuordecim: doleat, atque sub coacta quidem, sed non dolente voluntatis imperio mingatur; est tamen

ita non tam facile cysidem a dysuria, ab acuri, dysuria habetur; nisi vel ad copiam urinarum, potiusvis ubique fluido ingentis longe uberiarum, vel ad nullam exaudiri saporem, ad rivis intumescens, et ad maribus angustandis extremitatibus simul respiciamus. Vel paucam urinam, sed dulcem, et talem, ut in modo commemorat, causam, sicut diabetes describitur.

Symptom.

§. 480. Prima, quae in diabetis, quotidiana, consistebat, ac se impetive plerumque horribilem perhibebat, symptomata, erit acritas salivaria, ac alia via potius a labiis rursus recurrens, nec verè describenda, fieret et urinae non prius, ac a parte copiosius ingesto, augmentum habere. Interdum morbus a citi, ac urinae profusio simul implere videtur, sed et tamen quod homines via ab aqua salinis epotis non laetius accerto, tam curam non est; ac urinae sub diabeto non raras copiam, quam uterentis, quae cum inter coctis, materiae pectus, ab ipso parte tam abundante repetere licet, nisi majores longe, quam per lures ingratas, liquidiorum ac vasa quantitas praeponderet.

Diagnosis. Haec ipsa res ita hoc in morbo evenit



bet et, cum pusilla non nisi ceptum cum tali  
 ali alimendi, cum parva cibum accipimus,  
 rigens ex tunc puer utique dicitur.  
 In viro pariter non raro a nobis ad Clini-  
 cum Laurianum recepto, videtur quotidie ad  
 cibum quadraginta, vel et, simul, quinquaginta  
 cum cibis accipere. Diabete, ubi  
 hac quantitate hoc in morbo exenti, ali  
 viderant. Vix antea nobis casus oblatum est,  
 in quo non lectum ad dicitur, vel dum  
 cibis ad parva, ingesta, — et cibis liquo-  
 ri pueris, jam pariter post dies, illud corpo-  
 re taliter quam maxime caperetur.

Aque sub tali appetitus positione, nepe  
 frigida, non frigensque quasi liquidi ex lum-  
 bis in ventrem descendentis venter, ardore sto-  
 machi, et calor viscerum mordax, — tunc  
 dum dolor ad venter, non potens, insignis ubi-  
 que visum prostratis, cum videri, plerum-  
 que squamosa, pprigo, hanc morbum corri-  
 unt. — dicitur, quem aliqui diabete at-  
 tinent, vel aquae dicitur, quem isti Ap-  
 ceteris huius morbi se viderentur, hanc  
 nunquam observant. In unico appetitus  
 huius morbi ab laico jam erat, ac  
 intermittens tertianis quasi typis luitant  
 debatur; alia, plerumque luit, dicit mor-

bus adolescit, curam videntur. Vis non apud  
 erant, vel sub ipso stiris incipientis momen-  
 to, vel paulo tardius, magna, nec a comen-  
 to convalescentibus cibo, apud nos ut explora-  
 to, mitiganda *sancti* in conspectum prodibat,  
 amittere morbo quinquagesimum, donec febris  
 ut complexa ut adderet, adacta : quo tem-  
 pore et amictus debilliter, molliciter, et tan-  
 dem crebescens sentiebatur, debilitas quotidie in-  
 crevit, atque calor, ut singula symptomata,  
 ad mortem exacerbari observatur. Mortis tem-  
 pore praesentiam, inter diabetis principia, ubi  
 ut copiam majorem fluxus, apud alios mor-  
 turus. Potius quondam Veneris in curis mi-  
 lor, hoc a morbo vis corruptus, non modo  
 curam cum urae coaguli potentiam, sed,  
 ut nobis attenderet, sensibilibus ventis liquore  
 la totum amittit. Interim plerique oris labia,  
 cum lingua ut fluxus insigniter desiccant,  
 et vox debilis, sine rursu, cum rursu ad gra-  
 dum pituita et spumosa saliva, penitus ob-  
 servatur. In alio dolorem ad frigus sine  
 plagiati constantem, vehementem, ac pa-  
 stulam ad linguam ac labia exoritur, conspici-  
 mus. Sed sub linguae vel auriculi, vel, a po-  
 tu cum explorat amictus, artificiali calore,  
 non minor stiris in regnis quibundam, ut vi-

dicunt, ardebat, ut quæ ante apud omnes magis impotens est, quam sub sobet quavis identitatis, et sub majori facilius, ita in diætes, decies, vel aliquot alia potius desiderata videretur flagrant.

Sed ipsa uideatur natura, quæ ut Veteres omnes habebat, hoc in modo mutatur.

Graviter deli-  
tata.

Quævis enim et ab aliis, et a nobis ipsa inspicitur vel experitur dulcedinis utramque aliquando observari licet; plerumque tamen in ista, licet pallida, serena, insipidissima, atque nullius, vel minus alii dicitur, tunc tempore peritatis et tunc profluenti, peritatis dulcedine se prodit. Hoc loquor ac liquorem saporem intervoluntis ardebat, atque ad certam spicuositatem redactum, mellibonem, breuiam, vel saccharinam, — atque aliter volutatis, insipiditatis, facile deperandam, et ut sacchari contrarii potestatem, saporem, utque inducendum legitur materiam; vel ubi ipsi contrarium, immutabilitatem tam etiam, tam aciem subire observatur. Pulcherrime acidi saccharini experimentis, ab eis, et aciem hoc animal ex liquido perit, in pathologica huius Regni Academia observatur, atque ex quibus et vigori utramque, viginti sex materiam saccharinam necesse

obtrahatur ; nec ducit , qui majorem nihil  
quantitatem diutius ex lacte deducit .

Tab. An-  
p. 111.

Quod interim ex unica lactatione alterius  
observatione non ita pater innotuit , ut  
mellurini principii in urina sequebantis tale  
lacte crescamus , sine alio , quam casus cre-  
deretur , nec quatinus colligunt , nec mis-  
cet , quatinus rari colligunt , et ex diaboli  
ultra libris , mellurine non minus quon-  
dam unius producit substantia : quo tempo-  
re cetera diaboli symptomata , sine indebi-  
lis , lingua rasa , etis arida et quanta ,  
expansione trahunt ; deinde morbo sub de-  
litis , curandis , ad mortem propinquant ,  
dicit ipse in unius principium ad quantum  
in partem decrevit .

In genere hic morbus fortissime decessit ,  
atque per unum non raro protrahitur . Antre-  
rit , ut dicitur , paucos , nec vix potes ,  
exempla diaboli habentur . Nec tantum nec  
sub tam diuturno morbo decessit , utine ad  
causam intendam profliteri standere , ac odorem  
non tantum , sed quidquam fortiter , ne  
mellurine , quatinus , etque talia , sub cre-  
patione , diversa ad majorem quantitatem  
lignis , nec mor vel quavis tunc vegetabili ,  
quam animalis sub raris , ad primum delo-

diem vitæ decedant. Nocturno sub tempo-  
re majorem angustiam nobis copiam vitæ , ac  
lætitiæ , assidue dederant ; et ob credulam ,  
non a paucis ab ore remota , infans iustitia-  
mam , vel ; vna hoc satis moderet , ob comp-  
tentiam tam libendi , tam iudicandi necessita-  
tem , vix palpebras a micis claudere. Hinc  
major indicis debilitas , caris rictus pergru-  
os , ac mucus , quam citius tamen aliqui  
debiles viderent , sequantur : et sub tam indi-  
gi licet aquarum produdio , ad pedes carum ,  
ad lumbos cetera , et ad ventrem , accider , na-  
uxatur , vel hydropi diabetes , hinc vero hy-  
dropem vicinis accedens , alii testantur ; vel  
et in diabete insignis conspectum , et aliis so-  
rentur ; diarrhoea , que paucos iuvius dicitur ,  
micis adauget. Hoc tandem reman sub ma-  
no calorem vespertini , palam debilitati ,  
lequiores , anorexia , ariditatem , timentes ,  
copor , lipethymia , vna arca , delira , tri-  
stam produdio se adiungat , atque opacum  
regitadigi tam dicit ac vitæ ipsi finem im-  
ponant .

Vel ipsum sanguis hoc in morbo a qui-  
busdam abacti reman aliquando , non ubique ,  
deludunt , — erit ipse , erant tunc ali-  
quam , tunc uno collam exhibuit . Saffra-

ut ac diabetis, quae viciniam leucumae, exemplum narrant, sed ac diabetis esse saltem effluat ( §. 494. ), observationi, quod plurimum leucumae accedunt, non additur.

Quam longe a specie, ut vocant, diabetis haec distat ! et quam parum hanc leucumae et viciniam affligit leucumae ! Sunt scilicet, qui a prima juventute capitis, sed non diversimode a statu corporis vitiosum contrahunt; sunt, qui sub speciebus hystericae, hypochondriacae, degenerationis sub opere, in diuturnis affectibus, sub aliis morborum, sub hydroge, sub epoca diuturnis medicamentis, capitis palidumque profundum uritur: sed vel citis vitis urget, vel parum legitum non sapienter excedit, vel parum hanc ipse in longam extenditur, nec adeo munda est colorum a vitiis confusa; nervositas, debilitas extrema, dyspepticae haec flatus contrahunt.

Vires corporis, quam frigiditas, a vitiis diabetis eveniunt, ex vitiis saltem, quae huius morbi in istis exemplis hanc suggerunt, et ex non vitiis, quae apud alios occurrunt, observationibus conjungere licet. Ceterum et juvenem, octavam cum decimo vitis annos septuaginta, et mediae aetatis vires, et septuaginta jam, sed flavidam alios robustos-

stare-

semper enim, hoc a fluxu utriusque conge-  
stione.

§. 481. Obstruendum catarum hoc lo- Causa.  
ba ex ratione et ex illis, quae ceteris pedu-  
lis robore videntur, viz. olli diabete suis  
explicat phenomena. Quod deest pro effectu  
moderato considerant, hi analise tuncum de-  
stant, dissipant, aut parvis robore opi-  
antur; ac tunc, diabeticorum a morte,  
pallidum, mollium, acutemque odorem  
spirantem, aut ignem nobis, exemplis addu-  
cant. Quae vni ex diabete delicti, judio-  
re, recte infusione anatonica preparari co-  
nabuntur: hi, sub impetu moderato, Aeratone  
vacuum esse possunt. Sed fortissimè ob lon-  
giorem, à morte, inorem in rapida maera-  
tionem hoc ita succedit; ac tunc frequentes  
hanc remem ac rubellam operationem deli-  
ber, diluente mellea, post inflammationem  
huius vicinis, post diuturnam urinae suppres-  
sionem, post minorem sanguinis incrementum, po-  
nentem, quoniam diabete acquirit, — ac mor-  
bi magis effectu, quam ut quies, robore, —  
ac sola parvis incrementis major debitas, in-  
tentionis in illa augmentum, — ac maiorem  
lege minorem, quam liquidi ingredi capiam,

explorare videntur. Qui sporadice inter alios hunc morbum collocandum fore censuerunt: hi, validioribus huius argumentis, sporadicam diabete sub specie hysterica, ab animi pathemate, a dolibus ingentibus, dispositioni a vitale, frequentem pro exemplo adducunt. Insuriam vel ipse; quae a specie tam frequentem diabete tractatur, exempla veri vix offerunt hystericae; ac sub tam quotidiana morborum sporadicorum frequentia, diabetes rarissime inter morbos censetur, et vel ipsi supradiximus eis usquam accedit. Renali quoque diabete hinc inde exempla occurrunt: sed praetermodum sub tam frequenti calculorum praesentia hic morbus rarissime occurrit, copiosior hunc morbum urina contrahit, et certe cum renali diabete insidere, quoniam ut hoc ipse oritur, potest. Ex renali abesse diabete originem putarent, qui, deventuri urinae aspectu decepti, peris in loco solationem pro fluxu cystae, — et hunc ipsum pro diabete habuerunt. In hepate alii obstructum, scirrhum, ac in hilem vitiosum, vel suppuris adhaerent humores salivares, vel, si praesens deesse, non minus equam cum crasse salivata, diabete causam collocant: ut vero cum plurima, sine hepate, aut vicariis ali-



urina obstructioe, hujus morbi exempla habemus, quam ipse sub ictero diabetici vix aequat, ac rarius forte, pro causa tam communi, effectus, quam ut aliquam hanc copia secretationem tentat. Sicut, qui potius in squariditate, *heretica*, et in *arrimilatione* et debilitate internam pendentes defectum, quam praefectum, aut alius in causas, hujus culpam ineptitudinis conficiunt; sed cum plurimorum, qui diabete laborant, *faeces*, et symptomatum, quae stomachi laetiam nobis indicant, abundantiam consideramus, non hanc quidem fundamentum falsum sit firmo videtur opculo. Cum vix tam docam, ac saepe squariditatem in diabete raram observamus, et simul ad urinae copiam ingens quavis quamplurimum repetitionem respiciamus: non parvi illo ipse in organo hujus morbi, tam in arteriarum rebus arteriae obocclusionem, quam in vasa venarum obocclusionem in eam actione, et in aqua copia atmosphaerae ex parte ab illam recipia, erigunt eo magis derivant, quod complice vel hiemali sub frigore, vel a sereno, aut quanno, vel abdominali a stercore, unde quicquid, univiam non quantitas et paller sequenter. Interim, praeterquam cum ipam, quae ad eam non proficit, *necitatem*, non

modis argumentis pro effusa, quam pro coacta agnitione declinare querimus; cur tamen hic error, ac tanta errantium in diabete deliranda observentur, hanc sola quidem ratio explicare non possit. Quod sanguinis hoc in morbo regulariter in auxilium vocatur: hoc, crochis in illo, necesse videtur, necesse carnosam consumptionem, — chronicam diabete extensionem, ac aliam sub eodem integritatem functionum consideranda existimus.

Tam facile aliorum de curis diabete subvenire opiniones, — ac tam difficile est, his ipsi meliorum subducere? Sed proprietas illas esse censuerat facti proprietatem scientiae, quam hero faciat, humani cum sanguinis discrimine, expendere.

cap. VII. 1788  
p. 101.

Quod si tamen, quae curarum sub aliquod examine se nobis obtulerit, optineant, alioquin subducere iudicio hic resurrexerunt: hanc oportet, nec, sicut in ratione exine et animali venio, aut homini cum interna culpa inerte, aut sponte exortu in corpore exalto, ac facili in nervos precipitaverunt, hanc et opus regulam derivamus; — ita videtur liquidum derivare, ut potestatem diabete symptomis, et consensu eodem in nervos stimulo, ad

*Imprimis ex systematicis Sympliciter actum prae-  
ter modum irritare, replicandum est, ob ra-  
tiones non paucas, replicandi. Certe, si diabe-  
tis asperis ( §. 480. ) dicitur, quod Medici  
ex Visceribus praecipue, ad unum etiam, con-  
firmant, diabetem per morbum induunt, ut  
veridicum, ad fabulam haud aptum, iam non-  
numquam opitiosius exposuit argumentum ac vel  
nolentibus obstat. Sed ejusdem naturae vi-  
rus potest sub variis viris possidere, vel et  
interdum sub febribus tam acutis, quam inter-  
mittentibus, in corpore humano praeparari: ex  
adducto Sympliciter spontaneae exemplo, et  
ex multis aliis, in quibus sub ipso diabete  
haec aequae comparat, ut fallitur, ut satis  
apparet. Hoc ab aetate, non modo, ac per-  
tinet in systema Sympliciter agente, nec re-  
sistentiam vasorum ad quaecunque repetitiles,  
interius, exterius, ad aetate, stomachique ca-  
pam, ad cutem ipsam, incutitur ac morbos  
laesit officium. Hinc primum diabets sym-  
ptoma interius aliis est, et exterius vasculo-  
rum ichthiosis ocula, quod vix animalis  
ac non in ore ac faucibus existat, hoc to-  
tius promptissime ingurgit, ac vel perpe-  
tuum elidit, vel cessantem in istis or-  
gano praevenit, ac incipientem bibendi re-*

contineri his in locis indicant. Similia in ventriculo, retentionem contingunt: ac non modo *faecis* murescere, arteria in ventriculo, vel et synocha acuta, sed *chylus* abili, non adeo ob *concreta* delinquentem, quam ob celeriores resorptionem, via *autem* in abdomen subacti, crudioris, accedens ad vias trachinas profertur. *Faecis* rursus reabsorbentia non colorem salientem in subiectum atmosphæram, insolitum exoritur, ac videtur quasi corpori alieni copiosum, quod ex illa offertur, humidum precipitauerit adhuc. A tanto liquidum undecunque resorptionum corripit, contritus cum potestate tam aride longinquitate ad recti directio, secretis cautea languent, pelle aspera quasi corium exaritur; cum in serie materia coluit, que non modo *liquida* inguit, sed, brevi temporis intervallo, retineat *aguti* pendat longe superat, abundantius *supergit*, principium nutritum, cum illud, quod ex alimentis quotidie novum haerit, atque, minus robustum, potissimum teneantur substantias elegantum constituit, — cum alterum, quod in animalium huiusmodi partem convertitur, et, cruce per recti dissipatur, ac *ad*, et *venas*, ad *metabolismum*, que cum illa, que in recto sequenti ex *lactatione* distans

vel *galactorrhoea* ( §. 332. ) contingit, quamplurimum conspuere videtur, coctioque increscit.

Illic morbi tam obscuri originem confirmare videatur cum inexpectatus ac citatior plerumque diabetes ingruat, tam ordo ac certum symptomatum non minus, quam laedens illius ad vitam, aetatem, temperaments quocunque, ac ad debiles aequè ac robustos ad homines, extensus. Diabetes, quem aciem nullius praecernerat, conservatum in laetis medullis exemplum non minus hoc spectat, aequè vinculi, vasorum lymphaticorum actionem non in solida ( §. 339. ), non in solida aegrotis, idem nobis exiit. Nec aliter, quod nobis in vire obstrua tur, cui *diabetes*, dum parulas saepe aperit arduas, dolentes, ad coem proditum, illic ( licet iterum ut longum post moram evasit ) disparuit, parvi laedendum esse potamus confirmatum simili alterius observatione exemplum. Quod si vel *insipidus*, vel *dyssipius*, ut vocamus, diabetes difficultatem hic pariat: hoc somnium, si primum, ex stylo in sanguinem suscepto pariter, ut praequam hic per urinas exeat, in urinalem acetum jam magis, ac in diabete nullius locus est, convengo. — alit-

ram, si ex sacro chyloso secundat ad vias copiosius aliasque absorpto, per potius tam copiose non hauriam, minus dilato, decurrant, non improbabili conjectura solvantur.

Quod si illorum, quae hoc in morbo praesentia auctora fuerant ( §. 483. ), licet admodum inter se diversorum, agendi rationem diligenter examinet, haec omnia in eo consistere videtur: quod stimuli, illi, quae morbi aucta excreat, oppedita, abdominales praecipue in nervos agendo, rursusque in istis et in duobus percutit conditionem immutanda, et in universum, hoc ex loco, nervorum systema percutit, lymphaticorum vasorum receptacula in opere intemperantiam immutavit. hoc scilicet modo, licet minus intellectu, sicut illa, quae resorptionem vasorum actionem intendit, hydropem longinquum tunc alio, tunc retibus expellant: Ita laedens in diuturno medicatione, moderate soluta, rursus hoc in systemate impetu, tam vias internas extinguunt, per accumulationem chyli, quo venter in primis viis obligatur, motum auferunt; tam denique cuticulae inhalationi praeripere a natura limites assignant. Qui sicut rationem in morbis intelligit: haec latere non potuit, a paucis interdum hinc corra-

pra, circa stomachum collecta, a cibo parti-  
do vel acri, ac sale condito, a minima inges-  
ti ventris portione, quia solo a hepato, ac  
dolore abdominali doletis, huiusmodi non potes  
desiderium accendi. Nec ignota esse possunt,  
quae a viciis in ventriculo, hepate, re-  
gum, in fimbriis ac vasis in organo contig-  
ant; et ab acutis per doctum cholelithem  
ad hepatis dolorem, vel ipsius hydrophobiae com-  
paratum symptomen. Illud mirum non erit,  
si et venter interdum *phlegma* ad caecos in  
partem a quibundam revocatur: cum locum,  
hoc a stimulo, spiritus non raro tam quanti-  
tas acri, tumidum, vel laevi adiacens, sub-  
albescente videatur; et cum in uno et eodem  
aegrotantibus incredibilem amaritudinem terricola-  
rium in uno *diabete* non praecedunt, quae  
perpetuo comites sit, copia. Sed nec ad co-  
la animalia, nec solus ad urum, huiusmodi vi-  
detur principii parientis, cachectici, mor-  
bosa caecis, excutis. Vel ipsi *plantarum* ad  
falsa ex sententia non raro quomodocumque  
liquores, ad utrumque spiritum regnum usque, con-  
cedant, et iunctis, quibus huiusmodi, ac totis-  
dem paribus, afficiunt. A ceteris hominibus,  
ruder, nullis *diabete* instructis, non quod  
comparat; ac talem auctor colligantur inter-

quam cum insolentem, non tantum suspicatur  
( §. 4<sup>ta</sup> ). Dalmatiam rursus in morbis  
alii non jam tam dixerunt ; ac tota cum  
gallicanorum plurimum, sub fine morbi le-  
thalis, benigni et ad salutem usque evadit  
doleris spem. Vel ipsum acrius ardeat :  
in uno cum aratro, dalmis aliquando ma-  
nifestum reperit ; ac fortis cupiat, quem  
seipsum, saccharum et sulfureis principii per  
cheimica distillat iactura, tabulis, quam  
distillat insit, aequalis potestatem reddere  
suble piam rationem.

100

§. 482. Ex dictis (§§. 480. 481.), quam  
variis modis infirma plerumque sit progressus,  
jam satis comparet. Non desunt quidem il-  
lic, solitari sub oculis, curae hinc inde,  
quae opera erigunt, exempla, et ex novis  
alios infirmos occupantur auxiliis: sed  
ut ex viginti, quae uno celeberrimo a Medico  
contingunt saluti legimus, non unusquidem hoc  
a morbo liberatus est, nec et qui perfecte  
apud nos convalescere videbatur, et optima-  
tibus per plures jam annos laetaverat, ab eo-  
dem, et nobis per litteras narratis, morbo  
quo praeceps prorsus iniecerat, prostratus pe-  
nitit; alter vero senilem sub tempore, quo



morbi et alias, licet tunc minus, respiri consueverat, ad eam se semper dirigunt ex. Hinc acrius magis, quam juvenes, periculis hoc a morbo laetare, nisi propius eadem ad omnes simul morbos evertit, vix dicere solemus; nec, an, filius magis homines, quam alii, graviter a diabete plerumque, et ducuntur ab aliis, satis certo perspicimus. Ubi labels jam hinc symptomata hinc morbum contrahunt, tunc citius in periculum, — sed interduci adhuc per annum et ultra vitam periculose degreduntur. Vix non oblique et hydrops diabete senescenti adhaeret. An et hydrops interdum in diabetes deinceps converteretur? Argemus certe, qui rheumatica pleuritide, diarrhoea simul ac pedum oedemate affligitur, ad Cliniciam depositus, in curiam, cum paucis primis latis hic incidit. Postquam a morbo dum segregatur veline, venter subidet, sed alibi ac tamen laetificatur. Nec potum longe superant urinae non debent, ut quotidie, licet aliam copiam temper faceret, ad quadratum, aut decem et octo, mensura viginti quatuor ad libras pallidas ascendunt: donec, morbo per dies adhuc uraginis et argenti, eadem tenore, prostrato, extrema sub tunc argentea expiatur. Jam acri-

has compressas hydropicas, quibus aqua, vel spiritus ad parvum intervallum datus, per crura impetente proficerent; quibus, insignem ad gradum maciem, pelle, lente ac secum, ab ossibus peccabat; et qui, cum de hydropis tam feliciter, devotio lucubaret, post pauci-modo dies exhausti, Inopinato et cunctis inter congregantem amicos, et finem, considebant. Facilius urisaret, quod in lris negleximus, tamen, non solis modo aqua, sed meritis principum et per vias cum lris praecipuam, in talia attentos docuimus. Qui morbi alios etiam constituit, totum diastem non videmus.

Cur. §. 483. Sub tanta caecitate, quae diabem inducere credimus (§. 482.), ambiguitate, ac delictis caritative, quae vel usum, vel aliam ex illis, et proximam, coartaret, sub delicto, vix aliquid hic a nobis expectari censeamus, quam ut ea, quae pluribus profuerint, — atque illa, quae nobis aliunde hoc in modo rebus persuade esse videantur, exponere moliamur. Nulli plerumque Medicorum auxilii spes egens est, quoniam ubi majores remedium divites pro una eademque agitudine possideri gloriantur Theoretici; atque in

ipso diabete tam effluo, tanque totocaria le-  
get se auxilio laudari ferunt, ut vel ex hac  
sola ratione modesti inconsumpta, plurimo-  
rum jam aliis manifesteque inertia.

Pro varia scilicet, quam diu quique de-cur-  
rit diabete formamur, idem (§. 482.), sunt  
stimulantis, roborantis, adstringentis, anse-  
sedantis, sedantis, nunc vero calculo adversa  
vel et resolventia, et stomachica, et diapho-  
retica, vel diuina antiseptica, in diem vo-  
cantur remedia. Hinc ali clement aut in pol-  
vere ( N. LIX. ), aut aqua lactis colopum  
( N. LX. ), hic tres in die, a scrupulo ad  
drachmam, pape diuidiam, aut ferunt, aquas  
maritales pro gaza, vel cordiam Peruvianam,  
aut quercifoliam, chabarbarum, gummæ Kino,  
quæ ipsam machinam tractant ( N. LXI. ), a  
grana quinque ad decem, ac sensim coniungat ad  
triginta cum aqua, vel in balneo ex frigida,  
vel reman faciat compressione, in usum  
intervent; — alii ad aquam et calce parant,  
— hi ad ea, quæ obstructions remanent,  
— illi ad amare ciborumque digestionem fa-  
venda medicamina coniungunt; — vel calido  
ali ex balneo; et variis diaphoreticis, im-  
primis vero ex polvere Decuari ( N. XXXII ),  
a grana decem ad viginti, triginta, quæ gra-

lactem ad octaginta, quodlibet ad octiduum por-  
recto, auxilium petierunt; — alii, quae angui-  
nem concolorem inspissarent, vel seria in eo-  
dem levarentur, depulverem cum lacte por-  
recta, mucilagines, emulsiões ex gummi Ama-  
lico, tragacantha, vel, quae possident solutio-  
nem arenterem, aculeptivā ex cortice, vel et  
aristā mineralibus, praeforanda cur duxerunt;  
ac demum alii, ut cutis spinacula, quae aequam  
atmospherae ex aëre nimis aride haurire cre-  
deretur, obstruerent, pellem integram cum oleo  
solente ungendam cur petierunt.

Ex tam contrariis latis et emediis tam  
pulverem Dobsoni, tam cantharidalem tincturam  
et alacra, frequentius, quam alia, posuimus,  
apud Medicos Scripserunt — sed in propriis ne-  
quaquam diaris, reperimus. Ipse diabetis *paralyti-*  
*de*, ab exhibitis modo dicam tincturas praedi-  
cat guttulis, posuimus quidem, sed cum do-  
lore, mingebatur citius: suspensio medicami-  
ne, dysuria disparuit; coque iterum porrecto,  
remedium quidem pertulit, sed victus jam  
morti auxilium non habuit aegrotans. In  
die, ejusdem tincturae dosis gradatim ad drach-  
mam in die adauimus: sed licet urinae hac  
sub methodo diffundere non prodierat, earum  
tamen copia vix quidquam incrementi fuit. Eē.

lactari cum succino ex acuris quoddam *di-*  
*stordius* uos, velius emplastrum oculi-uro  
 importat, atque *dar* ab hoc morbo agrosan-  
 tes restituit. In ipso vero *diabet* mellis, in  
 quo nec alimen, nec cuncta caechandus,  
 nec pulvis *Demri* cum emplastris, nec cordi-  
 cis *Peruviani* cum *simaruba* decoctum, nec  
 denum *myrtha* cum sale maris, acilli quid  
 poterint: ab *anas* foetida, cum extirpato  
*myrthae* aquoso et *Valeriana*, uos, complens  
 urinarum decorem, — ac tandem a cer-  
 gre *am-vicari*, bis in die a grano dimidio  
 ad granum integrum porrecto, perfectam *va-*  
*lentinum*, quam lactar simul victus confir-  
 marit, obtineat.

In gaude, sub cura principii nutritia per  
 urinarum iactura, atque sub famis uos indigenter  
 in plures uigore, alimen ad eum simul,  
 quae vici in malo tam diuina nunciat,  
 quantatem uigore, atque talia, quae cuncta  
 nutrio abundant, quin eadem vel leuiori  
 digestionis sub opera profundunt, elagrandant.  
 Quam uolentis hoc opus in plerisque agros-  
 te abolitur: hinc iola a cibo leuiori et cum  
 simia facilitate nutriendo, nec noui lattu-  
 ty stomacho et ardore concedant; vel *thy-*  
*mus*, vix a ventriculo descendens, a potu tam

large abicitur, et diarrhoea sub forma, quam emulsionem esse possit, expellitur. In aegrotis, cui alias sub diabete quatuordecimur fluctat, urinae copiam quidem, sed expertam dulcedinis, observamus; ac sunt aliae diarrhoeae cum lotio ut dulci hinc inde patenter, dulcedine fortiter, sub alio noceri vitium maneat. Potulentia hoc in morbo diversa, haec igitur cum saccharo semineam, vel equali cum purum ceraso popularum. Interrogatus, quid ubi minus officere, anque illis magis extinguerent sentire potuisset, aegrotus, vivens ego respondit. An aliquid aquae superaddidit, ut et aliam in moribus magis fuit, et liquida, ac cito aliis per eam ut erat videri videretur, celaret, in diabete conducere? . . . Haec acida mineralia cum potu semineam velipant, quod sciunt, non habere aegroti. Qui sciam in potulis vitiis praedominantibus laetari auctor pro causa aspicit, hi aquam ex calce puram cum lacte commiscunt; sed morbum, hoc potu non finant. Melius simulio ut anodyno et cum gummy Arabico, quibusdam conduntur videtur. Sedens in diabete, si partem universalem complures, a rapido expellam balneo promereri conprobat. Nec quies aegrotis,

aid breve, solutum concedit. An *Salsura* superis hanc causam conestugem sustinendo, morbosam simul viscerum recondentium actionem inveniret? Ab eis, quod eam efficiunt, urinae copiam incideri non videmus. Cum vero foveret tam insigniter hoc in morbo, nervorum, ut putamus, ex vicio, discomode observamus: an fortiter nervosus, vel excitatus cum eodem saepe condonatus! ... Qui morbi, de quo agimus, raritatem considerat, in talia a nobis debet, non *forte*, propositi condonabit.



## O R D. I. G E N. III.

## ENURETH.



Enureth  
Enuresis.

§. 424. **Q**uam pro urinis, ne, perpetuo  
fuerint molestas, laedere cupiverit, in pel-  
vi aqua recondidit, alvus, hic in tunc ani-  
mali per horas ut multas transcursum sibi a  
restitus livorem, quia stimulum percutiat,  
construat, dures et mole, et pondere, et  
accedit impuri liquoris adfectu, pro potu,  
ciborem, transpirationis tutamen, ac proprias  
capacitatis, stabilitatis, conservandis ratione,  
admonuit, non sine primo voluntatis arbi-  
trio, si sua, vel abdominalium muscularum,  
diaphragmatis auxilio suffulcat, coactum vel  
placide, vel cum impetu expellat, ac, si ali-  
ter modesta, occupatis horum disponat,  
detrus coarctat. Hanc loci, vel medio sub-  
stantie, retinendi potestatem occasionis ani-



multis non proprio, quâ deest, sphincteri, sed fibrâ a musculo, quem ani fructorem appellant, in subsidium vocata consentit: ut quo prædysphinctæ, sub alia flante, laxate, spina nullum, quem comprimentis, aut compressæ vesicæ imperium agnoscit, ac volenti animali subreahitur. Diversis namque in morbis, quid quod apud pueros profundo sub somno, ac in sena sequiori, cui debilior ad vesicam est custodia, sub variis positionibus, similibus leventibus contingunt: ac lortem, vel minori quantitate collectum, evaporationem, frequentia, non dolent, intermedium exposcit; aut antequam se homo ad mictionem composuit, vel volenti prædysphinctæ ex urethra, — aut somno detento in lectulo subigat, — aut lecti, defunctibus aegrotis per vias naturales, vel et alias, morbores, quod exureis, vel urinae involutionibus vocamus, effunditur.

§. 485. Exureis hinc est lecti vel urii, nocturni vel nocturni, incedens præter arbitrium ac indolens ex urica per urethram, aut per vias non rurs, ulicidum, productum; vel potissime uricam coactam sublatam aequilibrium, debiliat, aut perfectâ abolito.

E 1



*Collection.* §. 486. Diversa fœdè traxit morbi (§. 485.) natura est: atque sunt pueris colicæ, aut læsæ hœmorrhoidibus urina profundè, et repleta est materia; sunt vix adulescentis de nova collectione, præsumptæ ad emigendam se sentientes quæ parit, præcipitæ ( *Exer. incompleta*, — aut sub acuto, vel acuti delirantis labile ) ( *Exer. ætatis*, delirans ) subdole insidit hoc littrum; — atque talia vel ipsas veritas ob morbum ( *Exer. insuperabilia* ), vel ob causas, quæ in ipsa non videntur ( *Exer. symptomatica* ), vel rarius ( *Exer. accidentalia* ), vel, contraxerunt contracta, frequenter et longè per ætatem ( *Exer. habituali* ) contingunt. A diabete (§. 478.) distinguitur morbus, quod lotium in ista, atque copia, atque sapore, cum illis urinæ conveniat; quod ista cum lotione non urget, nec rubei sagittationem emittit. Incertum, quod in superioribus jam dictum est (§. 479.) cum diabete ætate interduci compingatur, atque diagnosi difficultatem, nisi attentè in singula animo, non parvam oportet. A dysuriæ, ætate differentia, ob dolorem, ardorem, quæ illam continentur, ut facile emittit: sed et hæc affectiones subinde conjunguntur incidere non implent; ac sicut ipsam urinem, lit-



positum licet, appetitum circa rem sexuali lascivie hanc raro concupiscens, ita ut non abirelli dolore, urinam subinde et cum dolore, praefer voluntatem, in illis, qui abstinentiam aut alicuius visus ad collum, vel ad potentiam parientes, erant videmus.

§. 487. Viri alii, quam recensita haecque Symptomata.  
(§§. 484. — 486.) symptomata, vel illa, quae proprio venere, vel illi hoc in vias agendi morbo conveniant, in curam perferant. Interim et fortiter indigne, qui coelacum urinae profluvium comitatur, atque a quavis societate humana appetentes excludit, et facili gratulatur, periculi a tam acri liquore modo, interviço (§. 397.), hoc sperant. Paucissimi imprudens, ac senes, emendati est morbus; sed et *foeminae* jam partum expertae non raro hinc subiacent; et in genere hic strus, ob dictas rationes (§. 484.), sub impetu, sub violentis vel hanc, vel tachione, urinae petitionem non raro hanc dimittit.

§. 488. Quid in affe animalibus, — hoc et in homine, non ad vici sociali urbanitatem ac moderatum, sed a sola natura ad rati-

prædictam educto , contingere videtur : ut , quo loco et tempore ab urina vesicam stimulari possint , hoc statim ac sine dolore hanc alvum exonerent . Ancasterorum pulli asinus- sum , homines et peces , sub somno urinam deponunt , nec quidem sentiunt : sed certe mul- ti tam longa et incommoda , quam homines , et infans animal ; nec prius adhuc plenis destituta vesicula videm , ut porci , con- spiciant .

Deinde.

*Pseudophtisicæ debilitatis* , etiam rationem apud medicos ut causam censeri cum alia ad- mittimus : sed qui talem apud infantes aut pueros in et ipsos sub somno relinquunt ubi- que reperiunt , hi aut vident pseudophtisicæ majoris , aut propriæ huius ætatis incuriæ , aut incommodi , ac prave consuetudinis effectus cum vera debilitate confundunt . Non infrequens est interim inveniens hæc ratio : ut vel a ca- mi , contusione ac vulnere perineæ , vel ab ani , vaginæ , uretri , prolapso , ab hernia ve- sicae , a calculo , collo intus distincto inheren- te , vel rudite extraneo , a parte difficili ac longa , a viro sub uræ ferina , vel ad alvum retrahendam violentia , ab inflammatione col- li vesicae purgata , a spume huius vi- soris frequente , a Ventræ obitu , cunctis ho-

[et pars cetera non raro debilitatur, urina-  
tur, descenditur, diuturnius, et a sphincteris  
officio remouetur. An corporis totius debili-  
tas sine vitio locali enuretis apud infantes  
semper producat, dubitamus. ]

Frequens, neque cum sola debilitate confun-  
denda, incontinentia urinae causa est *paraly-* Paralytic.  
*sis*: cujus origo nonne ipsam ad cerebri, —  
plurimumque lumbellam vertebrarum in parte,  
— interdum ad nervos colli velare ac para-  
dosphincteris, delinquit. — Ipsam quidem veli-  
cose totius motus dequiescit, quam colligit  
sphincteris totius paralytic, hic a cerebri de-  
scendit, ac vitium cerebri oppositum, rursus  
urinae, si vitium ipsum remouetur, inducit:  
sed proutque uterque hoc mali genus non  
suo conjunctione et eadem et causa procedat;  
interdum ad sola nervorum, qui paradosphin-  
cteri conueniunt, principia vel decursum,  
hinc pathologice sentiens id ubique non in-  
ducant, merito causa haerere videtur. In febrili-  
bus acutis, acutis, acutis frequenter, quod  
et ceteris hominibus contingit, urinae per strin-  
gula vel uocis, vel delinquent effluent: ac  
primam urinae, mox et qui sphincteris offi-  
cia possunt recedant. In multis afflicti copu-  
losi, paraplegia, hemiplegia, hydrocephalus

interitus, ventriculorum cœcetri hydrops, erythra, costusio, concussio, laceratio, fractura, caries; excussio vertebrarum, hydrorachis, aut hydrops in omni hac specie, a nobis vel adolent apud homines aliquoties conspexit, depositis rheumaticis, vel aliis, inflammatione, abscissis, excussis, plerumque cum velina remissione complicatum, nec insuper hanc velam, producit. In aliis, calculi, nec fistulae ad usum concepta venter, aut longe in balneo frigido remora paralytica sphincteris pro effectus habebant. Hoc igitur vitabatur ad inferiora velinae segmentum laceratae, vel abscissae sub statu, urina vix urterum ex oculis in hanc alveam delata est: cum hanc liquorem de clivum per vias mox destrit, ac rive urina, urethrae per urethram obocione distillat.

Veritabilis  
causa.

Sed vel costusio ex vitio, sensibilitate, insensibilitate ad superficiem velinae internam intemperantia, vel nativa, vel per ipsam contractilem lacerata, vel ex offensa quocunque colenda, urinae frequentia, quam parva, nec et parva voluntatem reddunt. Socrate, qui lotique ut dicit, — aut, qui per parvas modo hanc, irritabilem esse statu, hoc Equidem acinuat: quae diversitas non a sola hujus alvei capacitate nascitur, majori, —

sed proprias accidentibus a gradu, vel a consumpta vires aut frequentius aut rarius mittendi contrarietate, dependent. Quæ, ab ætate selecta, forte ætate vel partu ætiora, vestigia alluant: hæc, licet ardorem necdum, vel dysuriam inducant, mitigandi necessitatem in pluribus non augent. Defensorem hinc a causis frequenter proficiuntur curare, ac interdum uniuscujusque familie proles ad usum ætatis hoc vitio, non semper sine labis congenitæ, cephalicæ, arthriticæ dispositionis conspicuæ, laborant. Sic omnes parvorum a podagra rectorum filios ad pubertatis usque, tempus ætatis victoris, quæcumque decem ministrarentur subsidia, perisodice afflicti sunt novissimæ. Vix monacha filia præceperat, cum sponte ac præter opinionem hic morbus dispartiret: sed brevem post ætatem, hæc ipsa speciosissima in ætate, licet corporis elegantis formæque habitu gauderet, confecta, et hospitibus hinc inde ad curam vocata est. Quibus aut rem a calculo, aut urethra ex blennorrhœa indicatur: his et vicia reddunt morbosior; et hac ætate ætatem dispartit, hoc recuperationem a vitio, quæ pridem solent, utique quantitas ad latus exoritur aut dū soluitur. A rheumatismo,

cutaneis velut affectu, a chronicis hujus visceris phlegmâ, a sanguinis mensurâ, hæmorrhoidibus, his ad partes congestione, quâ dolores ubique se prodant, — et interdum, ut diximus, a solo cum partibus aliis coarctato, hujus alvi sensibilitas et motus frequenter necesse est non raro incrementum. A spasmo vesicæ, vel abdominalium musculorum violento, urina cum impetu expelli, epileptico-rum exemplo comprobatur. An et verum simile vericam humanam cuticulatam? ... Apud asinum cum urinis excretae, et qui rariis in revidet, ac, prout nos ipsi contempimus, in ejusdem animalis urina, reperti sunt vermes ascarides, a polypis conserucentibus his locis interdum reperiescit, ab organica structura dissoci, vericam in vesica repererunt exempla de hominibus, a variis Scriptoribus adducta, confirmare videntur. Ex recto intestino per alium in vesicam intravit, ut quibusdam, — sed, quod casus exemplum quasi nos docuit, non de scribis dicendum est.

Vericam vesicæ  
BACCHUS.

Quotiesque vericæ carinam immittunt : ut ejusdem, ab utero unctis, cancroso, hydroptico, vel strumate precepsa, vel et acri subacta, quæ in teguro pathologico possidentur, vel polypis repleto, vel gravida,



si foras egred, aut claudat, a mictholinctis, mucocoli, vesicularum ventriculorum, angustatio, compressio, — membranarum, quae vesicam component, vel naturalis, vel circa collum, ab ulcibus, a calculo lacerata erantia, callusata, — excrecentiae fungosae, polyposae, laceratae calculus, ramosi parietis, scleritiosi, quae vesicae portualem solutionem occupando, colorem ab eadem excludunt, contractionem aequalem, sive pseudo-sphincteris actionem impediunt, vel integrum necessarium perpetuant; — haec dignis non curantur, mox virtutis huius oppositam, mox illam cum isto contractionem, continuant.

Haec spectat vesicae, vitio aut congestio, aut a progressa inflammatione, exaceratione vesicae derivando, per vias hanc naturales, atque voluntatis imperio nequidquam subiectas, ex hypogastrio, umbilico, perineo, intestinis, contingere oportet. Sic vesicam sub abdominalis integumentis ad pubem prolapsam, ac dupli-cemqueque cutis obtusam ligamentis perpetuo auxiliantem, *Brachyruum* in juvenes, ac in senes infantesque videmus; post longa lachryas urinae per tractionem ubi vias aperitur, experientia cognita; a mucocollis cohaerentia cum vesica cohaerentia atque coarctata,

leses, et fecunda communicationem, — et quae similitudinibus interiorum veritas operum in vivo a dysentria, — et in aliis, ab haemorrhoidali inflammatione conceptis, observamus; ex prostrata organisatione, aliis venereis, aut ex calculi sectione, frequentes ad peristaltum urinales occurrunt fistulae; ac medicibus non paucis a parte difficili, artificiali, ex lacerati colli veritas, ac ventrae inflammatione, coarctatione, ac subsequente laceratione vel aliter, urina secundo per vaginam aut aliam operando decurrit; urinae tribus in viis, in exemplum hic adducis, nunc dicam, nunc facies per urethram existeret designamus.

proposita.

§. 489. Catarrh ex enuresi ( §. 488. ) incontinentiae velut specibus, quo et propolis est prognostic. Quaevis *diffinitio* pro cito agnoscit, nec diu contraheret, — quae modo sub nomine profundo, longiori contingit: ex remedia, opportuna vivendi ratione, adhibita, vel sponte, crescentibus aetate, dissipat. Quam homine, 'postquam' inducunt, haec repetitione cito incipit dissipat. Quae ex pariter descendit incontinentia, et, nisi cum illis mox ab initio rubra, perito,

— ac si eadem autem non licet, nullo tempore mutare. In mobilis acie, eorum, cum simul alii eorum propter arbitrium accedat, inquam, non tanto ubique, monere praesumet. Quae ex multis viciis munditiae proficiunt: ea, si eorum lites displiceant, vel eorum acie et opibus accedat. Ex pueris est eorum, quam vivere viciis, aut pueris viciis, regnum lites: atque de mali de quo agitur, et eorum, quibus debet, consideratione politica eranda est propositum.

§. 490. Ut quodlibet alio in verbo, de et in causis, principium causae nominum in causa removenda consistit; quod cum frequenter obtineri non possit, impeditur, ut nullum hoc in sua methodum agilitate admittit.

Nascentem ex debilitate incoercitabilem, <sup>Ther. in do.</sup>  
<sup>fol.</sup> alio protractum nimis, corroborantia, excitantia, ipsi loco adhaerens admois, deficiente dispellunt. Hanc reperta partem viasorum in frigida immittens, filijs, vel spiritum, aromaticis foementis, histerecom volatile cum alio medicis expensis, perianis appolita, dyctis brevisse cum camphora ex cortice deco-

co, quod ultimum et interius cum rhubarbo aequa portione addibendum est, praecipue indicante. Interdum tinctura cantharidis a quibusque guttis ad quatuordecim, viginti, cum debita cautela, bis in die, ex aqua potenta auxilium concutit.

*Enur. et par-*  
*alysis.*

Non multum diversa, vel longe difficilis, ac pleuraeque talis, est natura ex paralyti cordis. Praeter ea igitur, quae morbum pulmonum, aut praegressam apoplexiam, paraplegiam etc. consequuntur, cum dicta jam remedia in opem trahenda sunt, tum veniunt illi casus impendendum, regis lambello linimentis volatilibus cum camphora unguento, viamque electricitatis, ab omni sacri coelacini ad pericardium dirigenda sunt. Iniectiones ex cortice Peruviano paratas, hoc veniat sub stans, per urethram mox rellatas, atque in illam universali paralyti nobis, licet tentatas, perperam praestiterunt.

*Enur. et enur-*  
*dis, chronic.*

Quibus urinae ex alia veluti irresistibilis, inevitabilis, vel citius, frequentius, quam potest, vel praeter voluntatem se praecipitant: his, improprie primis, aut saltem moderna morbosae dispositionis origines, remedia ex causae typicae cogitatione petenda, atque hinc alia aliisque conducunt. Sic, ubi

supposito membranaceo, haemorrhoidum, pleuritis, tumore circa vesicam, atque testicul., nimisque mobilitati occasionem praebentur : hanc collapsus vel pedalis, vel ano, perineo, hirculani, vagina, fornicatio ex frigida cum aeno. Si ab seri rheumatico, vel alio, sensibilitatem perveram contraxerit vesica : remedia huc seri corrigendo, ab hoc viciis evitendo, idonea indicantur. Quam salubris hoc in receptaculo coeuntes irritationes inducit, hanc rectis illis evitit ; vel, si ab irritata operatione, vel post haemorrhoides jam abscissas, vel post alios spasmodicos affectus, vesica morbosam sensibilitatem diutius manifestat, opus est longa diu per clystera intestina infernus conducit. Balneum sub nocturnis interstitiis la se ipso refrigerantes ad vesicam tum potu copioso, tum cibis, qui urinae copiam adaugent, abstinere ; ut lactium, quo lactem potant corpore, deponat, advertatur ; ac hoc non ista, sunt illa, ex somno longiori, ac vesicam exonerant, evigilantur. Nec minus, nec verba, sed ratio et pater, aut acus major ad faciunt, habituali huius vitio medentur. Si fortis universalis debilitas cum circa vesicam sensibilitate conjuncta videatur : tunc chiuet

directum, ac caetera adherentia, — atque si per continuam venia abscondi videretur, ante opem, aut diu, quae longaeque irritationis causam deberent, in curam trahenda sunt.

Quae, et quae  
causa.

Orinthem ex talis experientia curanda via usquam Medicis dispelle. Interim si urethra mulieris ex parte difficili in vaginam aperiat, cathetere flexile ad vesicam conducto, ac laevo per illum tempore ut longe sollicito evacuato, raro quidem, sed interdum urinae per vaginam defluxus avertitur. Via usquam tam felix esse laevis, si vel ipse vesicae portum incontinentiam producat, Interim Genuariae modo exemplum juvenis notum est, cui vesicae abscessus cum recto intestino ut aperte communicans, vel solus auxilio naturae curatus est. Quam cupit foetus, vel uterum gravidus in vesicam extrahi, hanc usque facili sagula astringit compendio. Vesicae cunctae, collectae, excoriorum, nullum ab arte humana visum admittunt.

Quo igitur in quo curanda vesicae non licet, urina saltem, ac laevo spectaculo malaribus efficit, ac partem subjunctam erodat, incontinentia, quae Chirurgia pro statu quovis appetitur, colligenda est.

ORD.



## O R D. I. G E N. IV.

## PTYALINUS.



§. 491. **F**los triplex *aperte* strium in-  
nat, atque nobilissim, penetrantem ille vapo-  
rem ubique erubet; hic blandum, lubri-  
cantem lente eruat puerum; tertius insipi-  
dum simplicissimumque nudum nunc placide  
natura, nunc rapidum ac distans cum im-  
petu expellit. Insignis haec viscerum, pro cu-  
ra non magno, glandularum congestas vel  
sponte, vel aereorum impetu, irritatione  
quocunque, pressione cauta, profundis nec  
libris haec perungam saturigine, ut illam  
modi, aut vaporis in eos penetrant. Ex  
cognita hancque naturae humanae analyti,  
vis tanta, ut vel ab aequo poriori supplere non  
possit, nobilitas replendet; et adfusa me-

tione, penetrat namque sanguinem, hic liquor vitæ multum extendit: sed aliter non docuit digestionem ciborum sub rēnis ejusdem jacturæ languentis efficiere; — aliter observatio, aperte videtur, sub artificiali salivatione, hoc forte, principium vitale habet per vias, quæ in ipso diabete per rēnas, salivæ, — exportum hujus liquidi, cum uno in hominē nullus esse conserit, ectropiceum in aliis salivariis, in aliis dulcoribus languentis et mellisem prodidit, — sibi enim malignis, non vixit non modo principium depositionem circa glandulas salivales ubi videtur digere, sed per abundantem salivæ fluxum, quem aphitæ non proficiunt, non tunc disparti ( §. pr. ) — hanc ipsam liquorem postmodum hydrophobis vehiculum, cujus molæ per guttula hanc morbum in rēnas propagat, constituit; — ex omnes humani animalis incrementibus nullum a solo nervorum imperio tam valenter, quam istum intelli; — linguae glandulas salivales inter et testes, et mammae ( §. 174. ) et ventriculorum, et ipsa lenticula trematilis commercium exhibent: quæ singula salivæ digestionem cum eodem, tum agnoscere in hominē, abunde demonstrant.



§. 492. Quod si igitur salivæ hic liquor <sup>definitur.</sup>  
( §. 491. ) copiosus, quem nature ad usum  
regulator, secretus, aut continuum atque ne-  
cessariam digestionem exponit, aut ex ore pro-  
ter modum uberius distillat, aut ob ductus  
lacrionem se per gressu præcipit, *Ptyali-*  
*smus, salivatus* vocatur.

§. 493. Ptyalismus vel sponte ab ipsa <sup>definitur.</sup>  
tura promoveatur ( *Ptyal. spontaneus* ), vel  
ab arte inducitur ( *Ptyal. artificialis* ); at-  
que ille vel primarius est ( *Ptyal. idiosyncrasi-*  
*cus* ), vel morbi alterius symptoma ( *Ptyal.*  
*secundarius, symptomaticus* ) consistit. In qui-  
busdam saliva non semper, sed periodice ex  
ore distillans observata est ( *Ptyal. periodi-*  
*cus* ). Epidemicam interdum ptyalismum, re-  
currens, ut credimus, naturam accipit  
( *Ptyal. epidemicus* ); et crivius salivatio-  
nem febribus, cum aliis in morbis exempla  
variosa ( *Ptyal. crivius* ) habentur. Pty-  
alismum crivium vocamus, cum saliva ob  
ductus propelli lacrimam externam, utpluri-  
mum copiosius, quam naturalis per vias se-  
cretæ, distillet.

§. 494. Rarior spontaneus ptyalismus est, spontaneus.

quæ ex propria glandularum salivarium affectione descendit; frequentior ille, qui aliis sub morbis symptomaticè propulsatur. Quæcumque namque hic modo acciderit, oris animum continuo singulissimi liquoris, vel alimenti muci, affluens obstruit, et ad continuos vomitus urgetur. Spasmodum sæpe indolem a morbo comitatus salivæ eructum, æque vel loquacem, vel docilem aegrum, per hinc et mentem anomalo aspectu distillat; vel quæ classe fortiter ore obdormiat, hi suffocationem, ab insano per hærogem saliva, metu perculi, delirio a somno attentus. Rarum est salivam tam copiose secretam non alio simul vicio laborare, quo cava oris a phlogosæ correptum, ab ardore, calore ac punctis electrice loquatur. Interdum dolor ac tumor ad glandulas parotides, submaxillares, conspicuus occurrat. Sunt, quibus ob vim ad partem faciei laxitatem salivæ per ductula et pendula oris libra continue derivatur; atque illi vel sola comestudine, vel a copia salivæ indolenti, loca salivæ vicina ubi loca quæcumque inundant. Omnibus vero a quotidiana salivæ liquoris parva digestio ciborum difficulter absolvitur; et corpus, sub majori illius dispendio, quod

salivationis mercurialis exemplo docemus, con-  
taberetur. Qui acida, vel plagi et rursus  
ventriculi, lentissime abutitur laborant: hi,  
prævia æstione, et quasi *flammæ ac rursus*  
*per scopulagum accenduntur*, molestissima con-  
suetudine, insipidissimi liquoris quantissimam si-  
ne vomitu et magna cum levamine ex-  
crant. Hic liquor, licet limbo a pectore sup-  
ventriculo ascendere videatur, salivæ proxi-  
me ætatis est, et quasi metallicæ sapore in-  
fectus, cum rursus apponitur, anxietate  
reijicitur. Poteretur hoc malum sub hâc ma-  
nifeste frequenter molestari.

§. 455. Si maiorem nervorum in glanda. Gland.  
hoc facili conglomerata potentiam excipiantur,  
qua, stimuli desiderati odore, aspectu, vel  
alia percepti quondam sapore succedat,  
saliva cum impetu jam perit: non alia ex-  
tremis salivæ, quam aliorum humorum (§.  
446.) secreta naturam excedit. Quæ de-  
tremis naturæ nervorum salivæ præ aliis re-  
tentionibus, quæque sub formâ potestatis,  
non facile ac potius adaugur: hoc, dicit  
et lege considerari generali explicari non pot-  
est, ita certam humoris salivæ cum hoc  
metallo effectum, licet minus intellectum,

supponere videtur. Hinc similes quodammodo subtiliura perillensium morborum aetologia ( §§. 83. 92. ), etiam aetologia curat ( §§. 174. 176. ), atque etiam salivantis materia incognita, ut evidenter ostendunt; quatenus quovisque stimulus, oris cavo, vel ipis glandulis salivallibus admodum, ut a sola jam fumi tabacici actione apparet, eodem effecum producat. Sic drasticis difficilis sub opere, a dente carioso, a dolore, tra trismo, ut vocant, facti, a glagruant exaltatione, a frigore, ut frigorem inflammatione, mandibulae fractura, vel trauma, convulsione, quia a sola jam excitacione, glandularum, ductuumve salivallium a musculari compressione, a calculo sub lingua, vel in ductu salivalli horuente, copiosam argenti ex ore salivam profundunt; et ab aphthi decidua, non minus humorum ex buccis eversis accedit. Supponere ex pedum refrigerio, aliter ex causa, perspirabili vapore, vel orum steridione leuizata, vel menstrual obstructa, vel adeo sub menstrual in organo virgibus principio, spurorum introducti max copia arguit. Salivante praecedente, alvus durat, urina pauca, mictiones citare pauciores observantur, a diarrhoea sub-

ecta, vel pinguetioris advenit non raro ptyalismus dissipatur; ac ad salivationem a mucosulo praeventiendam non curios, quam tepor atmosphaerae, et aëra transpiratio, remedium habetur. Sed jam solus ad vesiculatum, ad lacrimas stimulus abundantem mox prodicit salivam. Ex natura, vomitionibus, copiose hic latex ex ore distillat; a scirho pharyngi, gastritis, cardialgia, a colico dolore, a ventriculi repleto, similia contingunt. Vel a sola conceptione, quanta non a gravidis sponsum rejicitur copia? et quanta non ab hyperchondriacis, hysteriis, melancholicis, ab illis, qui acidum vel rancidum in vesiculato substantiam circumferant, aut a pyriti, respirant saliva (§. 494.)? Ipse hinc ex pueris micture equibonitate, ad decem hinc ipsa hinc quotidie rejecta est. An sciam a copiosa salivatione dantona, et aëra ejusdem naturae puericuli hysse coctione detrahit? Abundantem super salivationem in viro comptatorem, qui paralyticus ad linguam, interte caput afficit, pene omnem hanc particulam, quasi robis laborantis, moram abolerat. Ceterum, quae a faciem, genarum, pharyngis paralyd subsequitur salivatio, ac plerumque non ex aëra salivae co-

pla, vel ex musculorum hanc liquorum coarctationem inertia, aut ex degeneratione impedita, per mentem delibetur.

Prognosis.

§ 456. Sub tam puro calvarie primariæ effluvia, prognostic momento ex historia morborum, quibus pyralismus et symptoma accedit, repetitur oportet. Qui sub sine morborum alia viâ iam iactura majori contigit, hic salutarem plerumque illarum per hac viâ solutionem sperabit; atque talem per plures hebdomadas cum evidenter beneficiis fluxibus conspicitur. Qui salivam vel ex mala et indocili consuetudine, vel ex rebus strictioribus, medicatione, ratione tractatis, copiose rejiciunt: his alborum digestio libellatâ, atque alia secretiones excretionisque immutari observantur. A fortiori, neque arduum pyralismo, ut ab eo, quem prius ad huius remedia curacionem promovebant, non minus ab hominibus debiliore iacturam, quam ab impeditis manifestantibus, atque ab acutis demergi rationem, extrema corporis debilitas ac modis brevi tempore inducitur.

Causa.

§ 457. Quae ratio mentis accendit

pyalismo stertens, hoc vel aliis hujus operis in loco jam expositum est, vel in sequentibus sectionibus traditur. Quae ex propria glandularum affectione descendit, variis etq; plurimis, atque ex nimio his organo pendere adnoto, plerumque, ut videtur, catarrhali, rheumatico, scrophulis, quam ex sola debilitate, explicatur. Talium nos ipsi haesitationes in juvene comperimus, atque alteram pyalismum, sex jam per annos vixit tempore recurrentis curat de fusca exemplum. Si calculus salivalem ad ducem aut glandulam eae circulo pyalismum inducat, peragimus hoc corpore praedicti sectione ablatum, importamus simul cruentum salivatio. Quam sibi methodum reconvalescentis pyalismum exponat, Chirurgia nos docet. Ex quocumque ducem circulo glandulas salivales lacerant, fontentatio tunc siccis in fusca, vel diutius cum herbis aromaticis atque camphora rectis, aut humida ex emolliente decocto, cataplasmate, ac calor loci sufficiens, moderatus, plerumque conducunt. Salivationem rebellem veretur adhuc appropinquat hinc inde moderatur. In aliis, balneum, et quae pulsum ad modum dispendant, evadendo alvina, praefertur. A salivatione vi-

## 90 PYRALISMUS.

superiorem laceratis in primario pyalismo  
vix malum expectantes; atque in genere  
retinendum est, salivationem, quæ morbo-  
rum ut virus incutit, non periculo repelli;  
et vel symptomaticam pyalismum, ac diffi-  
lis diarrhoea insequatur, cum prudentia ma-  
jori esse pertractandum.





## O R D. I. G E N. V.

## EPIPHORA.



§. 438. **E**piphoræ, et symphæmæ, quod ædempto-  
 oculosum inflammationem frequenter contri-  
 buit, alibi ( §. 432. ) mentionem jam injeci-  
 mus: sed, hæc profecti hoc genus varietate  
 prævarius ad fluxum pertinet, quodam exhibe-  
 rebus considerationem, et Medicorum atten-  
 tione non indigens, pro methodi systematicæ  
 mechanice intelligentiæ hic breviter recomen-  
 damus. Non parvis quidem animalibus lacryma-  
 les glandulæ æquæ distribuit; sed nulli ex  
 his tam durum ac frequens, quam generi hu-  
 mano, hoc de toto hauriendi impositum est.  
 Lacrymarum vero sub nomine tam rectum il-  
 lum, qui ex oculis et contigua palpebrarum  
 superficie desigilat, ut videatur, evaporat,  
 quam committitur hinc ipsi relinquit, et ex

Glandulis sibi propriis distillantem, humorem intelligimus: qui, licet ab operationibus solis interperandam viam debilitatem inducat, ab eoque tametsi hunc humorem aut secretandū, aut contrahentē, aut ab oculis ablegantē vident, incommodare ac fœdum aggritudinem, quam epiphoram dicunt, constituit. Naturam lacrymarum quod attinet, ea, si extremam oculi sensibilitatem consideremus, in propriis, non a longiori negotiatione exquisita, sed recentissimo liquori jam coacta, et ipsas adeo citius acorem aspernate salivellas, jam primo aspectu non indignam admiratione argumentum nobis offert. Limpidus nempe et inodorus, sed, si modo parca defluentis sub ophtalmia lacrymæ exempla excipiamus, ubique salivæ hic liquor cernitur: qui, ut recentior Gallorum analysi demonstrat, aquam distillantem pœne modo parum excedit; clarior belistropii colorem non habuit, sed maculam in alba vel a violæ, vel a malvæ mœo caerulea, constanti viridem indicit, super igne copiosius et aliquo remanente non destituta bullas max. contrahit; latus et solo ab arte exsiccatum, crystallæ ex parva parte marino et materia alalina composuit, — citius vero ab igne liquebit, reliquas,

vis partem contrariam et quædam contrahitur, olei et aque pusillum, ac tandem carbonem salis materia viscosa subministrans largitur. Hæc liquoris viscerum principia sunt calculorum, la cataracta, in oculo lacrymâ repletorum, quam crystallinum ex solido amaratum, sub ophthalmia ad palpebras observatam, hincis illuctram. Vel lypam raptam non tam raro cum lacrymâ et viscositate, vel caridâ, aut lavis coloris materiam citis lachrym palpebrarum hincis, exemplis veniunt.

§. 499. Epiphora igitur est lacrymarum, *excessus*, non tam animi dolens, quam morbosæ affectionis imperio induta, profusio.

§. 500. Rarior est, quam primariam vocantur, si licet, epiphora, et lacrymas plerumque ex alio, quam ex proprio hac secretoris organo vicio, abundant, aut palpebris assurgunt. Est lateris, ubi glandula lacrymalis, et de utilitate jam dicta est, a phlogosi levis contempit, aut quocunque demum stimulo agitata, vel libertati secretioni indulget, vel secretam humorum citis, quam per os, et propolis casualiter emittit videntur. Num

visu deficiat a praevis opthalmicis, vel a  
 stultis inmoderate indulta sine majoris acrobis-  
 tiae ratione, epiphoram primariam reliquat,  
 docturus.

Reverend.

§. 301. Evidentior in homine, quam in  
 quovis alio animali, sub tuii magis affectu  
 delacrymatio videtur; neque nil impedit, quin et  
 hunc vitae statum breviores ad morbos refera-  
 mus. Plerumque oculorum aliquis pruritus,  
 tremula pupillae innodatio, palpebrarum angu-  
 statio, alacritas, eripitio, respiratio inaequalis,  
 errando labiorum, haec procellae accenscent.  
 Nec horum oculis circumstantur tam a parentis  
 larymalibus accipitur, neque moribus celestibus  
 per advenas frequentius extrahitur, quem gati-  
 tatione per genus ac praecipit. Quam longe  
 inspiratione palpebrarum aerem profundius impu-  
 terant, hunc, à duplici gestu coacti, cum  
 impetu, ac ultra vocis inflexione per vias  
 expellunt. Sunt lacrimae, quibus lacrymae sine  
 fletu, ac facili palpebrarum per genus dela-  
 bantur, neque sub diuturno illarum effluuio,  
 calor, rebor, et quasi phlogosis oculorum,  
 palpebrarum, vix celata per horum doloris  
 vestigia reliquant. Vis autem haec, tam com-  
 muni hominum certe expressa, ad epiphoram

revolutas sunt lacrymas; sed vel ex causa per causas alias in glandula lacrymali contractione, vel ex impedito humore ad naves defluxu, hic idem, non raro manifesta simul assidue intrinsecus, per grana, quae interdum accedit, inflammatur, devolvitur; atque ingrate non minus aspectu, quam viciis obambulatione manifesta, oculos sub acuto quatuor lacrymantem constituit.

§. 303. Est aliquid in lacrymarum secretionem, impletis apud hominem, quod non satis intelligimus: flagitare nempe morrosi, gaudii, carere misericordiae in glandulam lacrymalem impetum, ut, si modo salutaris in moribus colliculam afflicti excipiamus, soliti tam salutaris, tam involuntarii, tamque compuncti in corporum membra effluat, — eo magis, quo sensibilibus est homo, apud infantes atque senes certe maximas, habetur. Sunt adeo lacus lacus, quibus sub fieri profusus dolore, aut amaro affectu, lacrymae, prout oculo ad astra volentis id jobavit, copiose prorumpunt. Interdum non ab oculi aeternitate, vel oculi et vicio, sed ab incognita nervorum affectione, similis in glandula lacrymali, quam a fortissima motore, acio

se prodit : ut plerumque sub fletu involuntario, seu per horum excessu, lacrymas ab hysterice, hypochondriacis segredis, cum nullam alia fletus causam esse sentiat, effundi videmus. A fortiori tamen animi dolor, lacrymarum secretio impeditur ; et, quod mirum est, a fletu lacrymæ abundantius non colliguntur inceptivæ solutiones obtinentur. Sunt, quibus ab coarctationem peculiarem, ab animi tamen laxabilitate longissime distant, nec moderantur, nec summos moeroris oculos vel usquam habent. Exillimes in lacrymas ex fletuque post apoplexiam, paralysem, agrotantes depochondentes; ac in scribas nervosæ, duranti oculi coarctatione, liquet illis ex palpebris decurrere. Interius ex nervorum irritatione post multas lacrymarum statuit. Sub dentium dolore feroci, aut mechanico nervorum, qui huc ipsos, aut nam adtinet, stimulo, copiose mox lacryma distillat. A corporibus peregrinis oculis illapsis, a trichiasi, distichiasi ( §. 170. ), — a quovis acri tam oculis, tum naribus admoto, ut a fumo, vaporibus spiritibus, ab aliis, corporum, raphasi rancidi odore, medicamentis, quia a frigore, vento, a luce vividiori, leviore longa, imprimis nocturna, a contagio mobilibus, varioloso, a phlogosi

utrobili, effectus idem habentur. Nec enim sanguis cohibetur et impetitur, sed rursus, rursus, reversione facti, ad caput congregatio hoc spectat. Similia occurrunt, si vel palpebra inferiora praeter modum relaxentur, vulsantur, erodant, aut, extrorsum convertita ( *ectropion* ) lacrymas, quod et rursus ad causam lacrymalis ( *crasialis* ) facit, ab oculi cartho interno divergat; vel si passim lacrymalla, aut confusa his mucus, aut densior, a rursus, ab inflammatione utrobili, rheumatica, variolosa appositione, materia innata, a polypo, vel a calculo, vel quovis duntaxat modo, angustentur, erodantur, obliterentur, atque imperforata ad oculum humores ad aures, forte simul a polypo inferioris, obstructi transmittuntur rursus.

§. 503. Nisi parvum, quae lacrymas con- Epiphora.  
 erant, abducant, ex vicio epiphora congerit,  
 hae ipsae, in febribus praetereunt, sunt mir-  
 billes, interdum et variabiles, furcae, sunt in-  
 usitatum per aures haemorrhagiae, sunt deli-  
 da, significat. In febribus nervosis lacryma-  
 do peius indicii dicenda est. Frequenter fa-  
 miliarum, quae sunt alio laborant, oculi  
 lac lacrymas leniter conspuant. Quae

ex vitio canalium lacrymalium originem trahit, aut a longo jam tempore continet, epiphora, ea, pro causa rectior, aut difficilior, aut nullam curationem admittit.

Quæ.

§. 344. Cum ex alio magis, quam organo secretandi e vitio, lacrymarum profusio procedat: tradendi methodos, ad morbi causæ patiturum deligenda, aliis hujus operis e locis, atque ex chirurgiis variislibet plerumque erucenda est. Quamvis enim oculorum sensibiles lacrymationem exciterit, hæc parvis duntaxat Thebais ( N. XIX. ) guttulis quotidie in oculum solutis corrigatur. Si debilitas organi mobilitatis incomperentiam aut produxerit, aut comiteret, eas juxta opus naturæ extrahere ( N. LXII. ); — et si ab acri stimulo aut materia lacrymarum secreto ageri videatur, radices ungularum temporum regioni appodari, atque illæ, quæ in ophthalmia his a causis excita commendari-  
mus ( §. 334. ), indicantur.





## ORD. II.

### PROFLUVIA MUCOSA.

#### GEN. I.

##### CATARRAE.



§. 303. Consideratis hucusque (§§. 469. anatom.  
 — 504. ) profluvia, quae tensionem atque ac- physi.  
 tione animalium humorum partem dissolvendo  
 maxime collidunt, ad eam acced., quae  
 maxime, vel cum hepatica congestionis prin-  
 cipia dependant, considerationem nos attingi-  
 mus. Haec quidem, nutritional potestatem di-  
 cuta, materia cum ipso cum sanguine, tam  
 imprimis serosa cum lacte tam largite con-  
 junctione iacet, ut aperta, cujusunque demum  
 grana, videretur oculis, via tam clau-  
 s.

uno liquidum refugiat; sed coactus aliqua mucosâ principis quieti, vel obstaculo naturali, morbo, calidiori humorum curâ opposito, vel mutatis vasorum conversationem, ex indulta laxitate, aut ex officulo majore, officia, — hæc veri animalis cum glaciæ unio ac affinitas cum lodina infringitur; refugit illud, aut a vasculis reabsorbentibus abducitur; ac solvente ubi abire vehiculo, nutritiæ materię jungatur magis, magisque coherens principis: in lympham, a qua non aliter, quam sanguis ab ira, perfectiæ scilicet elaborationis ab organo animalibus ortum expertæ ratione, differat, non magno intervallo abitura. Hæc ab exigua hæc nobilioris principii continuata in longam jactura, longe major, quam profuturâ, arretit, nisi fortiam cum lymphaticâ substantiâ uberius mixta ( §§. 473. 480. ). Insuper debilitas ac macies; nec paucæ, per quas corpus humanum hoc necessario conditioni admodico defraudetur, sunt viæ, quæ singulis artibus a subis investigari necesse interit.

Definitio vi.  
ARTICULI.

§. 508. Ac primo quidem Catarrhus candidandus hoc venit: qui scilicet in membranae plicaturæ, per vias respirandi patens ex-

ness, affluente, plerumque et suppressa transpiratione oriunda, frequenter febrili, plurimum inflammatoria, ac molesto vique ad partem esse hanc, non illam, excretionis mollioris, vel primam in trachea, saltem et vasis, — ac tandem in densioris viscidiorque materie rejectione consistit.

§. 307. Pro tanta vero catarrham, ducem, <sup>quod in-  
stat.</sup> catarrham, causam, quae aer, inspirationis sub opere, continas afficit ac permittit, ampliusque, extensione, — pro tanta membranae, quae hanc spiracula invehit, contractilitate, molliore, — pro tanto nervorum, vasorum, glandularumque numero, — pro tam ingratu loco et ipsa et longinquitate cum partibus con-  
iuncta, — pro dissimili organorum tam di-  
versa, pro dispari dispositione pinguis et  
vel debili et laxa, vel firma et robusta, —  
oportet morbum, licet originis et causae agen-  
tis ratione potius eandem, diversa tamen in lo-  
cis affectis, tam in aliis, vicinis non minus,  
quam dissimilibus, et in variis hominibus, sym-  
ptomata agnoscere: quae interea, quantum et  
causae et methodi tractandi respectu non ubi-  
que in omnibus conveniant, nec nihilominus  
eodemque tractatu absolvi, et, quibus hanc

## CATARRHUS.

et confusae, levis, ac confuse exponantur.

Nunc vero, coryza sub nomine, esse narium, ut sinus frontalis, sphenoidaliter, aut infra maxillaria coryzae accipiat; manifestat, vel pediculis adhaeret, ac describere jam alibi ( §. 172. ) coryzae catarrhales, — vel, ad laryngem extendi, coryzae, seu bronchiae, — atque tam diu ad locum, quam ad tracheam, aut ad bronchia deficiat, vocari, seu laryngis, tracheae, pulmonum, catarrhale constituit. Pro varia origine, ac pro libris, quae morbum eandem, catarrhale sub febris denominatione; constituitur, diversa, vel et procul absente, aliam illamque hic ipse morbum adducit: nunc absque, nunc alia cum vitio, veneno, acrophthora, etc. conjuncta, — nunc sine ulla laetate, insula, — nunc vero vel primario cum febre, plerumque inflammatoria, garruca introdum, ac, sub corpore, ab humiditate atrophactam, vel ab vivendi rationem, laevorem, debilitatem, ac magis aculeum habentem, — vel, difficultati sub eorum decursu, non sine contagii apud aquas in coryza viriditate, licet aliter Vir eximius contemderit, manifesti, sphenoidaliter imperia, ygentis, complicitas, nervosa, et in homine cum coryzae-

is, impetiois solitari, lobenter locedens; — vel recedens, ab acri morbiloso, varioloso, venereo, aut stimulo aliis per morbum excitato, symptomatice inductas. Non parcos habere catarrho vocari, ac plures ex his, ubi pulmo debilis, sensibilis, hoc ad virtum inferiores disponit, ulceram ad phlegma properare videmus. Alii, crescente mucosae materiae in bronchiis secretionis morbum, magnam quotidie phlegma periformis copiam cum rari solvant, et ex tam longe nutritionis principii pascere, quia ulcus pulmonum, et casus, debet, phlegma in radice habere. Aerem stultum, sub habitu corporis laevi, catarrhi pulmonum frequentes, ac vix non perperam, seu chronicis, sine tanto discrimine divergant. Nec periculose locedens, plerumque symptomatici, exempli doctrinae catarrhi. Variis autem ex causis, quae partes catarrho affectas excutunt, calor; coadunatio, natura et copia sunt variae quae regula, ex tradenda auct. generum historia, admodum parva.

§. 303. Nariam catarrhus, *coryza*, *grinocoryza*, vocatur (§. 302.): quae, pro magna ipsius catarrhi extensione, prae istius modo

partem, nec omnem superficiem prebendit, ac diversa sunt levia, sunt vero et graviora, symptomata indicant. Graviores, ut scilicet quondam putant, a creta, quod in illis tenet pleuritis sub dolore, ut vocant, gravissime, — in hac vero, acuta, acuta, acuta materies effusa dicitur, cum modo gradu ac tempore hoc differat, distingui aut interit: sed juxta, diuina, quae simpliciori hoc morbo quasi sub oculis agatur, non contemni, sed ut fidem totam, quae in trachea, et in bronchiis, graviores in aliis, contingant, longam aciem contemplari.

Causa: non  
certa.

Sub variis ipsorum catarrhe, alacritas ingratum, pleuritidis, tendentis semper, aquae acule subarbitrio, longioris, rubellae, effusae, non obtusa, acuta, ut vocant, odorem, et adeo rari, perceptis insulata, cum caetera universae ad frigoris sensibilitate majori, acutum accipiat, emungendi corpora necesse, secretaria frequenter ac molera, praecedunt. Haec acquirit indolens liquidi acuti, calente, subditi, huiusmodi non abduci, et acris, copiosissima interdum, distillatio: quae variis partibus, per labrum, rubellae et ardet. Interit mucosa illarum, ac ductum, mucosumque huiusmodi interna membrana turgit, et acris

non solius ad narem ingressum, quem laryngem ad illam descendens percolat. Hinc ita ad oculum morari, vel saltem, per gressu devolvit; ac spiritum, cum odore, dormientem, nihil cor aperto, quod tunc in infirmitatibus, his modum amittit, percolatum est, somnareque ardet, difficulter hincil oportet. Accedunt capitis obambulatio, graves, nec dolor frontis nec molestus, horripilationis, caloris vagi, ad noctem crescentis, secundo, ac ipsa demum febris, ac phlogosis per narem extensus, gargaris sub affectu, non daret indicia. Per plures hanc dies, non equali tamen semper viget, — interdum per multas, concitatur, dolorque obtusus, lateres, per velum palatinum, posteriora, ad fauces expanditur: quo loco natus ab aere inspirato, sub reman, in lumen aut cristas cuticulas, irritationem adauget, ac levem sicut deglutitionis sub opere dolorem infert. Tandem nunc citius, nunc tardius, locum inter pellucidum, liquidum paulo crassius, mucosum, ac sensim viscidius, cum facilitate majori, glutinosum, vel alba, vel flava, interdum subviscida, vel utrilus ex sanguine viscidis, aut foetidi subinde odore, pluvius copiose ac plures per dies emungitur, ac pristina odore, sapore, spiri-

neque inopiosa, non sine magno levitate ac promptitudine legem sensationis, continetur.

Vel eodem, quo carui a catarrho tenetur, tempore, vel hac parte vix adeo affecta, dimissa sphaeroidales, ac frontales ad rivum, ad aures maxillares, vel uno, vel utroque et lateri, contingunt. Sed praecipuum accendendum ubi cura in oculum frontis, et maxillas superiores excipit tenetur: quae cunctis capacitate majore, easque haerentibus magis expedita, non raro difficili observantur catarrhos pariter.

Cura, cum  
dent.

Nunc etiam tantis, plenitudinis, caloris iactis, et vel stendi, vel satis acuti, lancinantis, postuli tamen, doloris, a sui radice, per unum, vel utroque superiorem regionem extensam, sensu, cum hemicrania, cephalalgia, oculorum lacrymatione, rubore, de rivis frontalis catarrho tenetur.

Cura, cum  
maxill.

Nunc ad maxillam superiorem loco dentibus utroque intermedio haec dicta, et communia catarrhis, signa praeferunt, namque avum vicinam decedens, est circumscripta sub opere, cum dolore incrementis, si medi exerceat; aut gena pallide his tenet, calat, aut rubore suffusa est; vel dentes, impetis sub tactu, manducantes ciborum, affert in la-



non obstant dolores videntur; gingivae calcar, subestque, nec palati ad tonsillam ubique presensio debent, aut pondus, tonsillis molestante symptomatica. His vero amplioribus in curvis a phlegmâ, aut et violenta inflammatione, occupatis, non minus, ac ad alia ( §. 116. ), *hydroper aëti* hinc inde nascuntur; ac serum copiosum nunc purum, nunc puriformi liquore inquinatum, colligitur: quod, vel remota ad oculi cum aëriem cavitate communicantis obstaculo, vel sub capite in puram segregantem adveniam decubitu, interdum copiose, cum impetu perirumpit; aut propria vascula, aut cyrta inclusum, abunde distillat.

Sed, quod jam de natura liquorum catarrho in optatam resolutionem absente morantibus, elapsis aliquot, aut pluribus, a primis hâc morbi tentis, debet, remanet loco aëri, aut stercoris molestante, purula virida, glutinosa, nunc alba, flava, subviridis, nunc puriformis, ac velle sanguineis notata, interdum et foetida, interdum, ac videtur, densissima, sive cerea, vel, capite ad aëriem rediit, ex *sinu frontali*, — vel, illo in lacum sinu converso, ex *sinu maxillari* effusa, erumpit copiosa, et morbus dissipatur in integrum.

ARTICULUS  
SEPTIMA.

§. 309. Non raro cum talis erit morbi haec ad partem haerentis, et vel inflammatione violenta stipendi, vel ad acri virulento, vel quocunque a stimulo, qui actum sui cito non possit, inducti, casum. Non rarum est scilicet, a causis catarrhali, aliisque non parvis (§. 310.), cum ipsis ad narem, tum ad sinum, principis frontalem, vel et artus maxillares, alveares nec non maxillares, nec maxime obocurre, claudomina, generari: qui, praeter commenda internae operationalis phlegmonis (§. 35. 126. 128.), odoratus majorem, minoremque laesionem, spongiosam ac trases hujus cunctae compagis lamellas vel accipimus, vel sita naturali expellant, vel maxime discindunt, extendunt, ac plerumque Chirurgis non ignota incommoda parantur. In alius quiddam ad narem, vel ducit ad partem, intus obocurre, cuncta subsequitur tunc simplex atque tunc densius, nec vtro obocurre ad partem vicinas extendunt, ob foetorem laesorem, vel ipsis aequis non minus ac aliis intolerabilis, ob easque violentas, specificas actionem, ob furias, excrementis foetorem, polypum, mentamorum, scirrhosum, cancerum, complicate, vel summoque multum, vel summo difficilima.

Ab aliis vellem fortasse vel eadem , vel alteram, abuterer, eadem, — sub dolorem in illis obore, in illis polante, aculeatione, — sub fere in his magna, in illis parva, vel nulla, — nisi accedens ichori exitus ad nari pariter, oculis, in quo his surgant, substantiam, ex quo periculis, emolliant, distendant, cedant; ac, vel abluo, quod dicitur frontales bipartit, epimanto, in lateri communem hoc efformant; vel, lancia alio: interna ad corbeum protra, sequitur, ut, postea, ac, septo repagulo, moritur angustia apoplexiam inducunt; vel eadem superiorem in palpebram pariter, hanc ipsam oculis redente suffundunt; vel dextram aliam, per orbem totam, viam sibi ponunt, ac usum cubile cum nucha et astro maxillari eorum excutiant. Nares in totum cum oculis palati, velis pendulo, ab eadem cuncta cuncta, atque ut nunc cum acris maxillaribus speciem aspectu horrendam formarent consumptas, in Viro, tandem a phibis pulmonum percipio, ac a nobis *Respiratio* dicente, respirant. Siculis tumorem hoc in alio lovariantem, spongiorum, cunctationem, tem a prudens, quam a maligna, cunctosa suppuratione, calamitatem expectant.

namque non. Nec tantum ab his dicant, quae auri  
maxillari nares, excrecentiae fungosae, can-  
croae, excrescentes, induratae, uterdae. Non  
quidem simplex puriformis, vel et foetida, li-  
quoris, hoc ex alio defluens, tantum in au-  
tro reapparitionem ut valde confirmat: ac  
vero, cum inflammationis hac in specu dia-  
tine vigentis exposita jam phaenomena puerve-  
riat; — cum pariter jam facti signa (§. 118.)  
sequuntur, ac doloris pulsantis, lancinantis,  
sub dactylis in partem affectam, et robustum-  
culas auri, sensus caecidat; — si quae ru-  
beat, tumescat, aut maxillas vel exterior,  
vel palati ad lenticulam, protrudendam sub di-  
gitis videntem, ingrossa non ubique ex-  
partem, exhibeat; — si, capite in partem  
superiorem converto, ichor brevis aut auri coloris  
foetidusque distillet; — maxime vero si for-  
la vel calet ad malum, vel ad arbitrium, gin-  
givam, alveolos, palatum exulat, ac si den-  
tes hoc loco vacillent, longiores videantur,  
aut cariem attendant; tunc de lentic hoc in  
auro ulcere carioso, vel canero, aut saltem  
de fungo his loci locustante excremento,  
vix dubium relinquatur.

brana mucosa totum, quo capiam illa ( §. 508. ), modo afficitur; atque *granulæ* illæ *catechiales* ( §. 171. ), his vero *dracenchæ*, et *diæmesæ*, — interdum utraq; simul vitium, constituit. Sæpe fœces stultitiae ingesta corruptæ, ad vocem impediunt, discruciant et arduant; suborsitur vox aspera, obscura, inaniens, vel rursus; nec cibi tam facile per pharyngem, nec aer tam expedite per laryngem, iter abstruunt; sed rursus ducis, vel saltem utinario materie aqueæ, salis, levis horripilatio, vaguesque cales, sitis, lassitudo, inappetentia, hominum, vix lectula adstrictæ, tenet. Post aliquot dies, prævia reblatæ rursus, horis matutinis, efficitur mucosæ unam undemque copiosior, crassior, trax, albescens, nec tamen e pectore, sed collis e faucibus, larynge, eluctus: vox rutili vocora, expectantibus imminuitur accendit, se prima spirandi, deglutendi facilitas retinuit. Sunt, qui, præcipue ex senibus, quotidie præterquam a somno pectus ex fluctibus copiam mucosæ, atque chronicæ pharyngitæ *rarsæ*, rursus magis exaltatis, in perpetuum, aut tempore hierno, humiliorque præcedit, laborent. Sunt alii, quibus nec tanto moxi apparet vox plerumque rarsior, nec etiam

apertus.

alatus.

debetur in saepe. Multiplex horum mali, non raro peritiam, ac interdum perniciem, nata est. Ipsam quidem vocat, cuius instrumentum larynx est, *abscissionem*, *aphosiam*, — *loquelas* vero, quas oris proficitur organo, *scissuram*, *aliamque* dixerunt. Utriusque mali genus, non ex causa ad ipsa vasa, loquelas instrumenta resident, *pericardium*, *celsum*; nam morbi aliterque symptomata, *convulsivum*, *convulsit*, neque non raro ex viscerum cum larynge connatu, prout alibi docuimus, ac loco opportuno uberius referemus, descendit. Quae *describi* *acut*, *facileque* *lethali* referuntur, — *in* *vel* *ad* *cyanosum* *laryngem* (§. 173.) , *vel* *ad* *convulsivum* horum *fatalis* affertur, *reducenda* sunt exempla.

Causa, quae  
causa, hinc  
causa.

§. 311. Non aliena ab his (§§. 309. 310.) in *trachea*, et in *describi* contingunt: quae, cum *variorum*, ut *princeps* *symptomata*, inducant, ab his ipsis non vix optata, ac morbis affis, indeque *quasiplurimum* *diversis*, non vixit *consecutam*, *denominatorem* habuerunt. Qui vero *causam* *hanc* *loca* *paulo* *fortius* *prohibet*, in *afficia* *descriptis* (§§. 173. 186. 188.), *est* *facile* *in* *tracheitidem*, *peripneumoni-*  
*tam* *veram*, *tam* *acutam*, *abscissa*, *sympto-*  
*mata*

ante exitum coarctat. Non etiam febris  
manifesta eandem trahere. bronchitidem ,  
accidit : quae hinc indolem frequentius in-  
flammatoriam, — hinc inde vel gastricam ,  
vel et nervosam, ab aëre coarctatione, segre-  
ti habere, vel causae praegressae ratione , in-  
venit; tunc febris nulla, aut certe parva ,  
hinc, locale quod, vitium designat; ac mi-  
diorem tunc catarrhi tracheæ, pulmonalis phae-  
nomena. Non rarum est, coryzae, antecedente  
symptomata cum ipsis conjungi; sed in mul-  
tis modo aspectu arteria, aut bronchia affecta  
sunt: ut in quibus, sub eodem sunt membra-  
ne mucosae, quam ad aërem aut suspensagro-  
sacem, conditione, diversa tamen symptoma-  
ta succedunt. Praeter coryzae vellicet ca-  
tarribus vesperitiae, levisque horrores, calores  
ligentes, dolores non docti, tam acutum tor-  
vent, pungentes, lassitudinem , quae sub no-  
cte ingens cum febre, si hinc claval adhae-  
rit, augetur, tempore matutino remittit ,  
— siccitate, stillatione ingratas, odoris ,  
vel tracheae ad tractum, vel in pectoris pro-  
fundo, annatio, spiratio plus minus: difficilis ,  
ac tantis coarctas, ab initio maxime, ab aë-  
re trahere, molera ingratas a loquela, fortiores

ac profunda inspiratione mox asperda, invadunt. Si quid primis hujus morbi diebus extrinsecus expellitur: aquosum, album spumosumque humorem hoc effert, sub impetu ventis majori, visis hinc inde aromaticis remediis. Tam vehementer interdum haec visio urget, ut vomitus vel in illo, quibus alia caeteroquin ad hanc causam non est, tunc simplex aquosus, nunc bilis, alvusque remittit, frequenter moveatur; in gravidis non raro abortus, in aliis postquam vaginas, aut hirtiae, ventrigines apoplecticae, lacrymaeque lachrymulariae, haemorrhagiae per aures, polmones, hoc moras thoracis freores, convulsiones, ac vix non suffocantes, sequuntur. Post aliquot, nec sensatim numero, dies, manitiae imprimis ad horas, jam spinosae quodammodo, sed pauci adhaerens, materia, sub tantis micis violenta, facillime educitur. Quod si reoriam viscerum retentionem observetis segre, visio dies in melius convertitur; ac apica gradatim copiosior, tenacior, albescens, cum magno pectoris emolumento plura per dies, donec interum decrescat, facillime accedat; respiratio aequalis, vapores manitiae ad horas subintrat, acinae sedimantum latericium deponunt, ac prius valetudo restituitur. Negle-



atque vero morbi initia, vel catarrhi simulacrum, ac methodo satisfacere tractata, vel denotam frigoris locum, ad pulmonem impellimus, admissio, difficultas spirandi, tussis violenta, pectoris ardor intensus, ac febri aggeritur; nec raro, sub fallacioso catarrhi innocentis aspectu, in plenam diarrhoeam peripneumoniam atque pleuritis convertitur; ac incipiens pulmonis suppuratio, ac phthisis consumens, impetrat apud illos, qui sunt in morbum inclinant, aut praevis in pulmonibus tubercula latent, succedant.

§. 312. Tum vero, autumno, catarrhi incipit incantet, pueri, tamen, laetaque struuntur haeciles; ob tempestatis vicissitudinem, quam maxime regnant: sed nullo non tempore, ac impetu sub atmosphaera ex calida in frigidam humidamque transita subitanea, populares redduntur. Interim, quia iam evidet ubique in ambiente nos aëre mutatio praesens, interdum catarrhi febiles per provincias divergantur; ex una in aliam impetu, per integrum vic non celum passu lento vel celeri, sed ad certam interioris morbi directionem suscepto, non sine magna lentitudo decursum recipiuntur feruntur; ac omnes sine inter-

*Catarrhi febiles  
subitanei.*

les, sine habito seratis, tunc, conditionis, vix generis diuturnitas, infertur. Symptomata epidemici hujus catarrhi cum descriptis in genere conveniunt, ac circa omnem membranam mucosam, quæ hinc partes respiratorias aperit, invenit, plus minus affectum sentitur; sed celerrime, vehementer cum febri, ac interdum ipsius catarrhi, decursum, — evidenter per aliquot communes solutio est. Confusio, ac diu vix non eodem, sine omnes habitantes invadunt corporis aërem, dard lassitudo, debilitas universalis, vertigines copiosa obstipilatio, heuripilatio vaga, mox horror, plerumque ut validior, calor vehemens, incommensurabilis, in quibusdam deliria; cephalæa, in multis aures, tumor oculi, vomitoria, vomitus, sili vel ingens, vel parva, coxyta, vehementer stridor, lachrymatio, ac rubor oculorum, maxime dolorque fructum, natus sicca, in quibusdam spata sanguinali corrumpere, cum præterea opprobria, dolores hinc inde quasi pleuridici, polius frequens, in aliis molli ac parvis, in aliis magis et duri; angustia eductum tunc corio obsecuto, tunc eodem polvarum; urinae sub lactio sine cruda, aquosa. Quibus sudor copiosus vel sponte post primam, mox diem præsumpt, hi facile

a morbo liberatur; in aliis, meningitibus marcescat ad horum symptomatum, ad nocentissimam illam ac pridie contingunt, ac saepe tarda, quarta, quintave die, post vehementem horrorem, calorem ardentem, delirio, sudor copiosus, odoris acidi, viscum exoritur; aut ad labra putrescentia effluunt; urinae seditionem latissimam deponunt, ac labeis profligantur vis non cessat. Non sic tantum in omnibus cum febri sedatur, sed in pluribus per modum adfusa dies continuatur, ac spuma terribilis, glutinosa copiose exoritur. Haec interitum non in diebus eodem ac modo manifestant; sed leviter, ac prope nulla febre, in his, — grave in illis, aspirando occurrit; nec non pro varia vivendi, morandique ratione, nec paucula a diebus haec dispellitur, nec plures per hebdomadas neglecta decurrit. Pro tanta vero symptomatum gravitate, modo pauci morbi lethales sub ipso quidem epidemico decursu apparet; sed plures post morbum ac malum, ut vidimus, pulmonem suppurati perierunt; et qui vitio pulmonis, vel alio, jam pridem laborarent, hi utique majores discrimina subibant. Abortus non parvi sub tam communis affectionis in diversis contingunt.

Inflammationem plerumque *catarthos epide-*  
*micam*, ac benignam, ac vocant, naturam ob-

spiciunt: sed febri nervosa cum eodem non  
 miscetur, quam cum catarrho quodam sporadicis,  
 aut alio, conjunctas exempla non denotant;  
 et magna interdum hinc morbo cum *granula*  
*malig.*, affertur ( § §. 173. 196. ), aut cum  
*peripneumonia veruosa* ( §. 190. ), aut affi-

nitur.  
 Sub eadem catarrhali epidemica aegritudi-  
 ne subinde dolor et ardor ventriculi, intesti-  
 norum, cum ventris flatu, tuncmo, in qui-  
 busdam largitur; et caecae ejusdem in viscera  
 magis abdominali, quam proctis, actionem  
 extendit.

Taken vol.  
 97ma.

§. 313. Ad chronicum catarrhem uterinum  
 affectum, qui, sub masu copiosi in bronchiis  
 secretionis, ac sub maxime puriformis emittitur,  
 in longum protractis, debilius, fibrilosa, ma-  
 cula, ac phibitosa pulmonalis exemplarima,  
 quia alias pulmonem devastat, symptomata  
 inequanter ( §. 306. ). Bronchorum hic tra-  
 ctus sit ab illa vagante apud mulieres fluo-  
 re albo liberatus, vel uterine a chronica  
 blennorrhoea affectae, 'differt'; sed ob majorem  
 illorum superficiem, chemici morbos hic se-

certi abundantiam, ob vicinis nobiliorum, tritiores affectus inducat. Hoc scilicet videri, sanis, qui toto ex corpore redit, amor, — et, qui via huc aditus facit, chylus, albidus. Non mirum hinc videbitur, si pars major principii nutrimenti, ut in ipso *diastole* per rivas, sub oculi aspectu, subditiis aspectu, per ampliatam bronchiorum aperturam, sicut aut simis laxam, ut dicitur, viscido marteo ad exuberantem accrescentiam coactam, analogat; et sub tantis confinis, sub multiplici spumosis conditione, raris, aut debilibus conspicuus, febris lenta, odor aetheralis, dyspnoea, oedema pedum, ut s' impotens et phthisi pulmonali ex viere probatur consumela, accedant, nunciat. Hinc plures, qui ex viere pulmonum consumelione, et mortem traxisse videbantur, aperte cadaveris, nec minime illis vestigia obstruere; nec spora, quae pendente in viventibus felices solvia jorant, aliam, quam pervernas excretionis, commensata cum moco in coryna, in fluore albo, in blenorrhoea mortis, originem habere. Nec denique illorum, qui hoc in morbo ex pulmone integro, nec certe ulcibus haud quaquam oborto, singulis relictis, ac flum in aliquo thoracis loco ardorem, de-

non accusaverint, exempla: ex quibus singulis; quam incerta sit phthisis pulmonalis scilicet sanatae historiae, et quam fidem comedia ad ulcus pulmonem consolidandum laudatam meruerit, elucet. Difficile hinc morbi utriusque diagnosi, eoque certo difficilius dicenda est, quod parit a more ubique distinguendi adhucdum non satis peritia; quod salubris phthisiae praeventiori gradu, quod hanc non inducant, aliter evadent, ac phthisis vera pulmonem attingit queat. Si quis interim ad phthisim pulmonalem viciniam, quae sibi exponatur, digna attentione contulerit; si longum morbi catarrhalis, alia febres non conjuncta, in homine vix ad phthisim praedisposito, ac laxae constitutionis, ac aliis fortassis morborum fluxibus, primarumque viarum incommodis, non ita raro subiecto, decessum consideraverit; si febres non prius, ac major iam debilitas acuta fuerit, diuturno catarrhoe accessive conspexerit; si materiam per eundem rejectat color, pelluciditas, tenuitas, rosciditas, levitas, quantitas a primo jam morbi initio conspicui, divertam a pure, quod parvam ulcus longis jam posset, indolem ostenderit; si major vix inspiratione profunda libenter et laetanter a vari sublevetur; si spe-

ta interdum, comparato imprimis alibi dolore rheumatico, quæ febri, dyspnoea sequuntur, per menses disparuit, ac tempore pleurico, frigido, et catarrhici favente relinquitur vitæ; si methodus corroborans segretim condiderit: tunc morbum non ex viete palmonali, sed ex perversa in bronchiorum membrana utroque uterisque venis, quæ magis affligit.

Qui breviter curando dies tanta plures profectus. an. solent, plerumque sunt belique homines, laborantes: hi aut febri intermicti, aut modo per vires et post atmosphaeræ mutationis manifestis ab eadem concepti, nec modum conspicimus, nec viam decessentium, ut in tace pleurica pulmonum, concipiant; tunc, in dies dactilum, ac fere quasi vitro conditilem pultem cum viri, praesente tunc mihi dyspnoea, matutinis ad horam expectorant; hoc facto, libenter respirant, ac plures per dies, interdum per menses, imprimis hiemem, similia patiuntur; sub coelo sereno calidoque valentiam recuperant, ac sæpe statim proventus rive alia incommodis accingunt. Nec unquam pulmo, sed pharynx interdum, aut aspera cum larynge arteria, catarrhi hujus chronici sedem constituit: ac pulmo in ca-

et, cuncta piritine copiose materies, — in altem, tunc, sub dyspnoea moderata, ut facili, ac spacie globosa ac viscidis, Interdum erysipelat, ac impete, quo pectus laboraverunt, ad cutem redeunt, sicut more liberantur. Non rara est latens, hominem a chronico catarrhe vexans, ac facillime pulmonibus intractis, fortiori sub acuto, peripneumonia, quam nectem vocamus (§. 343.), pericula incurre; ac ob iram non minus visciditatem, quam copia pulmonem obstruens, et piritine repletis expectorandas impotentiam, a catarrho, quam suffocativam ex effectu denominant, brevi temporis spatium, strangulationem adiungit, perire.

Causae.

§. 344. Causae catarrhi tum generales, tum speciales, recensendae sunt videntur. Quaecunque scilicet membranam, quae vias respiratorias dicuntur obducit, plicatariam, stimulo ad majorem fortisque inflammationem accipere sufficiente efficiunt, affluxum sanguinis hanc ad loca adagent, secretionem immutent, pervertunt: ut producendi catarrhi vias possident. Frequentissima ex istis est caecitas, quae per cutem repulsa falsoci, per frigoris vapores administrati retento. Haec si ad par-



tas mucalosa, periclitum, ligamenta, vel ad visum feratur, alveae, — ad mollem, quæ mucus, naris, fauces, tracheam, bronchia obliques occurrunt, membranam etiam, reverberat productis. Quæ ratione id faciat, id vix obocurum est; et quod magis difficultatem addeget, et quod rariæ ex corpora cellulari; quæ ex parte solitaria, refrigerio carere oritur: Mephitis, quam palmo, — hinc certe casu non spinat, sed aliud, incongelatum principium, quod coram impeditum, quocumque feratur, irritationem inducat pro parte irritata diversum, transpirationis materiam locum, contrahendum affectum contrahit. Fortasse quæ ad usum corporis expelluntur, simul retinentur ea, ob septam, per alia mox organa, per totam potissimum, nec raro per usum intrinsecum, promptum, ac passum, quam partis usum refrigerium colligit, eliminatur materia. Nec mirum est, si destituta per eam exoriam diffusi, — sed ab eadem repulsa, intus transpirationis effluat, lactera, ac simul stabilitatem ad organa efficit, quam alia ad partes, feruntur principia; — vel, si illa ipsa, frigoris ab eam tracto occidit; irritum, quam excludere debuerant, circa proprio stimulantem retineant

forasque materiam: qua scilicet erit, adacto humorum affluxe, exhalantium vasorum multitudine effusum, folliculorum mucosorum infectum, phlogosis, mutata sterco, plenitudine, ardoris uroris, ac singula catarrhi, seu inflammationis superficialis et quasi erysipelatosa, symptomata, sine culpa praevis lae humoribus visis, sibi mutuo succedant. Si miles est phlogosis: tunc, febrim excitandas impar, localem modo, brevique temporis spatii absolvendam affectionem producit; si fortior est visibilis, aut major sensibilis, vel praevis totius, aut partis, longo remaneat, clarescere accendit, ad phlogosin dispositio: tunc membranam mucosam phlegmonosam inflammatio, cum symptomatibus et exitu, pro partis affectus varietate, diversis, accenditur.

Sub hac igitur materiae manipularia retrorae, nec aliter per vias earum promptae evertantur nota, quaevisque aut nascentem, ac per earum humorum ad eam affluxum excitant; — aut morbosam hujus organae sensibilitatem laedunt: — quaevisque membranam variam, faciem, testem, bronchiorum, mucosam ad manipulandum, retinendam circulationem materiam praeparant: ea partes praedictas ad catarrhes quam maxime disponunt. Hinc immo-

dius hypocausti calor, ac succedens hinc ful-  
 gens atmosphaerae repentium, — hinc partis  
 corporis unius parte altera, vel canali ad li-  
 quam, vel solis ad radices, vel hinc ventium  
 nimis solatio, vel continuo exercitio indus-  
 tra calefactio, ac subsequens illux ab aera  
 frigidiore perfusa, — hinc ventium hiberna-  
 rum ad incoactas vasis teporem praecox de-  
 positio, aut acrivi, levisse apletus protra-  
 ctus in seras actumque usus, — hinc ve-  
 ra, nec tamen oblique possibilia, aere libe-  
 ricola fuga, ac certa quasi horulorum literato-  
 rum, effervescens aversio, balneorum  
 calidiorum, sudoriferorum, eorumque, quibus  
 ceteris robur infringitur, sensibilitas augetur,  
 abusus, — hinc frequens catarrhalis affectionis  
 ad partem eandem reditus, ac induta hinc lo-  
 ci, cum sensibilitate morboza, luctus, — hinc  
 sordida congenita instrumentorum respirandi  
 dicterum lobositas, ad provocandas catar-  
 rhes praecipue disponit.

Sed et alia existere videntur, quae vel per  
 aera inspirantem sub quocunque caloris gra-  
 du admissa, vel ab eodem ex pulmonibus non  
 satis eliminata, membranam pituitosam non  
 aliam, ac transpirationis receptaculo materia,  
 efficiant. Vapore sulphuris, arsenici, licet

passo, per atmosphæram diffusæ, vel factæ, aut ex quavis subtili, insensate per aërem dispendis, ac pulmonibus lacente conceptis, morborum in sensili membrana tracheæ, bronchiorum, alveolarum, et catarrhi breviora, vel longiora symptomata succedunt. Saepè sub aere nebulofo, quia hic frigore evasibili afficitur, catarrhi, vitæ non otiosæ, vel ob latentem in hoc, subfoetido interitum, atmosphærae halitus irritantem materiam, vel quod illud ipsum ab aqua jam nimis intorserum exhalationis pulmonibus vapores minus propèter accipiat, vel quod humidum capicitur cum aere inspiratum membranis bronchiorum magis continuo relaxet, perhorrescat. Ad speculandum, quod catarrhos apud homines subinde inducat, contagium existit, dubitare licet, et illud, quod morbillos, variculas, scarlatinam evolvit, manifesta in membranam nasalem, faciem, bronchiorum mucosam etiam, ac cetera catarrhorum sub diversis atmosphærae conditiones per famillas eodem sub aere habitantem expansio, nec non crassas visceratas inter equos contagiosa natura, veridiculis hoc reddunt.

Nec mirum est, ab aëri, quotquot a periculis causam, incertis, respirandis ad vitæ

apoplexio, catarrhales affectus oculi; ac frequenter et alium, impetiginis quascunque antiquæ, blennorrhoeæ, aphoræ pedum, scillitum locustæ tractatæ, a rheumate, erysipelate, metastasi hæc ad partem affundere conversis, catarrhorum exempla habentur.

Ex ipso adeo venient, abdominali imprimis, non modo tunc, scilicet catarrhos oculi, experientia confirmat. Nec certe, cum et oculos ( §. 172. ), et faciem ( §. 171. ), et ipsos pedes ( §. 189. ), hæc a causa non raro incidit sciamus; cum tantum pituitæ sub tactu feritas, cujus sæpe in abdomine origo sit, copiam in pectore sensui videamus; mirabimur, utilissimam brachiorum superficiem laterum a nervis ventriculi, intestinum, per bilem acrissem, inharere corruptas, aut per vermes, coarctatos irritatis, diuilla agitari, aut longæ vanaque per rivos ad phlogosin ac morbosæ secretionem incitari. Hinc ratio curatæ interitum virtutis emeticorum, peragendum in catarrhis, præpulsis epidemicis, cum gastrica febre nascente conjunctis, atque adeo spontaneæ, quæ non pauci catarrhi solvuntur, diarrhoeæ, elacet; quia ignis, cum summo argostantium dæmo, nec quævis aut eris amaritum; aut lingue speciem,

est mucosa, venteris interna, vel ipsum adeo venterem, utque partes in istis symptomaticis, per sufficienti medicamentis indicatione habeant ( §. 186. 187. ). Contraria vice causae in membranam mucosam, nec, qui late per hac vias expanditur, omnem, - nunc modo in partem illam, operatur.

Gen. specul.  
Coryza.

Coryza tamen ( §. 307. ), capite ipso, pedibusque, apud omnes infantes frequentissima, refrigeratio potissimum induit. Facilius haec in illa, qui nimis caput integumentis fovet, succedit. Non raro acris quatuorque ad nari, utque dextra, semperque perviam stimuli externi sunt collocatum, struunt. Ab acri artificis ad nervos pariter ac ligamentis depositis, et gustus, et odoratus in virojectum, et nec nisi ammolliti volentia penesantissimum odorem disingueret, vel modo aliquem ab illa stimulum accusaret, observantur. Singulare plene vixit ventri in membranam fessam pariterque mucosam est alios, et frequens ab illis evasit, hoc pariter facile succedit, accitit. Mollissimum praecipue corpus praecedit, contritus contagium; utque ipse noster interdum hoc signis locodit; vel ipse abscissi cerei lacerant, exalantur, vel proci, et vidimus, obli-



plena, a calulo ad osi cavum haerente car-  
tillibus describitur: in alio juncta cum laxa-  
te membranas mucosae sensibiles major, non  
angustae rariis confirmatio, ad coxam lu-  
bitulæ discedere videntur.

*Exempla.*

Præter generales canchri, lacus, laryngos  
aut asperam arteriam occupantes, canchri, aliae  
conspiciendæ hic videntur. Ipsa quidem  
recensitis, ut dicitur ( §. 309. ), difficilli-  
mus sæpe curandis morbi, cum sit multi-  
plex: ac illius non minus, quam aphoniae,  
frequens langoris in partibus, in palmari-  
bus, ipse in ore, ac lingula in abdomine  
origo sit. Linguae in vocis organo acri,  
recurrentes pondus, imperium exerceat.  
A aculeato viro, ab infante deglutito, mox  
suscipit observata est. Aphonia a ventribus  
laryngis exempla tam illis, tam nobis ipse  
oblata sunt; atque illi ( §. 317. ), eodem  
particulatim perperam non insolitum phae-  
nomenon dicit, retulit. Ab injectione ab-  
stringente, post abdominali pericentrio, ven-  
tulo in cavum laryngis, — ab inflammatione  
pericardii, quo loco plures, et recensitis,  
sanctos nervos accipit, aphoniam, dyspha-  
giam; et mira vocis non lae acutissima,  
quæ in profundam, mutæ phenomena



ali notantur. A nervo nervorum aut larynx  
sensu, aut utriusque, sub experimento inflam-  
mationibus capto, — vel in homine, sub bron-  
chocidia operante, vel sub valere populi,  
diutius, aut modice inflammabilis, aut perfecta  
voce curando, interpretatur. Vix morbus est  
gravior, qui vocem agentis non valde af-  
ficiat; ac, ipsa quantum patiens ac prima or-  
mine secundo apud personas vocis organon im-  
mutat, est morbus qui ignoret.

Sed nam totis, longinquis ad causas, vo-  
cis aliter aliterque instructum respondunt:  
Inquirunt tamen ad hanc ipsam, ad hanc, la-  
ryngem, morbidis causis habere, experien-  
tia confirmat. Sunt, quibus per ritum vox  
clara, sonora sonatur, et qui perpetuum,  
sine morbo, loquendo mucosum prodant.  
Potissimum vero istas causas vident, maci-  
lantiore, laryngem ac hanc obliterata, de-  
fectus, est major, quam per est, copia, aut  
excedens sensus, aut a palmo in tracheam  
illapsa imperio; membranae ipsae mucosae  
laesae, flaccidae; virus, ac folliculorum,  
glandularum inflammatione, inaequaliter, phlo-  
gosis, varietas; granthema, impetigo, ero-  
sio vel ulcus ad epiglottidem, laryngis internam  
superficiem; cartilaginea, quae laryngem con-

struunt, rigidas hae omnes, immobilis, Rho-  
do, fractura, compressio; depondo materias  
rheumaticae, arthriticae, calcariae, rephuricae,  
monstruosa, spasmodica, paralytica, musculorum  
laryngis affectio. Ceterum, quae alios  
catarrhos inducant, impetum conceptum possunt  
causae, caecitudo interna, vel longa vociferantia,  
ex vento frigido, contraria, ex potu  
glaciale, corpori antea ingesto, refrigerium  
succedens excitare valdeat. Qui viui potu  
vel maxime sunt debili, vix non propere  
recedunt laborant.

Cat. 114th.  
Acute.

Ab istis vix differunt quae, quae re-  
cedunt, *transieruntque catarrhus*, tam acutum  
(§§. 311. 312.), quam chronicum (§. 313.),  
progrederent, ac omnia ex loco, in  
quam illae agant, est diversitas. Ipsi quidem  
rursus, quae principalem hic habere causam  
videatur, committunt rursus, ut ipsi catarrho,  
affectibus symptomata, non ipsi morbi aut;  
totiusque oritur (quod in genere monstratum  
hic docimus), ac stimulus quousque sit in-  
dutus, sit victus, sit datus ex parte ve-  
nicis, vel in diaphragma, vel in pulmonem  
ipsorumque veniculae, vel in bronchia, vel  
in aperiens arteriam, vel in laryngem, ha-  
necque partem nervos committitur. Frequen-

thorace tunc cuncta ex membranis tracheæ ,  
 bronchorum interne, anfractuosis, irritata.  
 Quam acuta non thoracis interni convulsio  
 ex aquæ innocentis guttula, nec oculis qui-  
 dam molesta, per glottidem delapsa, nec ori-  
 tur? Atque cum in pulmonum substantia, vel  
 bronchiorum in cavis, similia contingunt, et  
 a corpore peregrino per tracheam pulmonibus  
 adacto, a calculo his genito, ab inspiratis lon-  
 go tempore ac bronchiali cum glutine in seum  
 concretis, diuturnis ladulis, manibus pulsari-  
 lentis per atmosphæram ventositibus, — ac  
 a polypis ex lymphatico coagulo in bronchiis  
 arteriis tumefactis sub vasis filliculi aspectu,  
 forpulis, — a bronchialium glandularum, fol-  
 liculorum lacteis, a tuberculis, vomica, scir-  
 rho, — ac ab ære, aqua, cruore, purifor-  
 mi, purulenta materia in cellulis pulmonum  
 contractis collectis, — a vasculis inter varico-  
 sis, nec quocunque ob causa a sanguine præ-  
 ter modum extensis, — ab insensibili vapore  
 cum ære in pulmonem attracto, — a materia  
 salinis, a metastasi, ab exanthemate, impet-  
 rigine, vel æti quocunque ad pulmonem con-  
 jectis, stimuli admoveatur; — cum partem  
 pulmonibus vicinam, pleura, mediastinum, pe-  
 ricardium, cor ipsam, vasâ majore, oesopha-

gos, diaphragma, hepatis, ventriculus, hinc, inflammationes, tumores quosunque, aneurysmaticos, aneurismatosos, scirrhus, aut aliter labant, cum in cavo thoracis huiusmodi quodcunque colligitur, aut ipse thorax, morbois eorum processu delens, loculans, fractus, cetera coarctans, volans, aut in morbos impellens est, — cum longinquas nervorum cum illis pulmonum, tracheae, bronchiarum, afficitur juncturas irritans, prout de *Arachide* origines jam distinet, succedit, — hic immensitas in casibus non modo non rara, sunt luvide, non primaria, non metastasica, generantur. In catarrhe pulmonum, et ipsa membranae mucosae, quam descripsimus, affligo, totius mollescit induratur. Post chondros catarrhus, ac post ipsum, quam pituitatem vocamus, pulmonum tibi, flacciditas huius visceris complexa per varias pathologias docta habet. Hanc effectus non minus, quam causae, huius morbi esse potest, nec certe sola licet, nisi stimulus localis, quem ultra aliquantulum impelgo praepotere suavit, floet aliter, haemorrhoides, haemorrhoeae, rudes pedum, cellulae, cit. incitit suppreta, non non suppeditant, accedit, qui stimulus irritationem morbois huius loci non negat, cum

quodammodo perverit, sufficiens videatur.

§. 313. Ex illis, quæ (§§. 309. — 314.) PROPRIO. dicta sunt, *prognosis* catarrhi jam satis clarescit. Maxime *semper* catarrhus raro, aut morbi aliteri symptoma constituit, aut major inflammatione, suppurando, accedens, periculosam inducit. Aliquando tamen, post diarrhoeam ac molestem coryzam, ipsius cerebri affecti symptomata sequuntur; nec hoc quidem suspensum vitæ, cui a variis catarrhis, per duos seu menses processu, vehementer obsecutus vixit, curam suavit, loquacis difficultas, circuli calvariam depresso arcus, tremor maxillæ cum epileptico horrore sit frequentis, ac crura traxerunt, & latere distoro, debilitas conspicitur, — quia alia interea causa appaeruit, non deo equæ hoc cerebri ventericuli collectas vires, mouerunt. Nam ex causa violentis morbo, periculosa, ac nonnepe major morbus est. Neglectis, aut irritis a pulvere subactis, affligit, naturam ulcerat, raro sanata, vixit molli, alba, vel rubra, sed capiti doloris (intermittens variis), — nunc livida dolensque, in *antrum* degenerat, — nunc in linguam, ut & maxillas, vel entes, vel in lumen posterioris, propen-

den, cunctis, *polyposum* naturam accipiens, naugium. *Rachiar*, ut morbus, periculum vix affert; ut signum, non raro exhibere observatur. Catarrhas dromediarum, ubi male tractatus, aut in illis, qui tuberculis pulmonum, ac certa in phthisi praedispensione libentius, plerumque sine ulla causa incidit. Particularior est ille, quem dyspnoea, calor, et febris comitantur: ac nullum, qui haec omnia pendunt, inflammatione pulmonum corrupti perierunt; aut, tuberculis hoc in visceribus, formas ad phthisin praeparati fuerunt. Catarrhas in longam protrahitur, licet febris deesse videatur, albidioribus saepebus est, ac transiens pleuriticae pulmonum in tubum minatur. Haec igitur, minora quidem, ac phthisi ulcens, discrimina agnoscit: sed facile aut in leuam, — aut, optis deperisse appropinquans, in spem peripneumoniae convertitur.

CUR.

§. 546. Sicut Medici auxilio quumplurimi a scarrhis, vel, tempore brevitatis, per longos spectantes redierunt, — vel, longioris ac inaequalis post morbum, per phthisin dromediarum, aliquando ulla curationis remedia, neplacae, ex parte affecta secutae, — vel denique per blandas diarrhoeas ubi haec morbi

ventositas, liberetur. Hinc in dyspepsi, nec febre, nec dolore fixo, vel dyspepsia atipata catarrho, ut ipsi catarrhi committit, ac illis, quae curamam conspersionem inscripiant, aut stimulos locales adaugant, nullius evitatis, temperari ubi vires, potius tepido, temper, quo sponte salutar catarrhus, caup-crati sine arti quavis alio continere possit. Sunt adeo, qui, loco potius tepidi, diapnoei, ad frigidae, ipsosque glaci ad usum in catarrhis, non certe ob aliam, quam quod neque haec ipsa transpirationem excremum promovet, ac phlogosin localem insipientem hinc inde dispellat, cum necesse confugiat.

Sed, quovismunque febris, aut gravior symptomata catarrhum coarctatur, habito ad indolentia solus, ad morbi curam, ad partem affligentem, et habitem aegroti, et ad anni comminationem respectu, arti sine mora adhibenda necesse est. Rarum est, reverentem cum violentis symptomatibus, aut febres conspicuas incidere: sed interdum haec atque subintant; neque inflammationis ad naves, ad sinum frontales, maxillares, signa et abjectos morbum facit manifestant. Hoc in casu videndum est, quae febris phlogosin localem committitur, ac si indolentia viti inflammationem

agroscent, ad regulas jam definitas ( §§. 40. 41. 42. 71. 83. 111. 110. ), — in casu vero febrilis accessus, ad principia exposita ( §§. 54. 54. — 56. ), tractanda est. Vapor aquae vel salinis, vel cum aceto remittat, nuchos, aut peritus obstruendo, attrahos, — hoc vero in casu, ac in illo phlogosis ad faciem extensa, balneum eris et lacte copioso, malvae decocta, pariter alia potissimum conducant. Devota localis inflammatione formidat, morbus illi ipse, prout ducatur, coercitendus est. Si fortiter renascitur pituitas excrementitia sive, tunc vapores, aut menses in aqua salinis, per nares attractio hanc ipsam sollicitat. Invenientia aliquando hic opem praestiterat, — sed ab inventum ac helle jam majorem actionem, non recte ardent, medicamina.

Jam facto ad nates internas, vel ad sinus frontales, maxillares, obstruos, hic ipse, ac omnia antea enarra, quibus prompto fieri id possit, Chirurgiae ad leges, pariter consento libandos, vel materia purulenta, ichorosa sive frontali, maxillari inclusa, educenda est: Perforatio sinus frontalis mature et cum vi corpora, strigae et experientia locatur. Per i in ante maxillam deorsum, nates dante ora-



lari, qui hanc ipsam viamque, uno vel altero, imprimis: eas praeterit, extrahit, et se-  
cit, quae utrumque fornicant, membranae, for-  
dian alicui integrit, — non, vel ad alveo-  
rum radicem, vel ipsas ad gressu, vel palati  
ad fornicem, loco scilicet maxillae magis pro-  
minente, facio, elucitur. Quia maxillae con-  
densitas tribus a cute alligatae posteriorum aut  
magnam separari curvatur: quo facto, argu-  
ta liquoris immixtion ex ore in aeternum, et ex  
his per narum cum impetu proficere per jo-  
cum solbat, et tandem hoc a vicio perficere  
convalescit. Sed etiam, quod ex auro ad nasi  
narum in vicio patet, frequenter a praesen-  
te inflammatione obturatur, nec facile, et ali-  
qui propendit, injuncta ipsas per nasum hanc  
in aeternum apud omnes perficitur. Quo loco di-  
vis maxillaris morboe cum ceteris cave com-  
municat, et ne ciborum, sub eia, perito  
possit, cavendum est. Si ulcus eam cute,  
vel carne fangore, hoc in aeternum aeternum,  
hanc arte chirurgicae auxilio curatur oportet.  
Quae, ex causa virulenta, ipse in maxillas  
narum se prodit: ea quatuordecim lentius, vi-  
riusque specificis oppositis, impugnanda, et  
ad aeternum maxillis soluto tractanda est.  
Inter haec, recepti compari dilata solatio,

ac tandem restituta, potiuscum hic laudem meretur.

Ad *tractatum catarrhalium* quod spectat, in eodem, ac *dynamicis* hujus indolis, variis (§. 178.) tractandis; — ac si forte philogosis lenissimè accedat, ut nihil *dynamicis laryngis* (§. 179.) tractandis est. Vapores aquosi hic iterum eoque conducunt, et collectam ad laryngem pituitam molvant, rejectilem faciunt. Quia cum syrope de *oxybus vitæ* in mucositate tribuant, — hoc non alio, quam catarr, quæ fructu lubricior, obducunt, et ob seri utroquodammodo deficiunt, fundamento citantes. *Ulastrum volatile* cum doctura *charbide* ( N. LXII. ) laryngis angustæ illitum, — aut vellemus *empletum* hinc ipsi impositum, in casu lætali rheumatico, aut alieno, acutissimo conveniunt.

In *catarrhe fauciali*, ac in *catarrhe epiglottidis*, — sed, ob majorem palmarum mobilisationem, scrupulosam, jam trecentis generalibus præceptis observandum est. *Humacitatem* non parum editioris sale vulgaris, ac si venustioris in catarrhe ubique nocet, epiglottidis. Hæc quidem in casu febris *catarrhæ* constantis nocet, aut *garricæ*, experientia plerumque laudata est; ac si vim ducit vi-

desiderat, aut latus pulmonem occupat habitualis causam catarrhi, tuberculosa vel carcinomatosa cavitatem, dyspepsiam agere, vel ad pulmonis tubercula angustam digestam valebit: sed frequentius, in juveni procedens thoridique acies, inflammatoria catarrhi lethalis est insidiosa; ut autem cruenta, ferient sub malo, demerito, aut calidioris adhibita methodo, angustam in peripneumonia, haemoptia, aut et phthisi precipitant. Vix interitus tanta hic ager, ac illi, magis copiosius emittendi occurrat; nec facile revertitur, ut vix pulmonem inflammatio, per viam superioris lenticulam: sed certe naturae vires; cunctaque tempus, ut in curam, unde de bronchitis in curam repleatur; sub quibus angustam in folliculis rursus plicata, mobilitatem, expelli ut possit, adspici, vel remedia a praesentis revelli, ac impetu humorum a pulmonibus in cetera derivari, aut fortius illud ipsum, quod pulmonem insidiat, per cutem sub aequi blandique calore separari queat.

Quidquid non raro, ferient ac recente sub malo, vel et in ipso catarrhe epidemico, diaphoretis per hanc viam solutisque Diacrisi, ac retratis tactis medicis dactis, per

potius tepides ex floribus sambuci et ex mal-  
ta, vel thapsia verbasco, vel honden paratos,  
promota, — aut vapor aquæ per fistulam ad  
pulmones aliquoties in die maiores, ad bron-  
chiarum catarrhem sufficiant? Vel et frigida  
epota apud alios sufficit, ac tunc, per stoma-  
chum, pulmonem, aut cutis in nervos actione  
se stimulum a bronchiis abegit, mutans, ac  
brevisiori temporis intervallo, contradicentes  
scholasticæ theoriæ, catarrhum dissipat.

Sed maxime hoc in morbo laudem accom-  
dat, quæ desidia, postposita dixerunt, mi-  
sericordes esse crediderunt, qui specificam hinc li-  
piti in pulmonis vitæque adscribere nequidquam  
dubitaverunt. Hæc sunt medicamina, tam  
illa, quæ blanda mucilagines instructa sunt,  
æc dissimulantur syrupi, vel et pinguis, oleu-  
m, — tum contraria his lipiti stimulantia,  
ex aquila marina, animalis imperniæ acillat-  
is, et gaurii-fruticula, gaurii ammoniaci,  
ex keretis minerali, aliisque, generatim fac-  
tunt. Hæc iterum theoria, neglecto tactum,  
sub quibus hæc profunde videbantur, accom-  
dare exaruit, quamplurimè damnosa evasit:  
et cum a plagiis circa pericæpe ventriculi  
apud illos inciderent; apud istos, præteritam  
plagiis, et novo stimulo admocto, non ali-

tas, ac de ipis peripneumonia memimus ( § 193. ), inflammatio membranæ mucosæ bronchiorum non parum augetur. Saepe latens, a membranis, quæ dures obducit, affectione descendit, et a doli mariblogiae vel alia spudatos ludatis: vel quæ nuncem, ut equile, hermeti, craticas, ludat, per cæcitatem ventriculi vel proptis in nervos, vel laceram operatur, non vltius specificis peronic piritam incidunt, molitur, sed nepe ob situtem, quæ tunc iam augat, postterea copiam liquoris in bronchiis agere, et exproterationem suppressam servatur.

Varia hinc et hoc in catarrho medendi, neque auct debilitas, aut exaltat, pro febri, catarrho, aegroti habitu, diversa est ratio: Vomitorium interdum, sub cura inflammatoria vltus in bronchiis abentis, sub morbi cum abentis complicatione, sub puitas adlatus copli, transito, vel debilitas, quæ ut expelli hnt paut, majori, sub vni habitu, ac sub ipa pulmonum tate puitosa, egrile conduct: sed vltis puitasque in catarrho vltro, puitat, quæ ob febrem, ac ab laceram affectionem regulatur, vltis, entantur vltisam vltis catarrhocti, ac vltis vltisam dicitur, vltis; ac

quo tunc accenditur cum fructu per opem  
respirat liberis.

Sed sacri distantes, quas atrox, lacrimas  
haurienti divexas, antimonialis non minus,  
quam polygalae infusum amarae, gemini ar-  
omaticum aceto soliditico solutum, — si  
vere herpeticum, vel aliud rubens videntur;  
vapores, vel cicatrix artificialis, postea non  
quodcumque. Similiter tale *pituita pulmonum*,  
sed sicut roborantia ex cortice parata, vires-  
que nutriae, equitatio, linera maxima,  
vel sub acria aceto ac aliterbus in locis re-  
sistita, — interdum, ut distans, amarae,  
fumigationes aromaticae, indicantur. Si perio-  
dica catarrhi natura, atque, eadem ad in-  
firmamentum heridiam spectare docuerint: ex  
cortice, ut la laia, portento, quodam est.



## O R D. II. G E N. II.

## MEDORRHOEA.



§. 317. **C**onsideratis membranis mucosae, *Tromm.* vias aut hupulando diutius obducuntis, aster-  
cedere affectibus( §§. 304. 313. ), ad eos,  
quib, non obstruili mechanismo, podendream  
mucosa istinaque velantia frequentar perco-  
dunt, et Medorrhoeas, uti flum. podendream,  
generali sub acutiae compellari meretur, de-  
scriphas.

§. 318. Est vera medorrhoea, vel aut, *Reiteri.*  
ci, vel postherali praesentia, sanguinolenta  
interdum, materiae, ex venosili morbo, et  
cum vasis, vel ex pblagati praesentia, vel  
ex partu impedimento, vel ex haemoris jactu-  
re, vel ex lege coarctatae oris adis symptoma-  
tibus incedens, diutillio.

4. de, sept.

§. 349. Varias profluens hanc generi (§. 317.) , et quas subinde pueri illos diverso sub nomine demandant, species agnovit. Vel enim utitur viris hanc ex glande, ejusdem vicinis, aut ex ano, mucam, purulentam humorum, praeter naturam secretam eracit ; — vel utitur regulari hanc dictis et viis et illi committitur, aut ex rima, labii genitalium, aut ex vagina, aut ex utero, plurimum liquorem facile profudit ; — vel hanc ipsa ex causa divertis (§. 312.) propulsam negitudo evacuat, aut lente degenit abolvitur ; atque obstat, accidentaliter certe magis, quam ob constantis validaque causas, ut mala inter se distincta spectari, atque hanc *gonorrhoeam*, *diarrhoeam*, vel *acutam*, vel *chronicam*, hanc *fluere albi*, *haemorrhoeam*, aut *haemorrhoidalem* absterge decontaminatione aut falsa, aut morbosam, manifestis excretis indicem, hanc autem exprimente, veritas patet. Ut rectius in haec procedamus, hanc morbum distinguamus ratione loci, ex quo nascitur, in *ferm*, aut, nullius urethrae, vaginae, ac recti lateralis, — in *antrum*, ut puta, glandis apod vices, — apud *fermiam*, labiorem, aut clavae vulvae, — ratione causae, in *primariam*, *metastaticam*, *phlogisticam*, *atonicam*, *contagio-*



ram, — in *secundariam*, *metastaticam*, *religi-*  
*cam*, *veneream*, *gastrocam*, *calculosam* —  
in *simplicem*, et in *complicatam*, — in *acutam*  
denique, in *hæcicis* potius *intermitti*, — et  
in *chronicam*, *habitualmente medorrhœam*.

§. 300. Hæc, utique quodcumque morbi di. *Symptoma*  
faciemus, illam symptomatam iudicant, ac  
sunt præter *localem*, — sunt magis *extensæ*,  
ac *febrilem* *inardum*, *symptomatam* *afflict-*  
*ationem* continent. Ea namque, quæ *re-*  
*ctam*, quæ *causæ* *uri*, *vaginæ*, *sinu*  
*morbosæ*, *anxiæ*, *invenit* *diver* *acutæ*, *va-*  
*sculæ*, ac *folliculi* *mucosæ* *membræ*, *glen-*  
*dulæ* quæ *prostatam* *constituunt*, quæ *potit*  
*ad coitum*, *ad virat* *labia*, *subili* *vaga-*  
*mento* *concentat*, *iacent*, a *utero* *quocum-*  
*que* *affluunt*, non *aliter*, ac *similis* *ad* *anxiæ*,  
*laryngem*, *tracheam*, *bronchiæ* *hæc*  
*membræ*, *irritatur*, ac in *phlogosin*, *ery-*  
*sipèleram* *plæoræque*, *phlogosinet* *facordum*  
*naturæ*, *repiuntur*. Sed *juvat* *potiora* *ex* *istis*,  
quæ *collet* *ordies* *incedant*, *possibili* *hæcicis-*  
*te* *exponere*.

§. 301. Ac primo quidem de *acutæ*, *uri-* *mutat.*  
que *maxi* *commotis*, apud *vinos* *longioris* *ma-* *mutat.*

gloque incurrat, apud feminas simpliciter, brevioris, nec vero latentioris, ut in illis, sed vagantes appoditae, *hemorrhoeae*, seu fluxus men-  
struus ( *medorrhoea ventralis acuta seu brevis* ) remissionem facientes. Apud, *feminas*, medor-  
rhoeae haec species urethralis, per remissionem  
fert magis, quam ob propriam unitatem hae-  
re in cetero phlogosum, vixi videretur.

Hic morbus, et quod frequentius ab impo-  
ro concubitu, quam alio ex causa (§. 533.),  
oritur, a rebello plerumque sub eodem, ac  
ipsa syphiliti, tractatu expositi, et a plurimis  
cum eadem dicitur tanto, ut credamus, expe-  
rientiae fundamento, et a medicis cum cetero  
aggravantium dissimiles, confundi consuevit.  
Si quis interius consideret, medorrhoeam ure-  
thralem quocunque ex studio huiusmodi il-  
lato originem agnoscat, adeoque viam syphi-  
liticam in illa producenda potuisse, factum est,  
haec urethrae affectionem medullarem saevum  
effectum esse. Nec minus Venere, qui, si-  
quidem hoc in morbo per urethram dissi-  
lata pro uretra corrupte declinant, hanc  
ipsum generis huiusmodi, aut, epitheto venere  
superaddito, ab illa, quae benigna sit, di-  
stingere valere, veritasque transit aberrat.

Eadem hoc in morbo, quam in ceteris

( §. 308. ), — vel ad arbitrium in viris cum mulierum , et ob majorem uterine mobilitatem , angustam , posticam divensam , ob nocturnum uterum per hunc decursum , fortiora plerumque symptomata , per uterum , cauterium , contrahentis , distumentis differenda , diversa , et cum per utero non laepe dividenda , ut differant.

Ad primum quidem , vel stimulo mechanico , locali , vel debili , alia ex parte , ad uterum irritant materia , vel contagio , mollioris letitiae ex sima , vires paucas ante hanc , — frequentius tunc , quatuordecim post dies , — tunc post hebdomadem , — nascitur , si unquam , multo tardius , conceptu , nascitur , hoc ultimo in casu , ad partem uterum anteriorem atque inferiorem , in alio , ad aliam , partem , distillando , gastralem caeteram legumque concurrens , ac tunc major in Venereis infestatione proclivitas . Succedit stris , tardiora veniens , caloris , ardoris primam moderat , — ac utinas , licet paucas , ad vel excrementum frequentius stimulantis sensatio . In viris , anacoli spontanea , nocturnae impetibus , et ingratis excitatione , cum aliquo laborem uterum calore , tumore , pressio super glande externa , — in foetibus , uterum vaginamque

Med. 1800

extremam ad os, ad levissimam materiam, phlogogonem, per labiorum vultus superficiem et complicatam materiam, — in aliisque, post ultimam eruptionem, ardorem majorem acutiusque miccionis accessum sequatur. Hoc sub crassa, succedente meliore die, ex ventris plerumque humoris mucosi, puriformis, albescentis, guttulae modo paucae, copiae, acutius et acridius, quo major est irritatio, plerumque accedunt, in lixivum flavissimum colorem mutantur, distillant.

In quibusdam vic aliqual, praeter ultimam perforantem materiam guttulam in ore ventris haerentem, comparat; ac leviori sub eadem malum, hoc solo jam studio contentam, post paucas modo dies absolvitur. In aliis, non minus, majori scilicet morbi sub impetu, non primo, nec alio in studio secundo in ventris aegerat; sed in sola hinc inflammatione, citius ab majorem violentiam rursus, acutius condit.

Interdum.

Ardorem sub mitigando, ac glacie repellenda vel paucis urinae catenatibus, medium curandum, rursus plerumque, vel quartam ad diem, cessat. Sub illis scilicet symptomatibus, confusum alacritas, ac ventris magis magisque robor, signaque; dolores cepe per omnes urethrae lon-

gitalium ad perineum extenditur, et attactu, exteriori impetu parte, vasa interna ad foras iterum. Cuius penis, aut scapuli labia utrique pedibus, rubore, itaqueque penis ipse calet, ac vel crinitis erectus, valetudine roboratur, aut plenum vitium; quod credendum arguitur, nec solum, sunt magis doctores, aequi, induriti, recti, plerumque sive effluvia male; excitatione frequentes, dolores, impetus ad noctem, denique decumbentibus, succedunt: sub quibus erit excretio ad perineum quasi analitica sicut ac tormentum arguere cogit. Pallidior, sub his membris vultu ventosus violentus, spermaticus, sub onere contingit; nec a vigiliis, voluptate expertis et amentis accutis, rubore constant. Jam vero major humoris periferiae quantitas per urethram continetur, sed precipue accumulata ad hanc, perhibetur: qui humor flavas portiolemas, acque subvires, pertinaci in linea macula relinquit, ac saepe cum sanguine, per uras, aut lacrimas remittit, necdit, aliquando totum per urethram humor affluens colore albo relinquit observant. Quo major phlogosis, et, quod hoc mali sub impetu accedit, febris est; coctior, magisque crassa, lentior, atque acor,

et partes vicinas, quae aliter, erodit, exulcerat, liquor distillat.

Tumorem  
dilatans.

Inflammatione majorum ad gradum aduocata, et magis magisque exarscit, hic fluxus, impetio apud vires, a frigore aduocata potius situra, vel adstringentium injectionum abusu, a nova Venere, masturbatione, coeuntio violenta, a potu copioso, suspenditur. Mox ardet ac dolor sub refrigerando indigenter lacrimat; universa tunc urethra tenditur, riget; penis ipse inflammatur, calor, tumescit, et duritiem accipit; crebriores virgae frequentes, priapismus, cum doloris lancinantis ac urethrae perforantis mora, ad frustulum impetio directo, subiacent. Hic, tumescit urethra, utriusque tumor inflammatorius (§. 314.), ac inde inguinalis (§. 313.), interdum aphthosus (§. 130.), — ad anum, tendit, accendit. Continens ad alvum non urethram elongandi viciniam urget, nec leve gurgit expletur loti; repleta ex pelvi stragile vesica, laborum dolor, crura, vomitatio, vomitus, anxietas, iactatio, pressio, tendio, tumorque dolor periculi sequuntur; ac, nisi promptus dentur auxilium, cum obortiva, paralyti vesicalis, gangraena, vitioque lassandi periculo, eructio-urinae in totam

suppeditat. Intendit plura, per arthras longitudinales, glandulas lymphaticas rursus, et dolent: quas, fortius supponant, ac in illas apertas, ut impetus ac passioe urinae abscissas foliolasque acuti, perforati, coarctant. Hinc inflammationis malarthras urethralis periculis, tam vehementia, quam distensione symptomatum, pro cunctis, acerbitate, habituque universi ratione diversa, nec brevior miliorque est; cum, si eoociquam praesentit, pluresque ad octo, decursus dies extenditur; longiorem, sub virendi, mendendi ratione perenne, in marem protrahenda. Sed alia his cruciatibus pernepe iunguntur, quas describi hic magis, quam alibi, meminit.

§. 311. Quod si scilicet uia magis ab urethrae parte inflammatio, ut postula, praedominet, ac sub ista, ut solit (§. 105.), humor puriformis in urethram lateris illius cellulosam transudet, — aut glandula lymphatica, folliculus mucosus ad conspicuam magnitudinem turgescat; aut sparsa cellulosa, utpote sub erectionibus sanguini dicata, ex progressa inflammatione, delita, vel quancunque ob causam ex parte destructa nec, operet, ut penis erectus, quo loco corpora cavernosa a vicinis

saure corrupta, vel ipsamet ab inflammatione corrupta, vel ob colluctum concubitum deleta, tangere minus possunt, a solita rectitudine declinans, in latera illud (abardare dicunt) vel brevis, vel *diversis* afflecta, curvetur. Ad inflexionem vero penis, quo loco ventrum corpus spongiosum amplectitur, possidendum defleat. Est iterum in indem sub illo agens sacculus veretri, Hic aqua evecti, incutitur quod non minus, ac ipsa melleo ( §. 527. ), ac dextra ipse melleo sub penis curvetura defleat, apertum praecursum atque stratum hoc ad placentiam non contribuere docet. Rarum est, nec visum nobis, quod ligamenta penis suspensoria ab inflammatione corrupta, ad pubem retrahantur hinc idem. Secundum sub violenta penis incutivi erectione, incutit, quod *symptomata* vocamus, cum impetu, ac pluri, ut movimus, ad libris, et arethas praecipit: quo facto, symptomata inflammationis lo quibundum ceduntur. Sed in quavislatione moderatissima ventrali incutit, ut evectum ( §. 521. ), hinc cum melleo, quin igitur corrupta vero, cum ludo ubique praecurrit, movetur.

Nota.

§. 523. In alio, sub ipso morbi impetu,



glandulas linguales a tumore cum phlegmâ ,  
 erossione , dolore , ac erossâ in apparetur  
 sine pediculi , seu indurati ( §. 83. ), cuius  
 varia est indolis , curatio videtur. [Triplex  
 verum modo , causa morbi vel ipsa ad glandulas  
 delata , — vel sibi , vasorum lymphaticorum  
 ad eas , — vel denique ad nervos genitalium , hactenus , dudo , idiosyncrasia  
 illa , hic vera symptomatica , nascitur. Utrumque  
 ex istis variis aut pro materia absorbptâ ,  
 aut pro stimuli longinquâ differentia ,  
 naturam agnoscit. Symptomatica vix non ubi  
 que est bubo medorrhoicæ structuram simplicem  
 esse , aut vix naturam , aut vigentem con-  
 comitantem : et sicut vulnus , emplastrum vesi-  
 cans , vel sola adeo punctura , parâ amabili-  
 lica , et ex qua glandula lymphatica vascula  
 vel generis-mucosum , ad longas etiam di-  
 stantias , sicut , parâ saepe buboni in illa ge-  
 nerando sufficit ; ita et quævis ad trocham  
 irritatio , vel colus ab acri , cuiuscunque de-  
 mum sit indolis , eadem introducta contactus ,  
 vel simplex inflammatio , quia hæc ipsa ad  
 glandulas penetraverit , bubonem producere  
 queunt. Producent vero asperitatem , quia va-  
 sa genitalium lymphatica accendant , glandula-  
 rum linguales ad strigos ; cum stimuli ex

esse affecto videtur, si ( non una existeret ) utroque lateri arteria vasorum communicatio lymphaticorum defuerit, inferiores potissimum ad glandulas tumorem, promoveant.

Quotiesque vero cancer in medorrhoea uteruali habet agnoscat, nisi alias syphiliticis tumor et simul manifestet, leuota est curatio, utrum idiopathicus, symptomaticus, et diuersus sit, diagnoscit; ac utique in specie dubia est, a morbi initio, tumillius, quae excipit sit, — tum ejus, quae simplici contactu miculat, manifestatur. Nec enim semper, qui symptomatice excipitur, habet ut melior sit, aut scilicet dissipetur, et suppuracionem effugit; nec tumor idiopathicus aut cunctis celsior, aut resolui curari resistit, nec denique minus vix, quam scilicet una lymphatica receperit, et inguinales vel glandulas duxerit, materiam, ac vixit liquoris nervosum, habentem his loci producere potest.

In uno, altera glandula, praevia plerumque stimuli in genitalibus sensibiles, habet inguinales compertit. Tensionem, et quasi chandam ex illis ad inguina remanens angredi accendit; et in glandula affecta calor, tumor, tumor durus, dolor ab tactu sensibiles,

occurrit. Si plura circa glandulas affectae  
sint, tumor inequalis haurigit; sed cum ex il-  
lis, cunctis incremento celeriter praecedat. Hoc  
facto, viris colore mutatur, rubet, calet et  
tenditur ipse. Variam sic habet volumen ac-  
quirat, ut ab ovi, ad pagani magnitudinem,  
mecum corporis pressive potius impediatur,  
evadit. In multis, fibris aut intesta his phar-  
macis accedit; in aliis, parva inflammatio  
dolorque parvus se praebet, viris palluit, ac  
sedentatiori tumore naturam habet assumit.  
Hinc varius istius, ac pro causa violentia,  
pro aetate, modis rebus, diversus est  
exitus. Part plerumque habentem, quod prae-  
ter ob solam hypochondriam dimittant, alii cum  
eventu resolvitur; alii ex istis se solvantur,  
non raro perquam rariolam, marasmodi, vir-  
ribus aliqui dantur, calorem utique ex-  
pelles, acutant; praeterea gurgulem sublo-  
quuntur.

Ne vero habet cum dextra inguinali confen-  
datur, cavendum est. Distinguitur ab ista, quod  
magis datus dolorque sit; quod loco profun-  
diori haereat, magisque mobilis ab istis esse  
valeat habet; quod lentius plerumque, in her-  
nia, et ex causis diversis, oritur; quod exitu  
ruborem nec contrahat, dolorque; quod her-

inter symptomata deliquit. Non fuisse cum atrophia habentem aliquis constanter, dilucius illas, quam letum, extrahi, si lentius colligat, vel ab ipsa infestis, modis, si dolores plerumque experiri, nec tantis inflammationibus, quam habet, capere esse cogitandum. Utriusque complicatio nulli per amictum in ea, quas habentem praecedunt, vel quas easdem comitantur, alium erant.

#### *Epithymia.*

§. 714. Frequens medorrhoeae uterinae symptoma *Epithymia* vocatur: quod nomen morbo, quoniam laepe *lemnia humoralis*, *reducta* vocant, *genuerunt de rebus delictis*, sub titulo huiusque nominis, modis connotat. Non modo videtur cum liquoris puriformis et ventris exordio quovisque per causam supponitur; sed et medio, quod quidam accie sub affluere, et, ut videtur, sub dubio adhaerent huius principio, vel et sponte connotat huiusmodi, tumor nulli et quasi palpatus prope ipsum, ut sine duplex videatur, modum comparat. Dolor ventris, harum, coarctum, aucta, recta, interdum variata, horumque, diarrhoea, aucta, quoniam praecedunt; pondus ad ventrem sentitur, ac aliqua sub inguine, vel attactu dolor et

prodit. Post diem unum alternave hic tumor dolorque increscit. Plerumque vero epididymidis portio inferior, vel et tunica vaginalis, non ipse testis, tumore induratur, ac in molem illa convectam, tamque amplam, et tamen vix non omnem, manifeste molliorem, circumdat, circumdat. Necesse dolor, imprimis ad noctem, augmentum capit; ac tumor ipse, jam durior, per totam epididymidem, per vasa deferentia, ac funiculum spermatici portionem, sub figura ovali, pyriformi, ascendit, ac peragat virilis magnitudinem non raro acquirit. Hoc verum sub statu, vel ipsi testiculo, vel tunicae vaginali, ipsique uretro, inflammatio commoveatur solet; videmusque, ex hora, paucorum intervalla dierum, hydroperitonaei vaginalis acutae atque conspicuae veniae. Interna et ipsam vas deferens tangit, ac tunc quasi efficit funiculum, et vasa spermatica sanguine ultra modum distendit, et quasi varicosae, tumorem adaugent, et abdominalem ad ventrem, forte ex spasmu contractam, irregulariter particulam, sub ventris dolore, retroflectio, vomitus, singultus, minatur. Quotiesque inter manus, aut corpore erecto ingreditur, prae dolore per nervos spermaticos ad rectum regio-

gum curare, impeditur. Nec tamen fibræ aliquæ hic regn, vel parva ex leucæria, nisi major hæc virilitas et plethorica existantur constitutio: quæ sub statu, et ætate, et dolore ad coxas, et feminas, ex leptocongesta oritur. Plerumque hic tumor inflammatorius, qui ipse irritatione, phlogosæ ad urethram prægressæ, aut putredinis, symptoma est, post unam alteramve hebdomadam desinitur, ac tunc est illic, modo recte tractus, *suppuratio*. Rarissima hic loci, ut foris ex ductu folliculi spermatici abdominalis ad anulum strangularioris reperta, *gangrena* est. Frequentior *epithymoides*, a morbo repente, *doublet*; interdum cartilaginea, et lœvior, occurrunt: quæ lœvior, nisi major sit, ac a causa irritante in maiorem flugorem excrescat, aut foris in plenum periculo cardiothia struatur, per multos sæpe annos, suspensæ cæcitæ, sine viro salubri, vel ipsius folliculi, decessuque perferat. Hoc utram sub statu, aliquando *hydracale* tumori ventisæcedit. Interdum ex uno ad alterum testiculum quædam transit inflammatio; interdum occidit, modum autem per urethram, suppressio foris, effluat, dissipat.

§. 345. Prostatil, penis ante coitum, ut timore: etiam super istam non possit, membra stric-  
tore, phimosis vocatur. Haec interdum pue-  
ris congenita est; ac facilius urinae excreta-  
tionem apud istos, — in viris, penilem orationem  
completam impedit. Sed accidentalis, multi-  
plici ob causas; insidit phimosis: ubi vel  
prostatil, glandem coarctante, extensum ad  
labrum, distanter immixtum; vel eodem ipse  
modum hoc una vagina majorem aequat. Re-  
rur hoc videtur, ubi ob auras forte tandem  
in glande inflammationem, excreta, ver-  
tute, — frequentius potius, ob oedema,  
phlogosis erysipelatosa, ulcera, collum, for-  
mali lacuna, emungit. Ex progressu va-  
riata, et oboculata in ista prostatil ad lim-  
bem reflecte, phimosis coarctatur. Scilicet  
ob laxam internam prostatil membranam, va-  
lacque cellulosam, qua haec cum externa con-  
nectitur, naturam non omnes, ac ob declivem  
et pendulam hujus veli positionem, facili est  
struere, lymphaticis, posteaque humoribus, — quia,  
ipsum urinae, et acribus, per ulcera lacuna,  
ab aetate, vel a phlogosi progressu, infil-  
trando. Sub ista prostatil utroque, tunc,  
passim, interdum vixit sua *bullicis crystal-*  
*linis* superiores ad marginem obducitur, ac

viam latio, vel et magis, caeteri, allocationes, sunt adhuc distinde, pericula. Hinc frequenter apud illos, quibus longam et acutissimam est propositum, ad phloemam, cum ubi moritur, glandis medullaribus, quam si altera venosa, alia, hic loci latent, confuso habetur; et alii promptum hinc male ferat anallum, praeter utique, caeteri, caeteri impedire incommode, et praeterquam glans ipsa penis non, interdum vicia cum propositum partem conuenit, — per alteram, aut a male collecta, abesse non forma elevatum, corruptum, vel, quingitum altera, per parte, vel tota, praeter, utingitum, ac iunctam cum paraphimosis ( §. 314. ) phloemam formare videtur, — a caeteri hanc tenet membrana gangraena corrumpitur. Alia in longam cum tempus trahitur, et chronicam phloemam indolem accendit.

Paraphimosis. §. 314. Considera exposita ( §. 315. ) viciam, cum scilicet propositum ante penis utre glandis conuenit, hanc super ipsam abduci nequit, paraphimosis vocatur. Hanc dicitur, ipsa ex phloemam, repale violenter, non prius lacata, per glandem propositum anallum, utingitum caeteri, conuenit apud illos cum;



quibus breviter magisque angustam satori præ-  
positum, et implentem non velle glandem su-  
am voluit. Interna scilicet petiolicum illius  
arteriarum tubulice, lacus, testicular, qua-  
cumque ex vasa, intrata, et cum sola cellu-  
læ vicinæ a phlogosî correpta, intumescit,  
resolvitur, et a cute circum la mure, vel  
plures in annulos contracta, cum ipsa glande,  
quæ tunc, lixiv, vel bullis crystallinis obdu-  
ditur, non sine cruentis gangrænar, colorem  
mutando, vel adeo letali, periculo stru-  
gular. Interdum, minus vehement, hoc ma-  
lum, ob incertis præseprio venarum, per lon-  
gum certe tempus, quod abest, præstabil-  
uit. De tumore testiculi, a lymphæ coagula-  
bili, inter præsepiti lacinas congesta, produ-  
cti, ad capitis infantilis magnitudinem in pu-  
erphicorū adnoti, et ab experto Chirurgo-  
Heister reperi, exemplo nobis constat.

§. 317. Jam alio in loco ( §. 152. ) apd. *Artemi-  
Abelavidiæ*, quæ medicoribus uterale vi-  
lentius suppressa inter cunctas æstivationes in-  
ducit, mentionem injecimus. Difficile hujus,  
aut quidem, phænomeni explicatio est; ac  
si genitalium cum oculis communis, ut vide-  
tur, pro causa debeat admitti, non minor sa-

men illorum cum larynge, vel cum thorace  
equestris, similem in lea maribus, quod calu-  
mam, non seducit.

§. 312.

§. 312. Hanc sine mor principis, quae ma-  
dum medorrhoeae vrbense inflammationem  
apud mulieres circumdant, et ex partem con-  
sensu arduar, symptomatica. Sed, unde con-  
silio monemus, ad morbi principis ( §.  
311. ) descriptionem redeamus.

Tumorum scilicet adu malarum, licet ar-  
dor dolorque per totam ventris deorsum ex-  
prodant, raro a loco navelis ultra pollicem  
cum dimidio extendunt: quo loco, ab atti-  
ctu petiuntur, ut a carbene accensu, de-  
lente, suber erysipelas vrbense superficiem,  
et cryptas mucus infundit. Interius frequens  
prostat glandula, posthanc morbum ab ac-  
gros diutius neglectum, vel aliquoties repe-  
tunt, suppuratio, ulcus, ac pendens ab  
his locha, — phlegma non tam raro,  
ac credite, ad ventres posteros huc,  
et ipsos perianthi emittens, tamquam, dolo-  
rem, in aliis symptomaticis, in vera proctae  
ac colli vesiculi, vel vrbensem leucum  
vrbentorum inflammatione consistere, nimis  
confirmant.

Hoc igitur stadium, sub quo majora meorrhoeae uterinae diuturnae sequuntur, et febri interdum valida accenditur, per octo, decem, fere dies protrahitur; quo tempore, sub debita cura, symptomata vel sponte decedunt; humor effusus magis magisque albescit, crassitatem majorem accipit; ardor sub urinae exitu dantes excruciat, erectiones dolentes gradatim sedantur ac denique cessant; muci copia quotidie immiscetur, ac postmodum demum, albuginis, pedunculae subacutae sub forma, aut filorum vermiculatione pellicularem adhaeret, fœdum urinae perit; nec raro, arthras cunctas ad actum, et praedominantes hoc ipsum obstruunt, ac menstruationem hinc illudens obaculum posuerunt, coarctat. Tandem totae, aut alterae partes hebdomadae, singulae hujus morbi localis, nisi nervi erigant, quod, ob reliquam in utero inhabilitatem, facit esse, — nec ob menstrua leviae plethoricae, inhabili supervenientia, etc., revocari, ac demum in abstrusam meorrhoeam (§. 536.) converti, symptomata disparia.

§. 539. Ex dictis vero symptomatibus aliam modum eam, aliam utraque diversum.

I. 3

Meorrh.  
cap. VIII.

Sed licet feminas; sub micro, ad urethras principium, ac eandem positas per viam, non parum doloris accedat: primo tamen in eo, quae per contagium patitur, uriderioris, irritantis tactu, locus, quo virus prodire pertingit, ad vaginam meam, demonstrat succedens mox ab impetu concubitus hoc in parte tollendo, calor, ac tumor; deinde sunt summi vaginae, ab stritu, vel ab admixto viri congressu, dolor; ac demum ipsa ligandam colorum inspectio: quae, motum, licet omnis ad curam vaginæ deferrius conficere videatur, ac hoc usque ampliori superficiali causa periodum deplere docetur. Hinc major ille sub utero miranda tumor, non minus quam uteri ipsius, ligamentorum, pubis, lumborumque laetudo, dolor, vel ex solo harum partium cum vagina accedens, — vel in quibusdam a modo congressu, contempnente ob matrem, inconfecti, quo contagium extrinsecus magis applicatur, pendebit. Hanc igitur evidenter vaginalem, quoad materiam producentem colorem ac laetorem, cum affertur (§§ 311. 312.) contemnat; sed longe minus plerumque feminas, quam viros, nolet: Nam plura in illis, ad eam, ab vagant virulentam, obremi uteris ad istam adduxerunt,

Intermittens sentiantur; ac ob spasticam laxamque vaginæ structuram, ob declivem ejusdem positionem, ob novæ à monstris recurrendæ irritationis, frequentior in chronicum affectum (§. 330.) transitio contingat. Exempla, ubi singulas metorrhoeas, cujus ipsæ symptomata eandem pertinetur, vix deducunt, hæc præse habentur;

§. 330. Vel sine contagio et quavis à vitio mechanico, vel alio, imprimis hæmorrhæo, rheumatico, nervinotali aut applicato, vel a virus infecto, sub horizontali desubito, ex vagina rivos autem coefferent (§. 128.), vel hæmorrhoidalem compertum, vel spiritui penitus, aut aliter tactu scilicet, demum ex utero fugio, — sub indurata interstium, ac in ipsa dysmenœa symptomatibus, ad eam metorrhœam comparat, et mox pariformis, a partu, quod fetore, absterget, hic loci non raro largiuntur, diversi, colore albi, flavo, rubeo, aut viridi, subinde singulari, coalescent, sponte secunda.

Medic. 1740. 180.

§. 331. De mox pariformis ex labile signa que mollium externa sunt jam diximus (§. 328.). Sed et vici interdum, licet raro, ex

Medic. 1740. 180.

glande penis sola, vel loco-locum ac præputium intermedio, nec veniens ad collum, vel decurrit ad internam præputii superficiem, imposita sub phimosis ( §. 515. ), tandem expulsa, nec donec abillo, quæcunque urethra placet, distinetur, ita ut sit præputia, cum penis affectus rubore, splendore, calore, tumore fundant: quodnulli genus apertum quendam *gymnorrhoeam* dixerunt. Nullus hoc in casu urinae ardor, nulla in mixenda visco, ubi simplex, nec ad urethram excessum est malum, diffusus occurrit: sed tenax albaque mucus glandem, aptharum, ulcra, nec et pseudomembranas sub forma, lacryram et illasum obducit; ac, pro curat curare, vel posuit post dies, vel solito madorrhoeis descriptis ( §§. 520. 528. 530. ) longiori decursa, secedente interduo epidermide, dicatur.

*Medicam.  
chronica.*

§. 531. Quicumque vero ex diutis madorrhoeis speciebus ( §§. 520. 528. — 530. 531. ), curantibus licet irritantibus instillat infidit, ac studio relaxantis ( §. 532. ) per aliquot per hebdomadas protraxo, nihilominus nec nec nunquam siccatur, nec ab exigua resolutione repulsiat: et, utroque in caso non indugere, in sequenti sequentes, *Adstern.*

*flu,* vel *abundantia* vocatur. Scilicet, quia ad *lucet*, ex quo mox effluere continetur, sub *miro*, vel *eror*, vel *dolor*, — quia in vi-  
ci erectio molesta, vel sub humoris genita-  
lis exultatione, crebris doloris sensibus in-  
teritur, — quia ad vaginam in finalem, sub  
volu, precepto ingrata experitur, humor re-  
nat, ubi plerumque, — interdum et alterius,  
coloris, — non parum, marasmo impeditis  
ad hunc, vel tempore, quo alius recipitur,  
aut rivulus potestati, aut rivulus, con-  
tento, distillat, et viscidam undamque acro-  
diti et propiti factoris non expositi gloriā ge-  
nitale requirit, utroque, sub anni condicio-  
tis cunctis, non parum infingit. Atque hanc  
est *recondita*, quae utroque in vita ex ac-  
to, et ex ea, quae coniugium agnovit, ne-  
gligita, vel interu itumque volente, frequen-  
ter procedit, *medicamenta*. Glans, sub ita,  
hypergimus, nisi talem, quam imperitus pro-  
ducerit, breviorum, non videtur.

Aliqua originis, non vero diversae peritus  
naturae, est humoris, aspectu mucosi, et fo-  
midum genitalibus fluxus disturba, *flor*  
*alba*, *recondita* Austerum: quod gravi pro-  
ducti medietatem fornicum incertum, vel  
conugio carum, vocabitur.

Med. Ann.  
1799.

Capituli, uterinique vapores ac muci foetores, uteri, tuborum, vaginae cura infusa, Haec ita contingunt, ut una lae fœmina, aut virgo sit, aut mulier, exoritur menstruatione, coarctata, partusque vicinis, praecoxia, pernici, tempore, indolens: & vaginae fluxus sequitur. In homine interius, quae corpore erecto innedit, leuica, frequentior, et caeteris adeo non semper rari magis, liquidum hic loci aut capitulos, quos par est, et quibuscum accretatur; aut per vasa lymphatica abduci non potest, quae fit, ut humor viscosus, mucosus, puriformis, coloris rubellidi, diarrhoeae, vel ad viridem, subnigrum tendens, — odoris nauseosi, vel et foetidi, tanto modo putidus, cum menstrua vel invadat, vel coarctetur, diducatur, vel sub alio, modo corporis fortiori, ciborum, potuum spirituosorum intemperantia, perspiratione suppressa, vel ad hunc mutationem, vel leuoris, vel periodicis subinde intervellis, — quae raro cessante, aut praecox, aut plurimar, sunt blandos, sicut acris et vicinis ardentibus, diutius. Non abscessus cum membranis, quae genitalia obducit, haec, ab eo nascuntur, gargaris, machinis, bronchiorum, quos ( §. 306. ) descriptimus, siquidem est, ac corporis verum regimine restar-



# MEDORRHOEA. 193

rhoea, autum, chaoniceque dicitur ; — aliter  
ex coryla ropera nascitur ; — vel hanc i-  
psum, a paludis avertit, et exemplis decem-  
re, et tunc, et antea, et tunc palme-  
num pituitosum ( §. 513. ) producit medor-  
rhoea.

Communiorum hanc ipse, urbium inter Dorsetia.  
haridiorumque regionis delicias, imbellis, ex-  
chevices, hancque habitus incolae amor ex-  
poris privetis, — inquisitionem apud artis-  
es gaudet, vel illas apud matrem, que is-  
plus abortum, aut, actus tristicii, plura,  
aliqua videtur alio, deliciasque portat, —  
aut nullas equam, steriles, expertae sunt, —  
que propriis crudelis probris ubi indolent,  
— quae contumacia moribant, — quae mem-  
bras fluxu privatur, aut parum alio, dif-  
filiemque fiant, aut membra parientur,  
morbum coarctat, vel nullis ex aere, nul-  
longue corporis ex habitus, que medorrhoea  
hanc opus, et cunctis dicitur ( §. 513. ),  
non interduca laborant, et virgo impubes,  
matur, et femina caelebs, et uxor, et ve-  
rula impubes, hoc a fluxu hanc raro fidentur.  
Vel sub ipse gaudet fluxu alio in-  
videns fiantis coarctat dicitur.

Quo ex hanc profusum hoc morbum non.

accutius, et quæsto. Ea certe vixit ag-  
gans, qui hujus ad oculum in tunicis pallis,  
in virginitas, in gravidis, clausam recipiunt.  
Utrem accutius, qui introitus ex hoc in-  
pao fluxum stillare accutius, fluxu ubi vel  
prævi, vel mox a quatuor emagere videntur,  
de, vel menstrua supplens, menstruationem con-  
siderat. Nec certe sicut extensus, vaginam  
præ aliis, non vero et uterum, et tubum infus  
aliquando, hancem, de quo agitur, largiri,  
ratione pathologica id ipsum docente, puta-  
mus. Virginitas ex utero accutius; purgati-  
onibus hancem claudere ab utero: sed quæstio  
hac vix patet, totius ex utero, tubumque  
cavo hancem quævis morbo accutius per  
hanc claudere fieri, ac per vaginam claudere  
impedit. Nil utrum hoc in morbo frequen-  
tius ipse laborant, vix tanta in abortum sub  
hoc prædictis, nec claudere tam usque in  
hancem hoc prædictis affectis observanda re-  
sultat.

Medorrhoea  
in virginitate.

Nec certe, quæ hoc sub morbo sunt, ex  
pivitat sollicitudo diuola vixit, nec claudere  
sanctum, credendum est: sed hancem prædictis  
môr (§. 118.) ex omni, quæ hancem prædictis ge-  
nitibus, imperitiam claudere, non aliter, ac de  
utero utraque affectis claudere (§. 121.),

ventratur, et cum mace cervicis uterinae vaginalisque exoneratur mixtae.

Hinc difficile non raro mæorrhoeae rationem nam ab illo, quod contagium plerumque ex meritis non misceat, quare vaginam laedit ( § §. 341. 349. ), profluvio, tam a parietibus, et lacuna in gestatione mulierum interitis, aut vicinis, quae cum intus contrahuntur, ad partes abectum, vel ulcere, pendente effusa diffunditur; et nec materiam per vaginam defructis aspectus, nec alia eisdem, quam uterut dicuntur, qualitas, nisi ex causa ritem, quae praesentetur, ac symptomatum examinae hoc aliqua assignat, ad diagnosis sufficient. Difficultatem via parit mæorrhoeam durissimam, pallidam, albidam, ex tunc vel tunc potius coarctatissimam, via singulari rictorum, quae virgines interitum ac mulieres chloroticas sub certis periodicis patitur, a fluxu albo, qui proteritur ac sine ardore, vel cum interdictis, aut simile jam mensibus succedit, distincta. A pure, vel mucosa materia ex ipsa verina veritate, mæorrhoea per contritionem effusam, quod ex vesica, a paralyti non afficit, non nisi lacuna pseudophibitacoe contagio, ac facile distinguitur. A vera gæorrhoea ( §. 347. ) differt mæorrhoea,

menstrua  
materia.

quod meritis fletu, aut voluptu, et acutis  
torturis alijs combetur, ac major debilitas  
sequatur. Ad purulentum et vaginæ effluem  
quod spectat, hic nota coligat, quæ prægre-  
ssu inflammatorio, reparatio ad uterum, velle  
cane, laetitia, peritonæum, cubitule, ac digitis  
interum ( § 5. cap. 27. 283. 280. ) a medor-  
rhoæ vaginæ valentur ut præterit distinguitur.  
Mingit ardeat, impossibilitate interducat, aut totius  
ab ardeat, per contagium plurimque indacta,  
vel ab angustis educta, vel quodammodo pro-  
tracta, vel ducem compellens ( §. 383. ) ab  
effluetis. Si fiduciam imperium neganti ha-  
berit quer, et cubitule matri matri re-  
sistentem confirmet; si ardet, dolor, vel  
vixit difficilis, erumpens, a morbi luto  
deluctis; si profusum passu lento, aut bre-  
vi tempore, priusquam mœnem prodimat,  
aut mox ab his, incipit; si præcibus pos-  
sit, loco ingulato, ardeat, mœnem ex utro-  
que, subinde, ac velle mœnem, plus-  
mœnem, ac certis modo periculis, effluet; si  
blanda prius ac parca curis, velleque ma-  
teria, sub uteris symptomatibus, ac velle  
consequat copiosior, sub lumborum, velle ma-  
tri, totum dolere, velle lumbos, velle  
fluxit; si luto corporis apertio, velleque l-

bon, aut quae dicuntur alia, vel quae infra dicuntur (§. 533.), praenotanda: tunc profecto illi lachryae lacrimae et aliaque vix debite observantur. Augmentatur difficultas, si major effusio sit: hoc per se arduo jam addit, ut, ubi debita licet genitalium partium, haec ipsa tamen, aut illa viri coeundi aetate, evaleant, vel antedictorum veritatem (§. 530.) ex parte, quae interdum contingat, inducat. Tamen facilius breviorque moram in vita, quam a contagio recepti, malorum est cura, ac si delicta symptomatum, quae semine a morbi principio bleedica continent, et tunc magis ad lachryas veridicatasque differant, his fluxum, — non tamen semper, ut error sit locus, ut clarum, accessit. Fluxum aliam sub fluxu morbum esse, quod menstrua ex contagio non faciat, nisi quoniam fundamen- to, cum humor uterque cum sanguine mixtus distingui non possit, dicuntur.

Sed ipsa symptomatum, quae medorrhoeam continent, chronicam ac latentem ferunt uti circumdant, historia, diagnosi contrariam adauget, ac si forte simplex, tunc alioque tamen, medorrhoea neglecta (§. 534.) illam, quod non sine causa dicitur, inducit, non magno certe in periculi errore hanc causam ignorabit. In genere de-

ratem medorrhoeae agnoscimus, nisi totius debilis systematis praecedat, coarctat; et quae caetero in corpore sub illa exordiantur, hujus morbi symptoma, effectum, non vocamus ducunt. Hinc pauci, in vici caeterum mulieribus, donec major humorum jactu acquiescat, ab initio, et per menses, quin annos, totius corporis incommoda se producat; et primum sibi genitalia plus, atque magis, mox vero quibundam, atque mensurae se producat, ac postquam cessaverit, diutius, humores crassos, haec ex pallido tingentes ex vagina saepe observant. Scitum utriusque in plurimis, cum in quibusdam de rebus hic fluxus ut copiose praerumpit, cum hinc marginis leucum, in quo regionem illi advertimus, ducunt, puerorum sibi humorem e vagina per crura descendens percipiunt. Hic effusus lateris suspenditur, sed sub alvo cum uice deposita, sub corporis exercitio, post hanc praedictam, tollit, atque temporaria sanatio aegrit. Jam primum oculi quasi hemidi, et viridi, et aenigmascenti, plumbeo, utraque tumor palpebrae aquosae, cum dactyl pallore, tumore, comparant. Mox tunc, plerumque, lenticula, ac aliquis tumor, deni, lumborum dolor per ea seorsum exoritur, ac-

cedant. Vasa veli tandem facilius libe-  
aper, digestio tarda, difficilis, oppressa,  
oporet, dum jectum una, vasa veli, rectus  
et aquae romulus acide, sequuntur, interdum  
alio adhibet, interdum lava est, debilis  
corpore, genus impotentia, curam proli-  
geratio quodam augetur; sub prope corporis  
et accliviam accensu, cordis palpitatio, anhe-  
lacio, se producit.

Hoc rerum sub stato, periodicis urguis  
ex uno fluxu concorsio ab odore, plerumque  
que tunc et parva, interdum alio, re-  
edit. Arguit tunc hoc tempore, vel et pa-  
ram a sanguine singit, fluxu, incommoda  
plura, laborum ratio, dolos obstat per  
verum, laterum molliorem, abdomen,  
pelvis et crura curam incrementum. Inter  
color habitusque multas oritur. Gravitas,  
viscidi lava; odorem spiritus sanguinis; ipse  
yaglas sensus a spino, quod hic quilibet  
glutina obtrudunt; facilius creant morbo-  
rum amplexu, quas interit, licet et hoc  
interit sub una concipiat, plerumque re-  
men, ab symptoma viciis utrali, velutit  
redolent, vel partem ignem expellunt.  
Saepe utrum, aperto, praeter odorem sang-  
ui, acido, et gurgit, profundius decessit,

ac interdum prolapsus. Clitoris ipse genitilia laedunt: ex parte per velum stansum, vel erubidas, subulhas, arduas has reddis; vel fluens, aut filis in illo capillares, pelliculas, aut crinum graveque roborem ad fundum consutit; ex parte, vaginas interne rugas et in profunda lateris distans rotaturam, consumpitur, atredinem, fetorem contrahit, ac in ichorem convertitur, puritum, voluptuosum laceratum, ardorem ac phlogosum internum producit, vaginas superficiem atredet, ac uterum, vesicam, anam, in consummationem trahit. Interdum canosa, livida, subatra, foetidinissimi odoris materia tum copiose promittit, ut et pruritus impediatur, ac lacrimae aliter subterpositae fluxus percrenent de vicia. Hoc tandem sub statu, pallor sublevis corporis, debilitas, nervi systematis affecti symptomata, anxietas, urticulae, cephalaea, anorexia, inmensitas; auresque feblicula loma, cum pulso parvo, duro, inaequali, frequentiore, matius cum tunc arida, quam haec per intervalla chaoticis dolores, ac nocturni velores perpendant; vel pulso primo, mox vero crura, corpus universum, hydropico tumore inflatur; nec interdum haemorrhagia jugitur; ac diuina saltem morti perlongi eventus protrahunt.



§. 515. Sub diversarum meorrhoeae specierum Causae  
 rem blanda, eorumque circa partem mem-  
 branam lesiones. Quae vero ex his efficien-  
 dat separant, aut, ad meliorem morbi in-  
 lectum, uti quod agere disponi videntur,  
 has adduci nunc licet.

Meorrhoeae acutae ventralis ( §. 512. ), Mel. int.  
 vaginalis ( §. 519. ) recti intestinalis ( §. 520.  
 uterinae ( §. 531. ), caecae, in quibus ali-  
 quod, mechanicum, vel aliud, has in partes  
 agitat, quacumque. Quae vero causas hanc  
 ipsam inducant, has cum ipso in corpore,  
 — atque tunc, mox ipsum ad partem, quae  
 agitat, mox affici, generari, atque hic, vel  
 ad illam deponi, vel lege coarctata, vel par-  
 tium mechanica, in eandem operari, — tum  
 corpori, vel parti, quae offendant, ab eorum  
 lacerari, — tum ambobus his modis oriri, de-  
 cendum est. In aliis his partibus, ut in  
 aliis, communibus et ceteris, phlogosis accen-  
 di, et ad humores mucoso-puriformis convec-  
 tionem porrigi occasio potest. Frequenter, ut  
 nos ipsi non amplius observamus, rheumatica  
 materia, aliunde in ventrem profusa, me-  
 orrhoeam inducit. Similes de podagrica, et  
 arthritica, aliunde ab aliis observationes in si-  
 milis morbis occurrunt. Ex sola gingiva, ab

degeni corporis vicinam, dolere, ut in aliis  
frequenter duriorem, — de plerumque eodem  
in hamis medorrhoeam uterinam eorundem  
aut legimus. Ex fortiori, per cathartica, et  
stomachi, intestinorum cruento, praecurrit me-  
dorrhoea vagitus. Ex utero interno a phlo-  
goni haemorrhoidalem, vel aliam, ob eandem  
corruptam, ad uterum medorrhoea transmi-  
grare comparet. Ex fluxu vaginali, primarium  
et aequum inficitur, hic ipse ad similes in-  
crevitatem stimulat. Ex viciis uteris, va-  
ginis, rubeis, leucis, tunc, vel ex pro-  
curis induratis, et polypis, aut scirris uteri-  
ni, aut abdominalis ex viciis morborum huius  
in parte positis, medorrhoea haec raro oc-  
currit. Ex cruento canali uterino, — ex  
periculo vagitus diutius interrupti, a coarctatione,  
vitiis, retractione, nec inflammatione potius, et  
materia acris pediculis injecta, et coarctati-  
onem cum densitate ducit alio actione laborante,  
leptum, vel sanguinem impura, frequenter  
medorrhoea originem derumpit. Sub aliis  
circumstantiis materiae in parte corporis que-  
dam praesentia, admodum uteris, vagitus  
cuiuscunque naturae stimulos, irritantem affe-  
ctionem huiusmodi ad parte invincit, accendit,  
et medorrhoea corrupta inducit.

Nec certe, ut ita sequatur, aliter in utero requiritur; nec in ipso, quam contagione ex concubitu impuro exoritur, medorrhoea, pathologicae virtutis instructa, sit acuta, et complicata, ut videtur, in casibus, ubi, aut reliqua ex his causis deinde fuerunt. Praeterea uti vides, periculis jam morti dignis, cum vix incipit phlogosis, adeo, — nec, superficiale et parvum, mox tantum positionis copiam materiae largiri, — nec tunc eductis, ac solis, medorrhoeam repelli potius, suppositi producere possit. Vel ipse tandem partium contractum, variis, colorum, atque, periformem materiam strisque coagulatis, sub acuto dolore, sine ulcere, tendendum copiam sumptis, et sedas genitalium, in mulieribus medorrhoea laborantibus, aspectus, primariam, quae vides in simplici communique medorrhoea supponit, theoriam fiducialiter coartant.

Præterea aliquando, ad urethrae casum, aliter, facile veniat, signis indicans ut contra vix posueris. Si violenta, ac diuturna ad urethram inflammatio, cum perveris vivendi, morandi methodo, præcesserit; si, etiam jam illa, modo passa, interdum vix nulla, sub insigni ardore, dolore, sub ure-

em, loci uterque quidem, materia effusa; si carceres tenuior, etiam immixtus, eructans quæspiorum exasperat; si effusa materia non habere eam singulari, sed eam utroque cruentis mictibus, accidit; si longam per tempus hanc symptomata continens remedia resistunt: prout utique prout cum dubio de cruentis longitudo non potest. Interim uterque uterque, et continentem quo eodemque in loco, ut dicitur a quædamque violenta aduersione, cum velle effusa, urethra, a succubitu suspecto, dolens, nec hoc incerta, observationes.

AN VENERE?

Communissimam vero causam medorrhoeæ (§ 55. 521. 522. 523.) inter vultus cum alio, ex utero contagio gestationis infectio, communis constituit. Hic contagii origo potius non laet: sed quæcumque et causa, hanc quædam eructat, sponte potius descendit; an idem cum illo, quod dicitur veneream infectio, dicendum sit, sub potius hoc est. Ex eadem vena scaturigine propulsat uterque; — sed indole, si modo, simplex, cum alio non coexistat, dicitur et vultus uterque (§ 522.) videtur. Origine interin, quod vultus incertum sit, antiquitatis hanc potius potius hoc majoris argumento, potius, quæ alla-

tum opinionem sustineant, fundamenta, ab  
eximia licet Viris tam leniter concussa, addi-  
simus.

Donc igitur infusi hominibus contagii,  
quod *syphilidem* communikat, radices re-  
ctius debite dicamus; id ipsum, virus co-  
se dicamus, quod concubitu impuro plerum-  
que corpus, praevis locali affluente, subin-  
trat, — conceptum ab hero, veluti materiam,  
vel alteram, quae nota sit, analitiorum be-  
neficio sanguinis, — per eam vero mercuri-  
alem spirituum vasorum ingentium; ac ab hero  
incognitas ad leges materiam, effluat; cor-  
rodatur, quam nulli morborum interponere  
hoc metallicum manifestat, evidenter majori,  
celique, seu *specificae*, virtute, extinguitur.  
Melodorrhoem, quae simplex sine aliis ve-  
neris laedit, sponte, vel sine ulla auxilio  
plurumque, sub debita modo caute, dispa-  
ret; et a mercurio medicam certe nullam,  
non raro vero dactorem sit evidens, agnoscit.  
Ab hac ipsa vel male mixtura, vel incon-  
sulte supposita, non parva asperitas de-  
pendent: sed hanc veneream, seu morbum  
a solo mercurio, tam colari, tam evidente  
mercurio, domandum, vigili hinc caute in  
tunc methodi experientia instructi, ab his

vident conspicimus sanguine. Dolores utrum accutius hos ipso in Clitico laqueo associant non poci, qul sola medorrhoea aut priorem fuisse affeetus verabatur: sed meruere hos dolores, vel alia, quae de hoc suspicionem aliant, symptomata, non potuimus adire; mitigare, abstergere hic inde, quae in fovea sola nil possunt, alia auxilia. Praeterea in nulla vestigia tam saepe haedictis, quam in istorum accutius, succedimus. Feminas, quae aliam genitalibus haedictis offeunt, in vaginæ, quo oculis non penetrat; id ipsum pati, — et sub aspectu medorrhoeae, fovea viro lacuato conferre quous. Sub angusto latet interducaulapolum puerpiti, vel laet furtiva, quia symptomata id docuer, in arctis. Vel ea, quae longo a tempore concepta sūt, continet, et sub recenscendis medorrhoeas symptomatibus haec ipsi inconculito adscribitur, antiquior jam ista, laet. Circulatio in utero vix parte ad unguem in illa vire, ut dicitur: sed quomodo, quoniam tanta tamque longa, in parte sensuosa epidermide instructa, talia cultant videmus, meruere non poci, non docere, dicitur multa, cum vel ipsa cuti applicimus aut catheteris, licet catiliam non elevat, re-

subori, — vel canali, vel ductibus humoris  
 rari inserti latenter! Opinatum, a massa  
 antrorum, ac hic ultra ex utero nascentur,  
 defendi, vel ipsam hoc rari ac prius excerni,  
 — symptomatica, insignitudo medorrhoeae admi-  
 ti necesse. Quae non duntaxat vel a sola pa-  
 riteria in medorrhoea materiae effluxu,  
 praeparata inter et glandem, ob saltem saepe  
 medicata in vitiis detectum, — vel apertu  
 ter et volvam in hanc, aliter nascentur!  
 quae, sicut de affluere humoris aliqui  
 continuo ex utero trahitur, longius tamen  
 indole vel paucis, solisque externis remediis  
 jam cedunt, nec iam inducunt? . . . Expe-  
 rimenta quorundam, qui se cum dequique  
 ex aliam vitiis et in antrorum ductum  
 ichore medorrhoeam eruant, — vel ex ma-  
 teria puriformi, sub hoc, per vestibulum ul-  
 lance, et rulant per antrum indole inserta,  
 aliarum vitiarum productione doctuerunt, igno-  
 rant non penitus: sed primo, minime vi-  
 rus venereum in antrum adiectum, vel,  
 quod necesse conspiciatur, ex corpore jam  
 a hoc infecto in hunc canalum depositum,  
 medorrhoeae vitiarum aliquando productione  
 impar esse censetur; et medorrhoeam intro-  
 ducit, sicut etiam, in quo aliam vitiarum deti-

se vix credimus, tutissimo, vitalitatem hanc indolent habere, ac hanc propugnandi potentia valere, nequaquam ex eo, quod hanc nunquam ex certam viderimus, negamus; secundo, ex partibus hinc caper et insensatis, nec facile hucacque confirmatis, experientiarum inconsona veritas quod aliter singulas frequentibus sub ipsa medorrhoea, quia indolent tunc vixit ostendunt, insensitibus ab hinc, insidiari hanc potest. Quamplurimum, qui hinc ex concubitu acquirunt, non solum ex ueribus, contagio hinc maxime exposita, sed aliter adpessum reuella, et hinc possidenda, participat; et qui utraque ex malo laborant, hi saepe per mercurium a hinc, — a medorrhoea quidquam liberantur.

Causa hinc,  
est hinc.

Quodsi vero constantis et simplex medorrhoea contagio induta, et aeri sui generis oritur, et veneream varietatem originem agnoscit; oportet et *syphilis* ( §. 313. ), et *glandularum* ( §. 314. ), et *phlegma* ( §. 315. ) et *paraphimosis* ( §. 316. ), quae prodromi illius symptomata constituant, nisi fortasse praesente aliud venturo ab aliis oritur, aliud esse praecipue. Ac reuera hoc ipsum vel sola pars, quod a cerebro uteratur immenso per nervum copiosum hinc oriri



sciunt, experientia confirmat; ac utraque, quod sine contrario, ac methodo curandi hæc symptomena meliorantur, quia hæc utramque sequitur, scilicet dissipatione, sic debilius evanescit. Ab calore citius levius per excessum violentiam indurto, nec eodem in latere balneum inguinale observatur; a digiti laceratione, glandula axillares in tumorem durum surgunt ( §. 513. ); hæc ex æstus phlogosi ex suppressa cum adstringentibus, vel a frigore, medorrhoea, similia vasorum actione lymphaticorum contingunt. Ab his portionem liquidæ methos sub ipsa medorrhoea abduci, nil obstat: sed licet hæc sit, licet circulatione extra legem hæcque tunc diu hoc vitæ non quies; infirmitas, modolus ventrem non abicit, licet, — vel habet molitur, vel supponit, si ex propria indicatione capillaria detur, non requiritur.

Nec minus epistemonia ( §. 514. ) ex eo Epistemonia lo, qui æstus dicitur, stimulo, ad legem licet non temper cogitatur, proficitur. Ab hac epistemonia, æstus in æstus lacerata laceratione, a frigore recepto, quibus sæpe medorrhoea supponitur, ab equitatione, cito, sub ipsa hoc hæc continuatione, sæpe hoc malum inducit. Qui tunc



inter a prima medorrhoea diutius suspensa-  
ria committuntur, his casibus ex ista hinc ad  
partem inflammatio intendit; sed hoc ipsum  
non recte non explicat. Ex urthrae vasis  
lymphaticis nulla cum testibus communicant;  
inflammatio in urthra locum anteriorem ma-  
gis occupans, in communi medorrhoea vix  
dilectum semen cauales colligit, hoc gra-  
vius sub modo ad hoc ipsum extensam actio-  
pathologica monstraverit. Cum parva in ure-  
thra sub urica mittenda casus, et longo,  
priusquam digna medorrhoea sequatur,  
tempore, hinc et modum manifestans con-  
spicimus. Post suppositum in illa profluvium,  
sepe dolor, inflammatio in urethra, quovis  
tumor circa testiculum nascitur, non arguit;  
restituto latente profluvio hic ipse tumor fa-  
cile dissipatur. Videtur hinc solus urthrae  
ab acri, vel a stimulo mechanico, irritatus,  
cum testibus communicat hoc mirum symptoma  
explicare; nec certe venereum hic morbus de-  
questus, quam ipsa medorrhoea, indolem  
agnoscit. Vel a solutione arteriarum, et vasa-  
garia quaecunque, testiculos cum dolore ex-  
citantes, eo, illis dissipati, subordina, obser-  
vationem doceant. Ex memoriali sequente  
poterem, quam ex aliis casibus additis,



effluvia non videmus; nec sane hoc ex malo, sed alia procedunt, alia consequuntur.

De phimosis (§. 325.), paraphimosis (§. 326.) natura idem dictandum est. Nascuntur hi morbi ex quavis tunc glandi, cum preputio, vel utriusque, applicito ciervo, per violentiam, vel ex naturae contractione, congruunt, per iterum sub contubitu leniorem, per iterum quodcumque hic loci collectum, receptum, depositum. Saepe alius videretur, ut coars, hie laet; frequentius sola imperitia ac periformis materiae, sub medorrhoeae glandis, preputii, videntur proficiente acido hanc symptomata, — interdum alia superficialia, benigna profuerunt; quae laet non magis, quam ipsam, quae simplex est, medorrhoeam, inquirat. Ex phimosis violenter post glandem reiecta, paraphimosis non difficilem evocatur.

Nec alia est fluxus periformis, morbi ex eo (§. 320.), vel medorrhoeae interna (§. 321.) natura, et eorum prout similitudine mala producent. Ex suprema medorrhoea vaginali, medierem ad eam eodem morbi genere affectum fuisse novimus.

Clamoris medorrhoeae (§. 322.), pudendum proutque dilatat, cum videretur hi

Phimosis; paraphimosis.

Medorrhoea interna.

in partibus resistentibus, per fundamentis est. Universi locorum debilitas systematica, et quae jam insistant, inertia corporis, victus parum moderati, viscidus, pinguis, aquosus, porum, haemorrhoeam epithelium abesse, atmosphæra humida et frigida, levis fibrarum a sufficiunt consuetudo, haemorrhagias aliæque evacuationes, morbi, viæ viæ languens, progreui, labor similis, nihil pathemata deprimere, sanam diuturnam, hoc ad profusionem disponent. Insensum, siu malis his generalibus et jure delectat, et insensu hinc de pul potestatis resistit, vix datus, de quo agitur, et sola totius debilitate videtur. Ubi vitales ut longae gestatae venarum, et impotente humorum effusa, veterem robur insistentem, nervorum resistit adacta sunt, hinc ipsa, et secunda morbos mineri subestitit, quem coegitio humorum oppedit, in longum temperantem, jam sufficit. Sic progreui moderatiora ante, vel male tractata, vel ob diuturnam morbi potestatem, vel phlogos renouata, in uno utroque, sub valido illic totius systematica robore, in chronicam ac rebelle frequenter mutatur profusionem. Ea sola methodus vixit per phlogos parvum quancunque induta certis in loco angu-

vix, — post inter, arinas affluens, valens,  
 Et compōnentis a stimulo, chronica meo-  
 rrhoea provocatur. Ex aliove interdum, hinc  
 rursus, pediculi ignis origo est. Quae vim  
 uteri vel maxime labiatur, ac majorem hanc  
 in parte scabellitatem relinquat, abortus,  
 postea praematurus, difficilis, aut in sterili  
 aetate ubi nimis videns ac frequens, placentiae  
 contractio violenta, venenis abortus, ma-  
 strubatio, haemorrhagiae uterinae, aut vasorum  
 hujus visceris a mensurae coeppenda  
 nimis dilatatio, pedicularem chronicam meo-  
 rrhoeam causam largiatur. Sed alij variabiliter  
 pervenit haec in morbo actionem tam  
 manifestam, quam suam ubi, mensuram in-  
 ducit, vel decessante periodo, incrementum,  
 demonstrat. Hoc quidem phaenomenon, si  
 vasorum systematis uterini angustiarum in  
 utrumque potestatem, actionis rursus impedit, nec  
 tamen angustia transmittendo adhuc satis co-  
 piam, diametro sustinet; vix autem aliam  
 morbi ex causa, vaginam, quae ex utero uterique  
 uterina, eodem certe sub morbo millan-  
 tis, complacens esse originem; nec cum me-  
 orrhoea, quae pariformis est rursus, quae hic  
 funditur, ac leviter sub phlogosi, mensuram  
 impulsu in fundis periodice renovata, ex in-

super partis affectus superficialis morbosus, non ex sanguine, jam facta, propellitur materia, hinc ex circuli vagantis, quod menstrua periodos ad uterum inducit, chronicus hoc in actu medorrhoeae periodicam incrementum per se nec aliter, quam illud, quod ex coalescentiori, ex parte spiritibus, ex solo corpore sumitis maior, ex repetito coagulata, utroque in actu sequenter succedit, derivandam est. Eodem tunc modo depositum ad uterum non gravidum, ad vaginam, urethram, vel ad anum, acro rheumatismum, herpesicam, utrophileum, vel aliud, si vitia debilitas praesentent, aut morbi distorgitioe indurta sit, rebuletur ex latere fixum, qui obstruente alio in partes coniecta materia illuc dissipatur, ac aliorum haud raro crisi morborum ducunt, inducit. Hinc ex digeritis, ut dixerim ( §. 514 ), erysis, catarrhis bronchiarum, vel ex arthriticis, impetiginis, ulceribus chronicis, nodulo pedum, axillarem, ut crepe medorrhoea in femore, — et hoc ipse cum repellentibus herane suppositis, vel pristina iterum soluta incommoda, vel priore, nascitur. Quae vero singularem copiosius, quam per se, ad uterum sequat, vel alliciat, et congestionibus hoc ad viam viam stantur : ea videri

rum his partibus tunc infringat, ac sensibilibus deval morboque naturae adapto, hinc speciem impetoris videri, ac thomae, quibus fructus a tunc parvum utitur, actionem : ut quorum actione mechanica, etiam, corporis superficie ut ampla, et vicesibus pectoris, abdominis, non parum compunctis, polio ad tunc alioque regitur, hinc librorum libidinem exultantem, procreantur maritima, negant utroque locis conceptis peritque, autem quatuordecim, officium, — cunctis, generaliter morbo, per autem actionem, vel et tunc, ut vocant, latentes morbo utrimque quatuor, suppositis, vel per latens tunc loco frequenter, — acia alio, ut tunc tunc fignam, quibus morbo sub tunc genitalia circumdant, apphensio, ac tunc in vagis collectio, utraque, — tunc, a pectoris, autem sic tunc, ad morbo tunc, latetque tunc apertis, videtur, in parvo latens, his a glandulis tunc, et ad tunc, his, legi tunc, adeo alio, a parvo viribus tunc, tunc, — latens tunc, hoc ipso tunc latens utroque tunc, — parvo parvo latens, parvo tunc hoc ipso

a vitiosis coactione, ut agitur cisioni pueris  
 ad faciem accinatis, — emollientia, quae  
 emolumenta dicuntur, electicorum, infusio-  
 rum, — utri, vaginas detorrens, prola-  
 per, — perurionem, ab ipsa hanc mala,  
 genatio distorrens. Sed imprimis vestigia reu-  
 lationum, quibus habemus sub gela fore ibidem  
 ac sub seruida acrius atrox, acutus, et  
 cruentus, regionis interiacet ab eare rigiditati,  
 calligant, quibus *Artemisialis* feminae pru-  
 denter utitur, defectu, neglecta curatio,  
 reprobandae hic videtur. A curata crampi-  
 natione supposita, ad vixit mox suppleant,  
 diuturna frequenter descendit; et sub utriusque  
 uterique iam infecto, facili est uterui ac an-  
 spenti humaribus ad partem convertere. Non  
 raro et sapor graulibus adhibeo dicitur ab-  
 bus, quasi vixit vaginas catarrhus, inductione  
 quae, saepe repetitur, chronice mediantibus  
 excrucians non est impar. Interdum et aliae  
 hanc morbum curare, quibus vixit humaribus,  
 et loto, vel et utrinque neglecto, curatio,  
 coactione videtur ab ipso, curae, quibus utri  
 quodam, et esse a curatio, perurionem  
 inferre videntur.

De profundi partu et ut vixit local  
 profundi curae iam dicemus ( §. 330 ).



*Flammoribular*, ut vocant, aliter, non ex uno  
 sic hoc nomine locumoris, sed ex utroque per  
 varices indurto, ac per phlogosin intusque se-  
 cuti superficiali, ac subiecti mucosae hujus lo-  
 ci illata, propellunt. *Palliaris* ab *excres-  
 centia* mucosa majori ad rectam videtur, fre-  
 quenter hoc simulcum, tumorem, et auctam  
 mucosae periformis secretionem experitur. A pro-  
 gressu dyscrasia distoritur saepe utrumque in-  
 cretione diversa, ac periformis prolapsu ma-  
 teria.

Extremum medorrhoeum (§. 332.), major  
 genitalium, apud viros non minus, quam  
 apud feminas, imprimis a metrorrhae obtentu,  
 impuritate, — in parva subinde excrescente  
 paffricaria ad vulvam accendit, ac indurta  
 ex inde mucosa lefatio, generatur.

§. 334. Varii, quae magna jam parte ex-  
 pectantur (§. 320. — 322.), nec ab il-  
 lis, qui alias inflammationes utque accendunt  
 (§. 126.) diversi, medorrhoeae *exatae* sunt  
 exitis. Frequentissime haec ipsa *transmutatur*;  
 aut in fluxum perineum, contagio eorumque,  
 nec *diversum medorrhoeum*, convertitur. Ra-  
 rior *apparuit*, nisi male tracti, negle-  
 cti, hujus morbi, eventus sit, ac haec illa

sequatur, sicut virus venereum inflammationem generaverit, hujus hedolam nequaquam sponte exierit. Incidit, quavis ratio hoc sit, sub studio morborum inflammatoriorum, quod in genere majoris hac in morbo dignificationis est, accedente ingente aere, ex spiritibus corruptis, ex caliditate coarctata, materiam hanc coarctato vitio, aliisque stimulo fortiori, gangrena perit necedit. Quae, inflammatione ab humore violentam, sive ab hac est urethrae affectio, ex majori, quam si pluriorem efflueret, periculo tripatur: sed ciccam comprimam, licet valde ardeat, per sex sive hebdomadas extenuat, quam nulla periculi indicia circumdabant, morborum. Non ideo, si modum perficeret, contagiosum liquorem ex urethra distillat, quod virus corruptum promptum efflueret, — sed quod minor inflammationis de ingente, citius hic morbus aboleretur. Contagii principia, ab initio modo unica fortiter humoris hedolae guttula, per urethrae colicam (et semel, a colicam cum quibus morborum corruptis, angustiae, ipse efflui in urethra, clausi exempla docuerunt) corrupta, secretionem morbosam, qua idem contagium, papillae, quaeque phlogosi coarctatae, exalgitur, inducit. Non solum, quo

erant hoc ignem, nec certum, ubi curati sunt  
 in urina coarctata, vel ejaculando in arctius  
 calor et ardor urethrae disparuerit, erectiones  
 violentae, dolores, convulsus, indicari, —  
 nec hamorem, qui effluere coarctat, licet  
 aliqui ex hoc reputent, cum cathedrae vi-  
 rulentiae accusari licebit. Non raro haec phlo-  
 gosis urethrae, maxime virilem, cervice, ple-  
 ribusque latitudinem in locis, haerentem, du-  
 rissimam, crassissimam, & quasi callosam, cum  
 diametri filis destruantur, contumacem relin-  
 quit. Hoc opothae nobis statu, locum difficul-  
 ter est totali, ac in plures dictis rivo, ac-  
 gustatis, praemina perficimus, et post lo-  
 cum obstruimus callosi, liquore perficimus,  
 expellimus. Nunc fre continua sunt haec ob-  
 stacula, et cunctis temporibus reducenda, post  
 corporis exercitia violenta, equitationem im-  
 pectis, ac perueniens spirituum. Venia post  
 aliam, majorem, — nec, spermodicae ma-  
 gis naturae, in totum ut dicitur, ut videtur,  
 sublati. Sub majore haec ad canalem impe-  
 dimentis, ubi haec sunt in universum, et cum  
 vitae periculo, ubi etiam auxilium datur,  
 appropinquat. Plerumque haec urethrae vitia  
 post repetita, licet maxime homines, moder-  
 ratione, non modo ad ducunt, quo loco phlo-

gulae primarias videtur haud raro, ut et plures post viros componant, et diffisilem propriam originis explicationem efficiant. Interim in multis, a urethrae acuta, frequentius, et ex symptomatum officio apparet, dissipata, inflammatione major utitur sensibilitas, et in primis affectus, vel, minorem ac minime contagiosa ex causis, promittendo se potest esse: et sub ista, piliogaris absterge, vix dolens, et cruenta, et in oculis, asipula interochloris apud depocion ad piliocion bonales, non rara est, frequentius, quam ipsi saluade veritas arguunt, subest, — per universam cutem ad bulbam, ipsamque ad, prostratum, et collum veritatis, luteo excedit, — totam cellularem, quae utitur: membranam mucosam cutem luteo discendat, non minus quam illam, quae vasa prostrata in glomerata coadunat, lymphis coagulabili infardit, — et tandem callosam hanc partem duritiam, non aliter quam ceteram a urethrae acuta affectam, ceteram, in illa, inducere videtur. Hanc gressu, prompta semper laci perque callosa haerens, ad piliogonem curam condit, et abstergeam ipsi illam, et in prostrata, vasa asipit insigniter acuta, frequentia ostendit.

Hæc præstat a pluribus certe causis pendens, sed potè multiplices medorrhœas conueniunt, utriusque, licet multas ab aliis potè accipiat, apud nos frequenter, dardies, ex ea, quod vel uno, vel utroque ex locis, utriusque distrahatur, comprimatur, seu perperam utriusque difficultas, suppressionem frequenter, discrimine plenas venas nimis dilatas paralytas, ac fere eadem, quam ex calculo vesicæ, symptomata inducit. Porio hæc glandula, quæ ad urethram ex vesica egreditur, ac loco posteriori est posita, ramificata vesicam vixit attingit, hujus etiam obocurrit, atque, ac aliorum obocurrit, ac aliquis hoc in morbo pathologicis Thibauti conservatas ex cadaveribus vixit vixit docent, hujus vixit in eam alios ac ad ovi assensu magnitudinem huiusmodi, — lora non modo egrediam ex vesica, sed aliquando ac decemum per ostium in lora, præstatum, — vel et ovi vesicæ, ac claudi quæ ex parte posteriori, et hinc claudi vixit incontinenciam, productura, accedit. Aliis, uno ex locis magis ramula, utriusque præstat, vel et utriusque vixit, quæ interea hoc in morbo utroque ex locis vixit magis præstatum, vixit, vixit ex locis ac huiusmodi

compressando, similes effectus producant. Vel ad res intentius confecta excreta glandularum sunt, dolente oreulo, atque digito in aream intus, sub perpetua in perineum pressione, ac sub urinatione, dolent ad urethras radices exstante, regimine difficili, hoc ipsum constant, tantum hac per vias deorsum intercipit, varicosam haemorrhoidalem inflexam, circumscissam ac vel medullariam arborescentem. Constant hac morbis, quocumque nova phlogosis tumori ut surgit: qua usque lutea suppuratio, abscessum hunc ad glandulam investigat, vel plures minores excitantur. Hi abscessus cunctis urinae defluxum suum supprimunt; nec, oris urinae distracto, haurire valent, parum effluunt hanc sicut p. urina sponte vel in urethram, vel in rectum intestinum, vel in apertis hinc ipsi et verius intermediis, vel per duas fistulas in perineum, aperti, licet loco interdum priulas per urethram vias aperiant, mox nova ichore repleti, priulas symptomata reducant, vel, fistulicam urethra, et cum ipso perineo, uretro, vel recto contraxerint, urinae simul et ichoris hic ex partibus, apertura vel unica, vel multiplici, effluunt sedem et gangrenas generantem inducant.

Cancrum incerta est ratio medorrhoeae aquae vel miltis, vel horridae, quoad morbi durationem sustinere, prognosin. Sub laevi phlogosi, durioris saepe medorrhoeae denotatio; — sub particulari morbillae effluvio, major, ne ad urethram salientia succedat durities, minus est: ac saepe, qui parum sub initio agitat, morbos aggraves. Medici, vel casus me legunt ex culpa, cum discriminis inopinato aggravi saepe alios, a principio confusos, sub recta vivendi medendique ratione, brevi tempore fugiat. Sub optima, et apparet, rerum actione, timor est, ne aliquid his fluxus, facile levior per stimulos revivens, intus inueniat. Apud femineas, ob majorem umbilicarem, laterem partem ob habitum, ob inclinationem a uterino periodicam, frequentius quoniam in vita, haec ita succedunt. Consuetudo corporis laevi, debilis, instabilis, acrophulosa, vel alio ab acri frequentius venas, eductio jam hominis, praestis, et medorrhoea acuta coepta in chronicam labi.

Sub clande ( §. 322. ), ubi pede solidum edigitur, non rarum est, sanguinem ex urethra effluere: quo saepe profusio, illud morbi symptoma quatuordecim mensibus.

Exterius.

Exterius ex solo conatu violento, resolutionem viæ non ubique admittunt. Qui ex resurgente simplici medorrhoea materia crassa, idiosyncratica, corporantur: hi due huius periculo resolvi queunt, ac si forte suppurant, non aliter, quam abscessus in parte glandulari, qui lentiorum quidem, pro ratione inflammationis, sed saltem plerumque cunctiorum aditum, considerari mereatur. Difficiliora curatio est, qui cum morbosae, utrophosae diathesi incide, ac facile in ulcus mali moris metamur, labo. Quam oleosa venere non ob solam secretorum, sed paulo tardius idiosyncraticam productionem, labo, hic laevi vix indicat, ac inducit venenam. Secundarium, ex hoc confirmata venereum, due ulcere putredini, bubonem non videmus. Bubonem, qui resolvi, suppurare solet, arthritidem aliquando, remedia sollicitum, — ac hoc verum sub cute latens malignam, carcinomatiformem, sub crista, cui respondet, tumore equo, moroque jactans, indolem arguens. Similia ad artem, sub medorrhoea acuta, ad epididymum testem, inflammationem, nec benignam, suppuratam, resolutionem libenter, in quibusdam contingunt, tumoreque scirrhosum latens faciliorem aperturam sive integram infert.



Quibus simul ex medorrhoea acuta testes exciderunt, hinc scilicet ex acuto contagio hae partes inflammantur. An etiam jure sit dictum, testiculosum ex hoc contagio decidere in varicellae morboque esse, de hoc quidem dubitatur: sed exempla sunt certis, ac propolis desolati, contrarium defendere non possumus. Febris acuta, lethali, ventrum testiculorum sine integre disparitione, observatio habetur. De *plimonia*, *paraphimosis* periculo jam satis monuimus ( §§. 325. 326. ). Concoctio propositi cum glande, in prima ex levi, laborat succedat, ac penis erectionem, concubitus sine impedit. Factam interea a tritu jam repetenda propositi concoctionem cum parte glandis laterali, per injectionem solvere nobis licuit. Utrique in malo, propositi, — in paraphimosis, ipsius etiam glandis, gangraena timenda, et ex massis sublivide, nigra, ex vesiculis vero citius coloris sanguineis, providenda est. Rarior est, sed exempla non curi, habenda in gangraenam, quae haemorrhagiae subivide praecedunt, committitur, curatio.

Difficillioris curandis est chronicis, cum illa, quae ex acuta, contagiosa, descendit, non aliter, quae flammis alii apud Germanos sub

conducit vult ( §. 331. ), et *Antivertis* jam addita est, *medicamentis*. Augetur difficultas, cum, praeter *paludifluentiam*, *utilitatem* *verborum*, — vel totius *hagae systematis*, atque prout in *speciendis* affertur *dispositio*, — vel *metaphoram*, *scorbeticam*, *arthriticam*, *rheumaticam*, *impetiginem* *constitutio* accedat. Si *locitas* *vitium* *organicum*, si *pallor* *rectiorum* non admittat, nec si *maior* *aut* *humilis* *scitibus* *utro*, *aut* *interitibus*, vel *prostat*, *simile*, *comprehensio*, *paludorum* *scitibus* *medicamentis* *inducatur* : tunc *prognosis* *illorum*, et *illam* *chronicam* *medicamentis*, *plurimamque* *interitibus*, *constituit*. Praeter *frequentem* *medicamentis* *hac* *profectio* *laborationis* *manifestat*, si *locitas* *conceptus*, *frequentem* *ex* *causis* *non* *magis* *advent* *potest*. Quae *medicamentis* *ex* *callo*, *regeneratione*, *propellatur* : — *hanc*, *chirurgicam* *utilitatem*, *novae* *infantum* *constitutio*, et *aut* *efficit* *beneficio*, *dispositio* *duris*, *interitibus* *dispositio* *medicamentis*. Non *parva* *interitibus* *profectio*, *habet* *medicamentis*, cui *causa* *jam* *deducta* *esset*, *habenda* *ex* *callo*; atque *codem*, *citius* *quam* *per* *est*, *per* *autem* *suppresso*, *frequentem* *interitibus* *salutis* *maior*, ut *videtur*, *non* *ex* *ipso* *constituit* *tunc* *efficit* *materia* *affert* *in*

partes deposita, — sed stimuli aucti, — cum parte alia, affluat, contrahant, ignotis ad legem ( §. 374. ) mutentur. Hinc variae a morbis feminas, metrorrhoeae hae a specie praeservant, cum hoc quidem scitis, — tum eo, quod laetis morbi aliter materies ad uterum ferri consuevit profluvium hic cohibet, — tum illis haemorrhoidum, — vel quod crasso morbi antiqui, quasi per feminulam, per aliquas quovis diffusus, non ubique tam abunde a vulgo contrahitur. Non enim erit, distantes metrorrhoeae diffusam vaginam, vel uteripiam prolapsam, — ac tandem plene discruciatam, — nec a vultu pariter accedere.

§. 375. Causa metrorrhoeae, laegere, a Causa 2<sup>a</sup>.  
causarum, sedis, temporis, symptomatum ratione distinguit. Desideranda, nec sine pietate arcenda sunt, ut certior, quae contagionum metrorrhoeae, vel et hinc ipsius, potentiam delatet, cognoscatur, scilicet. Res in Europa, sub tanta populosepia cum Exopis commendo, praesens, nec legem subrepta Imperio eo ut videretur propensa a quibusdam, sed soli sanctae temporis auctoritate, uniusque auctoritate detrahit. Major letitia in illis, quae corpori quantum in Republica faciunt, Magi-

stratis anxio, — virgata, qui uocant; quam pueri, docti secunt, minorem in circuitibus ad numerum addendo, — subdolum coluber infectis, tacito, et gracile, pro uiride, subditis, infusos viros tam late diffusi per provincias propinquas ubique non parum intrant. Quod ubi impetu concubitus contagione utroque sentis acrius, vel interceptum mors corrigit, delinquit, adhuc queritur remedium: namque leuiter partem contagio exposuit, nec protracta in longum, manducet, et genitalium, ad alimen recurre, cum liquida, ne tempus perdat, quocunque, impetibus curatopone, purgatio, vel lactaria, illis sub defectu, cum pulvis quocumque abstergeat, — laci mox a concubitu suspecto amulo, — cuncta tepidae, vel aquae calcis, in coctum, vaginam, injectis, periculis quodammodo leniantur. Senes non addit vires, muliebrium, attentius illic, cum ad vaginam hoc extendi non queat, examet. Illorum uentris velisponit, vel auribus compressis, si dolorem manifestat, nec plorat, si rubeat ad ortum, nisi morbi alii, contagii intus, forte praetulerint: concedendi amplexus ibi satis indicabit pericula. Post pruriam, qui suspectus est, coactum, qui re-

itaque symptomata finem adhibere con-  
stent, ab omni tamē cum sanis iudicio  
commendo, quod adhaerens pudenda externa,  
interna, vinct, sine hominis interni morbo  
evidenti, non facile commotionem, abdicatur  
oportet. Ceterum ab illa, quae universum  
systema, vel impetuosa quae pudenda stimula-  
re, quae inguina ad ista afflicta provocare,  
vel quae urinae acrimoniam augere po-  
nent, sibi cavemus argenti. Necesse est in viris  
est scire, non scire, non a morbi latitudo,  
suspendio. Frequenter humor, qui effluit, vel,  
sub longiori et angusto praesidio collectus,  
id ipsum, vel glandem stimulat, exacerbat,  
repido cum lacte abiacet, vel injecto urini,  
vel aquoso liquore educatur oportet. Decubitus  
in dorsum mollior, pollutiones in viris  
nocturnae excusant, — in senilibus, virginitas,  
corrosivi humoris defluxum ad anum, cum  
dumtaxat dirigere conuenit. Positio sanctorum  
declivis, matutina, sapientia corporis sub die,  
in vagis inguina afflicta promouebit.

§. 334. Nullibi auxiliorem tam ferax est,  
quam ubi morbi reliquiae, qualescunque, non  
potius coacta, sub methodo solvantur,  
Sulphoreus ingenium; atque hinc tantae in

c. med.  
anal.

medorrhœa, de qua loquimur, varianda, — quin idem morbi magis patrat indeles, aut quibus certe ille vix indiget, divitiis! Quam crevere sine ulcra contagione induit, — et, sub recta vivendi ratione, non minas, ac illas, quas insons fœtus utrimque lavat, medicas sine artu cubitis, vel a sola natura, perfectas, quin sine timenda sit, vel in plurimis, penitus *contra-medorrhœa*. Prox. viras intus natas, — ac et venas, quo catalogi morbi possit, acridorum, acilaret; et quas foritans, prius a concubitu suspensio diebus instructa, medorrhœam illico et in concubitu populum legitur, — et, vel modo animi, et concepti contagi dimosum agitur, ac, ut ubi facile periret, jam rursus paritas, saloris in utero, vagitas, maluit, curas delinquentes, — vel, quæcumque demum fuerit, super magis venarum his e canalibus elaire, quam in istis *collegitis*, *refragasse* videtur, injeris. Non raro plures illorum, qui se in contagi pericula incurritur accensat, timore nutrienda, vel methodi adhibitas ludo inmodicas de-stantando, — si non loci capedalis, avolentia; — saltem levitate, incitias, aspicio mo-vent. Sane foritans aliqua, nec certe speranda, quas foritiora mirigat medorrhœæ sym-

pietate, quae pericula evitent, et quae sapientia bevilioris morbi decusque saltem quaevis, arte praevaleat.

Primum illa scilicet, quae a respectu concubitus laevata, vitanda est doctrina. (§. 333.) ; oportet utrumque parte a viro, aut alio a stimulo conceptus, immixtum, inflammantem, et, quae ex vino laedi, vel aliis per solita concubum decedant; symptoma componi; oportet morbi effectus, qui chronicam laedere methodicam minime, praevaleat.

Quamprimum igitur nulli, quo morbus hominem ex contagio laedit (§. 331.) , symptomata comparent, non passi, et valens inter hos Viri, praedicta virtute aut animi, Jacta, aut pariter infectus suorum solvere, aut necesse illis remanere obsequio, aut denique laevata ejusdem superficie defendunt, liquores, per cyphosum hanc operi idoneum, copiae, sequuntur, et cuncta impedientes praevaleant. Ut, quid non ipsi conficiant, facerent, quatenusque sub omni moderatioris principio, et infamantioris sub studio, in utrumque possint, res, ejusdem a cura rationis aliam, — licet super id liquore hanc laedit, infamantem effectus hic solent; ac mul-

Per morbum  
III.

la, quam inordinatam ad gradum, intercedit differentia. *Strimfanius* usus est hypothesi, quæ, per anum ab illis oculis constitutum, et esse demum coniugium posse ab his, appellari, — aut alteri, qui factus a viro institutionem hanc propriam, per aliam, ab ipsa diversam, posse prius deleri, ubi promittunt, lesideri. Quod de viris concepti, per anum ex urethra effluunt, affirmativè sentiendum sit, iam supra ( §. 534. ) docuimus: et quamvis facta per anum secundaria irritatio primariam latendam posse scilicet videri ( §. 379. ); vix tamen hoc ipsum in casu concepti indomabile conjugii locum inveniat. Vel ipsi hujus methodi fautores, irritationem artificialem, nimis exigent, vix agere, — majorem, quam per sit, nocere facerent. Quia igitur, sub tanta sæpe in urethra, sub diversis temporis intervallis, inconstentia, — sub eadem in variis hominibus irritabilitatis urethrali differentia, vel præsensibiles arbitrio formæ, vel solæ, quæ idem non eodem semper modo regit, legem judicio, identitatis gradum facienda sit certo docibile? Quis speret, quo Equorum in anthrax prope deleri debeat, ac illas quæstiones, vel acris ut possint, vel ut stimulo alius auto efflu-



cist, probabili conjectura indicabit? Quid ca-  
tationis, vel a Chirurgo, terum satis caputo,  
libere per bonas repetendo, absolvendas, pe-  
tentis in vulgum incommenda, — vel si res  
ipse cum variis agrocis committatur, his-  
toricis periculis in curam non vocabit? Quid  
denique tempus, quo ab injuriis vel in-  
vitiis, vel moris, oportet desisti, ut neque de-  
ficiat? Plura tamen, hanc in faciem, pro in-  
juriis, adhibere solent: Inter quas pre-  
cipue sunt solutiones viriali maris, capli,  
elaci, acupletis, ammoniaci assis, olei tro-  
chanthidis, balsami abietis. Ex mercede va-  
riis sub formis injecto, aliqui efficaciam, quam  
nec ipse in dor, nil jamjam evoluta, agno-  
vit, *specificum* quodvisum. Qui vires ve-  
nerum a vasa propius involvi, vel aliter,  
contegit potentiam deponere contendunt: hi  
autem, supposito etiam vinctis mordantibus  
communis nature, venis in superficiem sol-  
licitatem *effertur*, pro curis habuerunt. Nec  
mirum venis vires indoles non simplicis argu-  
mentis, ut ex alio amido, ex lapide can-  
stis, vel demum aque talis ex res, que  
omnes in faciem adhibent, spes magna vi-  
ris affligit, lesitur. Quamvis destruen-  
do coarctis impetum agnoscunt: hi saltem

carvos ardeat, vapulet, ut mirari solent, cum calidè pluvie, ex aëre solent, — vel opè, aqua dulcissima diluamur auxilio, obtemperare cogunt; et conspersa, infus impræcibus, in chronica ophthalmide visum (§. 134.). hinc satis opulenti colligunt: sed in acuta medorrhœa vix aliter opium, quam simulatum argendo, operatur; atque tam parum ex remedia in ardeorem laqueo huc - huc, vel tempore brevissimo, recedat, ut liquori infuso, quæ interdum hanc sequitur, symptomati mutatio vix quæri adscribi. Qui utrumque delinquit necesse, hic alio vix nequam, sine utralibet auxiliis, supplere, viscoso, quod vix peruenit, nec nisi ardeorem obicit, medicamine.

Quæ lentius hocque imperfectionibus opposuit dubia, et ad arguenda; clariorum Virorum experientia nequaquam moveretur. Nostram aut raro ab ægroto, sub primis quaderetibus acutis jam jam curæ penetratis levis, expectam tale auxilium; et quædam hoc ipsum novæ methodo faciunt; toties, quod curaturam non phlogosum cum laetationibus tractatum analogis docere debeuerat, postulat consilii. Sed ut curas vix mittere, ut similes nostrorum hoc in morbo tam concussis et

quodammodo, quod videtur id possunt, tremant, dantur: experientias, ad quon totius, qui experientiis virtutis hanc possunt, appollent, in Medicina fallacia: et hic morbi tollitur, non credimus inesse.

Nec igitur, qui videtur, quodammodo in C. equa. cet longiorum, brevior, et hanc accipit, quoniamque profectum, acutum et hanc ipsi re-  
 Haquoniam modumque; ac modo sympto-  
 mata inter, si fortis alius arguit, modo-  
 rari quoniam. Ad vitam quod pertinet, mo-  
 do febri si dedit, conseruon, sed a rebus in-  
 videntibus, nec diffidit colligendi aliam, con-  
 ceditur. Que vult abundare, et, quod  
 prius arduum non arguit, vult opor-  
 tet. Proponitur, cumque, ac parca, et hanc  
 acriter, vult vultem offendit, nec modum,  
 propinquit; sed nimis, nec gravi modum  
 modumque inter, quod hanc in vultem  
 modum ad vultem non vult, parca  
 oporitur. Si vult acriter et arguit, nec  
 modum in vultem vultur, nec febri-  
 bus hanc parca modum ad parcam  
 conceditur. Alia, et hanc opor-  
 tuit vultem quoniam modum. A mo-  
 du fortis, equon, vultem, conseruon-  
 ne, refrigerio, conseruon quoniam, a la-

est mollis, et utraque albus, lachryam exhalante, sanctorio, ab omni pathenae majori, abstergebat argenti. Effluorem ex urinis manentem cum tepida, aut lacte subcalido, frequenter abluant; aut, quibus longius, angustiae purpurae impedimento est, injectiones, quae et molles vaginas extirpent, singuliculisque, his tunc in die, utantur. Urinae, nihil satis revolutae, quam minus frequenter id possit, amittant.

Si febris accedat, et, in homines robustos plethoricos, inflammationis naturam ostendat, detracto mox vino, et ciborum quantitate ab indole mutata, venarum, anaphlogisticae sive calae aut aliae, tamariscorum decoctum, indicantur: vel salter intus, sub dicta regimine, succubus, — et in corpori debili, quolibet, manifeste tunc a sanguine detracto denuo, sensibilitate adhaerente affectus, comparcant. Sub magis potendorem brevisse, calore, dolore, excipiente anodyna cum laudat portionem, vel et balnea tepida cum scopis dimitti, cum imprudens localis ex lacte, vel nativo decocto, uterque frequenter. Si ob quatuor magis, quam inflammationis vehementiam, ex urinis nil effluat, et ipse, medicina petenda est. Si major videretur

inflammatio id jobat : hinc illuc positi, ad locum dolentem, ad peritæones, vel ad labra mulierula, ponantur. Saepe intermittuntur, erectiones dolentes, spontaneas, puto quidquam ad interiora depresso, opibus, ad moxam parvum; — ac si corporis debilitas, scabellum mebrum rubent videntur; si truda ac diaphana menses ex urebra distillet, ac pulpos frequentes, contracti tangantur : corticis Peruvianæ decoctum, cum tinctura Thebaïce portione, dissipabunt. Interdum clyster copiosum cum opio injectum quam optime conducit. Fortiora visum hoc in morbo pergentia, quæ adeas difficultatem, ac singula symptomata non regant, esse per se agenda sunt.

§. 537. Nec aliter symptomata, quæ sub Clitoridis modorhoeæ inflammatione erant, præcipiti, tractari debent. Ad primum incurrens (§. 532. 2), carapasma emolliens, hinc illuc posenda sunt, vel et opum liberalliter interne portum conducit. Sub dolore ac violenta pæni sectione, præcipue, præcipue in opio et pæni emolliens.

§. 538. In labore (§. 533. ), cum aliter non virescat non opem, rursus, ad singula,

que infusitur, indolens respiciendum, et hic ipse valendus est. Suppressione remota glandularum, ut testis, vesicae, et foeculae distendantur, quovis modo praecavenda, et buboni *varicela* cavenda sunt. Si fortiter ad urethram inflammatio hanc generet, tunc illi ad methodum praescriptam ( §. 335. ) succurrendum est. Si forte sporadica ad urethram affectio simulata cum inguine commoveatur; tunc ea, quae ad locum commovebunt ( §. cit. ), in subsidium vocentur. Si foris suppressor ex urethra, vagina, matrice effluat, hoc malum indecoris tunc, suppressionis pro causa vel inflammationis in illis orotida, vel spermis collectis, vel ape areoli, penilli, scrotis, morbosae revocandae sunt. Sub incipiente glandularum inguinalem affectu, praecavendo praecavendo, namque hac in parte plura, frigida applicari audent. Sub inflammatione jam perfecta, fomici, si venarum oratio laesura sit, aut minor infusitur, hirudinibus parti bubonibus vicinis applicandas sunt, vel ipsis circa ac rubis scarificanda est leviter. Post haec auxilia, calidari sub malo aspersum, cataplasma ex lacte et pane, aut tamen cinis calidum, sub die, -- ad noctem vero, ob urethram refrigerii, emplastrum gum-

mentem, coacturae mentis imponenda sunt. Sub  
vehementi, quatuordecimque debent, fella hyo-  
coccina, cinerea, in pulvere, aut optum cata-  
plasmati jurgenda sunt; ac ad mentem ex opio  
medicina peragenda est. Ab ovariorum in lu-  
bricorum quatuordecim, ut in aliis inflammationum  
speciebus, hinc aliq. laudaverint, abducentur.  
Non negante mercuriali, quod cruris, quo ex  
latere habeo est, parti internas illinitur, sed  
quod modo veneris virus infectum adhibe-  
re constaret, hic opus est. Si tamen, subter-  
diti habentis vis calente ac rubet ingente,  
aliquo ad promovendam resolutionem sti-  
mulo indigere videatur; tunc Linimentum  
volatile, vel mercuriale, quod hoc specifice  
non agit, sequentem, potius indicari; sed  
facilius haec fieri, virus abundantioris, vi-  
ri concuti, et levis frictione ad lagum insti-  
tuta, devoti corticis beneficio obtemperabit.  
Interveni, quod et nos consperimus, virus  
habentis appropinquo, ac persequente doctrina  
sanctae jam tunc dialogi videtur: quae ca-  
tem agna, quia tunc infestatione molatur,  
subinde hinc impellit.

Si habentis appropinquo virus non quoniam,  
in ea vis pertractanda ad, regulas ( §. 174 )  
prescriptas recipiendum, et omne virus co-

tia systematica, vel modo parva, erigenda, sive extra moderandas sunt. Lentior est suppuratio in glandulis progreſſus; ac melius plurimque natura, quam arti; ubi ceteris remediis hoc juvant, contrahitur abominis divitiis. Tunc vero vel ſargo, vel causticis haec ſit, modo plenam abſolutam maturitatem aequivante, nil interet. Si prius hic ſuppuratio sub agnoscenda debilitare coeſingat: rursus ceteris, rursus, lentius rursus, — vel, si dolor violentus accedat, opium, huic remedio junctum, conſueant. Cautius in abſcessu, vel ulcere bubonico curando cauteſcat Chirurgia vos docet. Aliter, ut ſpecificis, hic nunquam, nil ſine ſine ex ulcere accedat, indiguerit: ſed in ulcere callato et antiquo promodo; methodos praecipuos rursus, eadem inſperius, ac methodos conſortium, meliora praestabunt.

Si curare hic in glandulis dicitur requirere: tunc ad ea, quae ( §. 177. ) dicta sunt, ut ubi dicitur, ipſo ſeſſe eventus, etiam non magis, deſcendimus. Nec tamen reliqua in quibusdam, a bubone reſoluto, glandularum leguminiſum plenitudo majorem curandiſſimam, vel aliter inſistentem, quae ſicpe videri ſolent, aliis decoctum, unguentum volatile



cum ductura Thebaica, maris balani, dissipantur, pro virgula imponant! Cauterizationem usquam usitacionem, ad regulas alia hujus operis in parte exponenda, impetirent. Ratio hic loci gangrena, praescripta (§. 138.) ad inges tractanda est.

§. 139. Epididymitis, metrorrhoeae semine c. quib. efficitur (§. 134.) ; pro causae ac symptomatum ratione, diversam tractandi methodum exposcit. Nunc calid febris haud magis hic sanguis meliorem sibi exigit ; nec, nisi ab initio, postprimarium dies aegerat, ac tam leniter fit, ut non ita, sed plures interdum ventositates redduntur necessarias. Jam rob praevia metrorrhoeae, utinamque suspendendi consilium dedimus (§. 135.) : interdum studio inflammationis cessante, semine sibi ipse committi, in multa oppositum est. Qua ratione tumor necesse laetetur, eo magis adspersione relaxandum est, ne compressio succedat, quae facile intelligit. A motu quovis abstinere, ac in lecto supinus in dorsum decumbat aegerat. In robantibus, plethoricis humilibus, venustio, tumore, ac dolentibus, incrementa majores praestitenda, ut ac, si vehementer tunc febris cum pulso pleno ac duro

languet, et ipsa aliquoties repetenda est; aut; si hoc minus necessarium videtur, bisulciat decem vel quindecim scroto apponenda sunt. Sanguis, si ita videatur, detracto, cum aetheris principio frigidum aut perac, aut cum methano aetherali rectatum, sine scroto condico applicari, ac totum loquendum in illam demergi oportet. A camphorae spiritu cum extracto aetherali et aqua rectificata scroto inflammari, conueniunt. Praeterea struchymen solvenda, vel et blando et calida, tumefactis, medicamentis mouenda sunt. Cibi modo parui, facilesque concedendi, spiritusque, satisfactionis fugienda sunt. Si maior admodum, primariam inflammatio dicitur argui: emollientia hinc ipsi, quod frigida, confirmata jam phlogosis esse possunt, apponenda sunt. Si magis nervorum irritatio, et violenta; quoniam vera inflammatio, epididymitem adcontractam vocaverit: tunc opium ad nocum propinquandum, vaporum aromaticorum et nlla perforata, ad scroto, testemque respondens, dirigendi, ac imprimis chymum cum laudali portione fieri depla, libenter prius a facibus intertine, inspiciendi sunt. Vel in ipso, qui cum valida inflammatione intenerat, morbo, testis iam ante amplexo, opium sub reliquis in

acris stimulo perigatur. Sub majori jam  
 usque tumore, duritia, dolore, et prope  
 jam sine inflammatione, escapula emol-  
 lita, quod sub tactu mollior, applicandam  
 est. Masticula sanguinea, quod plures his  
 curis illintur, sine quovis effectu, nisi ma-  
 lo, adhibetur, et si alia profunde avertit,  
 hoc nihil remedii, quam morbo in aggra-  
 vationem cum potius, adhibendam videtur. Sub  
 fortiori inflammatione, flida circa testem col-  
 lecta materia per naturam ducere videtur: sed  
 hoc manifestum et praecipuum hoc a cau-  
 sa hydrocele artem compendimus (§. 524),  
 locum tamen fuit, ut facile gangraenam in-  
 ducere exemplis hoc in cura administrato.  
 Testiculam, ab locuto Chirurgo, hydrocele  
 curatorem cum escapula succipiat, in me-  
 dio perferat, ut diu abinde convalescent,  
 inflammationem hanc in Brachialium  
 Nosocomio induta, observavit. Illa late-  
 rit a regula, in viro ad Clinicum Institu-  
 tum sporas ducit: sed, violente sub-  
 calis, usque in ventres capient potest,  
 ac ultra jam die tumor usque delicti pe-  
 nitit testandi. Delat legem, testis, signis  
 ipsa tumore, dysuria, singulis nobis, prope  
 usque, morbo indolens avertat. Cum vo-

eo manifestum in parte fluctuantem dislinguere licet, scitissimam tamen leucitiam exaruit. Effluat humor copiosus, primam flavus, pellucidus, sensu ac stultus, mox vero puriformis albidaque materia. Nunc portio ad ulnam mittendum novo stimulo, hanc ipsa non per urethram, et primum patiens, sed ipsam per stricti valvam recta, effluat. Hinc iterum, ad locum usque, unde leucitiam, ferente sub calta et arctura, in scroti veluti bellatorem descendit, dilatatam, leucitiam urethrae catheteris flexibili, viginti hinc dimens spatio sanantur fuit.

Medorrhoeam, ubi duritiam, suppurat, eplo didymis inflammationem producit, candelaram, et, ut aliqui proponunt, candelaram novo castoreo defluentem, in meduram sub ipso inflammationis rigore mittendum, auxilio recipere, inopportunitatem, dissonantiam esse putamus. Inflammationis in urethra efficitur est, in arctura, urethrae inflammationis illaque ipsa medorrhoeam non raro evadit, non a suppuratione partem leucitiam, urethrae inflammationis. Commune vero ad urethram phlogos, si tumor urethrae continetur, candelaram mittendum cum brevis stantibus applicatio. Vel a sola aqua ad urethram cum cathete

lia mada, ad tunc tumor illico disparuit.

Si, quod tamen esse solet, suppuratio epididymalem, aut vicinam eidem integramenta, hoc ex macho profunderi: hinc inde intro, in amollicendo tui cataplasmate, dentes per medietate prominent, penetrandum, aut emplastrum ex gummi-bis apponendum est. Inflammatum, et lani scopuli videri, suppuratamque testiculam sectione apertam curavimus: ut sunt pari magis substantiam, diffusi materia sub specie, e vulnere exiens, major tumor testiculi per vicia matura sectione calvata fuit. Suppuratio, quae sub acuto, illico testiculo, contingit, a sumo brevi tempore curatur.

Suppuratio longe frequentius est epididymis non modo, sed et ipsius testiculi, ab inflammatione progressa, durities, ex qua natus patet, quod, si ab initio non ligetur adeo tumor inflammari sit verum, sub deo tamen morbi sui aliter se habent, et phlogosis, et pendens ex loco, loca progressu, durities, tum illic, tum fasciculam spermaticam, quae longe ad recte deo usque pertrahit, non raro corrumpit. Variis, et hoc gravi sub malo, methodos committunt Serris, pons. Epididymis durities acceperit sponte disparuit, aut, massas, particula hanc movet

( §. 134. ) : ad curam conueniens, difficilis curam, et uirge uallo, melius, quam valde agens, irritans, et mali exitum fortius in carcerem precipitante, remedio, uispendio saltem confecto, tractatur decidet. Quam alibi ( §. 135. ), sub inflammationis in decidere exitu, proponimus, — hanc et presentem in cura curanda est methodus. Mercurius sublimatus, non raro curam faciem, inducit ; et ut specificus hic agens, ut, uento, peruenit innocuus, per uasa lymphatica in ipsam transire toxiculum potest. Uoluerunt volatile, uispendum cum camphora, atropae belladonnae, resedragorae radice, .corne, cicuta, assuli extracta, interno-externis, adhibita, ossidis opioe, daphnis curam decorem, guttae amoniacum in aceto scillitico solutum, electricitatem, ac ipse adeo sanctorum lapides, commendari, — sed non tam nunquam ab istis capiam, ut certe nemo . A scroti balneo, ex aqua cum opio remota, frequenter iuncto, hoc ipsum dissipare solent, capto a Viris preglant . Num uis, candidarum, medorhoeam uocandi fac, in uentrem mueram, ut alius, ex suspensione istius inducit aggritudine, ut et uentrem aliquando decidit diuident: de

hoc

hic ex proprio decidere angustias exemplis; nos aliquem, per novam methodum, ab eo certum effectum liberum habere, cognovi-  
mus.

Si majorem jam visum ac dicitur suffi-  
cientem acquisiveris, ac dolor laetitiaque eundem  
frequenter praestare solentur, tunc certe co-  
nita maxime nascipienda est aspiratio. Si per-  
mittas istud usque ad eundem jam re-  
cessu, ac datus percipitur, folliculus: tunc,  
ab portione hinc abdominalis supra con-  
suetam hinc in malignam inflammationem,  
in carcinomata, vel in gangrenam abitura, vel  
lethali haemorrhagia ob morum, peiori sub  
omni operatio suscipitur. Post carcinomate co-  
nitali rursus recidit, ab illius, a re-  
sistit in chirurgica Viro acriori sperna-  
ticam, quae mox, necesse facit vi tempo-  
ris, citare ac elidit abdomen venter re-  
tractus, non potius ad eundem ligari; ac  
sanguinem copiosum excide lethali cum drop-  
tu interna ad loca praecipua, exemplo no-  
bilibus.

§. 540. In plerisque (§. 535.), quae ut c. 1000.  
melancholicae sunt symptoma incide, cura-  
da tam petis ipse dicitur, tam praecipua,

ita ut hoc super glande veluti quiescat, par-  
parenda sunt: Bina impellunt reductionem et  
causam probe expellendam oportet. Sertum co-  
les ad ventrem, si modo profluviū ex uteribus  
hoc vobis sita difficultas non impellat, deli-  
gendas, motusque corporis evitandos est. Si  
libris, prorsusque pluri ac diu diu adhibet  
vegetando, pro accutitate repetenda, hiru-  
dines, ac methodus debiliatas, clysteres indi-  
cantur; nec major prorsus, quam nec hoc  
vix manifestat, valde expectanda est. Por  
venam venam, cum vix venas est inflam-  
mato, frigida sedem vel totam, vel cum  
auro, melleo sacculi, conjunctum applicari,  
sacculumque renovari oportet. Sub majori jam  
et sine phlegmonoso prorsus tumore, tensio-  
ne, fomentatio, vel balnea pedis continua,  
sepius cum lacte; decocta malvae, cataplasma-  
ta anodyna, ut mollia, praestanda sunt. Lac  
sepidum, decoctum hirci, vel malvae, emul-  
sionem Arabicam, diluam, ut glandis, pro-  
piti expellendam probe abluam, coarctantes  
impediant, nec impetu, saepe hirci non  
competit: Phlegmon vobis sit, si tumore pro-  
piti admodum repens, alacris solido ap-  
plicata coadant. Prorsus, quem aliqui hoc  
in cura iustitiant, sectiones, ob non para-



pericula, et delentem periculum, et congressus impedimenta facere, vix naquam, — ac certe minus, si ipsa gangrena accenderit, admittendam esse censeamus. Si forte, ablata jam praeputii phlogos, altera sub illo habere videatur: tunc mercurii sublimati grana aliquot, in aqua distillata soluta, ter, quaterve in die, injiciantur; vel et longioris evulsiones praeputii extensam ad finem, ut reduci hoc parte, impediatur, hujus partem velamentis circumdoli jovebim. In plurima aereola, cum rorosis praeputii, scarificatio levis frequenter, moderata, obuscula solvit.

§. 341. *Paraphimosis* (§. 326.) ad eam *C. paraph.* quod spectat, in ea, ac penis strangulatur, et glandem a gangrena non corrumpendam aminat, ac loci quæritatoppositior accersio, ferriendum est. Coleligitur, erectus, ad glandem, a manu, cui directi, ut glandem subtiliter continere impositur, aliquoties comprimitur, — vel saltem frigida cum glacie, et unguento extrinseco remittitur, leniendum est: quo sæpe putrido praeputio caput glandem posse protrahi, contingit. Si quomodocumque consuetudo esse videatur, ad episcum hoc motu ventriculum etc. Si enim minus succedat, tunc

ad regulas chirurgicas proprias sine mora, quæ in anulos post glandem vitæ con-  
tinentur est, ne corpus cerviceque unum vel  
alterum laceret, ac tamodi varicose consubi-  
tum impediendi locus struatur, incidendum  
est. Si forte glandem gangrenam prehenderit :  
hanc cum cavernosa ad corpus, femori te-  
gamento crassato inserta, protrahit, vel  
vel sponte, vel facili negotio, glans tota ex-  
pulsitur. Hoc præstare, ne vitium, ut da-  
vit exemplum, condecet, per singulam ei-  
dem laceratam, cavendum est. Interim gan-  
gramam, paraphimosis sequente, ne partem cri-  
bellatam, quæ corpus cavernosum investit, con-  
sumente, penis cervice cerviceque originem ali-  
quando agnovit. In cervice, miliori miliori,  
paraphimosis, et ipsa in phimosis (§. 340.)  
scarificatione propius conducunt.

Q. 342. 343.  
Annot.

§. 342. Consideratis studiis medorrhoicæ in-  
flammationis symptomatibus (§§. 337. — 341.),  
ad illam, quæ relaxatione appellatur (§. 343.),  
certum descendimus. Hanc vero in  
pluribus ab ipsa natura absolvitur. Nam igi-  
tur, si quid de subito illius, vitio detra-  
hitur, vel si, ob febrem precursantem, anti-  
phlogistica, ac potius paulo magis insulsum:

sub lege veniunt in longum tempus continuanda, diutius rigorem pro gradu stimuli relicto laxiorem, ac metodo debilitanti, ac alleviata profusum hoc infusum, quod in feminis propter vires timidas, accutur, moderari oportet. Si totius debilitas systematis nec morbum praesensit, nec inquitur ob nocum, ob dolorem violentum, ob vires sensatorem, ob humorem mucosi jacturam, atqueque tunc, ubi sub his hujus modii, praeter alios symptoma cum visipertinet libenter portet, ad coram vel frigidum infusum, vel decoctum accedimus. Sed plura, hoc a morbo, *degenerando*, in genitalibus, *dehiscit*, *lenientia*, *marivida*, *et* *maribone* reliquis, laborant; atque hinc locustibus magis vel solis, vel corroborantibus universum systema superadditis, remedia indigent. Per gradus igitur ad hoc veniendum: genitalia frequenter cum frigida in viris lavanda, in feminis simul cluenda sunt. Si longius, quam par est, profusum coarctum, *dehiscit* in urethram, vaginam, aque calida necesse paratur, solutionis cum opio, vel solius (N. LXIII.), vel superaddito saccharo saturi (N. LXIV.), quae utique tractantur illo discrimine possunt: quae certe sub metodo, brevem in utroque, — nec tam

longam in alia, morbum sinit medorrhoea ,  
 et praecipue non incuriam esse pericula .

Ex altero utero prodromum medorrhoeae,  
 vel cum, laevo adesse, symptomena sentitur,  
 adhibito mercario, ut haec ipsam, — et quod  
 reliquum est, expulsa via methodo, tra-  
 ctamus.

*U. med. fem.* §. 343. Vaginali acies ( §. 339. ), non  
 alia, quam uteruali utroque in sexu ( §§.  
 335- 336. 338- 342. ) medorrhoea, modum  
 est methodus. Tepida semper in foribus  
 majorum, quam in viris, in cunctis sangui-  
 do utilitatem monstrat; ne potior est, vel  
 sub ipso studio inflammationis, injectionem  
 cum emollientibus, vel cum lacte, emulsi-  
 onis Arabici in vaginam, sicut impio factarum,  
 quam in uterum, leniendi facultas. Venam  
 cauterandi ratio haec sub morbo apud fo-  
 mines accedens habetur; nec potius quantitas  
 olei unguis, quod vaginam saturatim pullipet  
 grana non allidit ac irritat, et quod major  
 genitalia post emissionem urinae levandi cun-  
 ctas facilius, requiritur. Sed, ut commutetur  
 hoc in sexu medorrhoeae acies in rheumatis-  
 mus est transitus, ita fere unguis relaxandus  
 in illa, quam inflammationis, modum et

restionem Medicorum ubi erigit. Hinc uti  
lecto toto tempore, sub majori corporis ac  
animi quiete, mulier commoret; ac, si forte  
maiores fluxus sanguinis nervorum turbas co-  
mitteri consueverit, has cum opi portiones  
composit. Tardiori, & cunctis jam phlogosi  
medorrhoeae, cum externis (§. 542.) me-  
dendi, melior, absolute a diebus jam tribus  
aut quatuor mensibus, habebitur curatio. Fa-  
cile ferricem vaginæ, quam urethra viorem,  
opi, vel methui satius portiones admittat.  
Sed profecto sit, ac sanguis in die, praesens  
cum aqua simpli vaginali eluere, laetatur  
indurata adstringentis solutionis injectio: quam  
supra in utro mulier per aliquot minuta re-  
tinere coartat, appropinquante vero mensura  
periodo processu emittat.

§. 544. Habito adcuras respectu, non ali-  
ter, quam acta urethrali, vaginali medor-  
rhoea (§§. 535. 542. 543. 543.), tratan-  
dum est recti profluvio ex opi locali effi-  
caci inductum profluvium. *Memorabiliter me-  
morat, ut videret, eandem, quæ sequendi de  
sanguinis profluvio libro eademur, ad regu-  
las moderatur et curatur. Similiter de sa-  
nitate, ac menses ex venis recti interiori*

de med.  
1781.

profluvio, cum de illo, quod ipsam dysmen-  
riam langueret, alio sermonem tractarimus.  
Si ex usu, vel a contagio, totum officio ad-  
moti, infectio ex phlogosis oritur: nisi ul-  
tus venarum, quod specialem sibi curam ex-  
ponit, hoc lateat, tunc, potius circa uteri  
hirsutibus, vasorum repletionem moderari,  
alvum cum oleo amargo laxam curari, ac,  
cumulo fortiori sublato, ex emulsione Arabi-  
ca injectiones instillari oportet. Cessante jam  
phlogosi, ex profluvio in linguam desistente,  
externa, quae in madonibz vaginali com-  
mendantur ( §. 343 ), remedia adhibenda  
sunt. Frustrum cum felici curationis eventu  
tractamus, quae, ex supposito cum adstip-  
gulis madonibz vaginali, impuro concu-  
bitu contracta, mox similia illi ad eandem  
symptomata, — et neglecta, adeo citius jam  
sanis, ferri hoc incommodo, neci insensibilis  
hysterati pertinacissima, et ferrea, nisi dili-  
gentiam, excretionem potius nunc impe-  
diens consuetudo affligunt. Frequenter, sed  
parvas, ex lactis cremore dulci, injectiones tri-  
plicas in anum instillat, hystrum caecum eidem  
instillat, posthinc vero agarici frustula prae-  
parat, ac post hinc candelas nuncius semelque  
maiores instillat curantur, ac sine auxilio

has methodo habitum extremo lentius conciliare possumus. Nec ad ipsam vaginam, imprimis vero exteriorem ejusdem ad eandem, hujus callos medorrhoeae, imprimis mollescentes, cum aliorum congeneres, in dextram partem insertam, et Vaginetum angustiam, deest exempla.

§. 343. Sub nomine medorrhoeae (§. 331.), <sup>C. med. chron.</sup> non solum genus, quae morbum inducit, radice, periculum in curandis partis effluat studium pendendum est. Hinc forte aequi, deventientes, emollicatae laesae a phlogosi corruptae adjuvandi, ac similia, sub longiori praeparato injicienda sunt. Discolpato cum laesae simul, ad extrema, quae rebus intusque sustinuit, majorem partis sensibilitatem corrigant, imprimis ad ea, quae (§. 341.) adduximus, fortiora paulisper, remedia maxime perveniant.

§. 344. Quae nomine chronica, et acuta de- <sup>C. med. chron.</sup> scendens medorrhoea (§. 331.), praecavenda, curanda sit, pariter jam dictum (§. 341. — 343.) Quod si praeparata jam methodo superiora non valent, decessit eventus: tunc posteaquam, an aliter, vel, cum aliis- <sup>In cur.</sup>

ma hoc adhuc, molumentis superficiali, in urethra latet, inquirendum est ( §. 533. ). Est latens seu et hinc rixam aspectus fallacia, et exquisitam longumque sepe locum sub medullaribus acuta afflicta, sine ulcere presentia, stimulantem, et movens, coarctat; nec non pons, leucis, ab humore putrescent, in cryptis urethrae mucosa stagnante, tam facile est distinctio; nec angustis parcellis in illo compositum, coarctat lacuosum ut certo confirmat. Quod si viam de ulcere stratus non esse jubet diagnosi: an venereum, seu malignum, hoc ipsum, an vero benignum modo indolem ferat, priusquam alio symptomata comparant, haud rixam coarctat; vel, si fortiter coarctat, mercurialis tamen acut intrinsecus, alio rixam jam in corpore evoluto, profectus haud sunt. Interim injectio mercurialis coarctat ( N. LXV. ), nec quidem specificum, et rixam, sed viam deponit ut modo vitam promittit. Si hoc ipso, frigida, vel ipsos glaciis, frequenter et brevi tempore coarctat ad urethram applicanda, per viam, molumentum non erit profectum: tunc nec spiritus vini rectificatus cum aqua vel septem partibus stratus, seu virgali solutio ( N. LXVI. ), vel et cortice quercus junda-

Per inject.



rin, et dilato tandem ad sanitatem valendo, decoctum, aut lapidum canthari soluto ( N. LXVII. ), aut myrrhae liquamen, cum tinctura Thebaica, melletho citrati et aqua ( N. LXVIII. ), per longum tempus sumpta, sed majori sub cantho, adhiberi munerur. Interdum rhubarbarum ad docta, quae alvum vix movent, vel et balsamum Copaivae, treblichinae, apud nunc, per quorum mellethum succidit via penetrat, exhibita faciunt. Val ipsa cantharidum tinctura, quae tunc vix vel hoc in cura videtur, quae inde non fuit. In cura cantharidis ad urethram morboque, pessimum ex opii vel sola ( N. LXIII. ), vel juncta cum melletho citrati ( N. LXIV. ), solutione actionem operatur. Ab interio, hoc sub malo, nil debilitat universalis subsistere videtur, expulsi effertur haud potest. Offendi, hoc sub modo laedit, expulsiorem hancque non fecerit.

Nec minus est vitium considerandum, vel et ap. per melletho, singulis ex secum claudis penitus, tam in casu, quae alvum laetare suspensum, quam imprimis si luctus urethrae, prolixum curam formare videtur. Jam sola interdum equitatis, et iudicia per litem moderata perituri consumo, — vel et vici alvum, aut novae me-

duriores saepe sunt coragium, phlegmæ acuatam in urethra revocando, longatius finem imponit medorrhœæ. Parum refert, quæ de causa credideris, quæ singuli tractum medorrhœæ in urethram sternalo agant, ac tandem comprimant, erigant, eligatur compositio, modo gradatim a miscolibus ad majores accendi, ac eodem, latitanti non periculo laniationis, tempore usque aculæque longiori in urethra non modo retineat, sed et ad ventrem firmari conentus. In veritas casum delapsi, et calculo crystallino pro aucto serventur, cunctis in museo pathologico struamus exemplar.

o. apud.  
uenerat.

Sed ad feliciora hujus viruli inventa, viz duci urethri, vel ex resina elastica cylindri, catheteris, cum vel chronicæ inflammationis, vel urinis diffinitas, suppuratis, non ex urethrae nec phlegmæ, nec spumæ, sed ex mechanica ejusdem arguta, accendunt (§. 333.), licet morbum redditis viz tollant, curandi sunt. Sub ulnæ, fimalis urethrae, periauri, sub preteritis tumore, abactum, ac prodeunt ex liti icharia, saepe unicum in hoc summo subsidio solutum habetur. Si vel minor, quot miscolibus utper praesentiri oportet, cunctis urethram haud percutit: tunc maxime inter-

dum chorda, prius alio insecta, canalis scilicet, ut nec quoque servatur, aggraves negavit.

Sed fortis in urethra inflammatio, vel aliud urinae fluxui contrarium obstaculum, ceteroquin, catheteris introductionem impedit: tunc, maximo casu, uretica aut per rectum lacerationem, aut ad perineum, — aut denique ad pubis regionem, cum triumphe, ut in scuto de urinationibus libro diffusius exponemus, perficienda est. Plerumque his in chronicis urinae suppurationibus vel prostratis, vel colli urethrae tunc ac durities, ac triumphe per rectum lacerationem, perineum, sive lacerationis periculo, ad vesicam iterum, impediunt; ac optime ad perineum hoc visum perforationis conditio. Qua tunc nos lege cavet, cadere, triumphe, his in casibus uti conveniat, — qua denique ratione abeunte, facile perineum, urethra, trahendi aut, Chirurgia tunc docet. Vis perineum, ac dum jam nimis adoleverit, tunc, ac durities chronice ad prostratum symptomata se prodant, vel accedunt ab acribus. Hinc raro, si unquam, auxiliam a methodo (§. 135.) copiosa adhibuit; nec unquam mercurialis ad perineum, laceram a relictis, laceratio, nec interna, ac

Suppuratio  
UTRAQUE.

dicata, mercurio, vel aliis, medicamentis adhibitis opem in cura graviori valeant : Plenumque tamen per vires lavabit, et nova ex pisseguis augetur urinae et periculae curare difficultas : quae saepe hinc inde, solentem volubile periculo applicata prestant : Interdum a sperme excitatur, et per vapores aromaticos ex vella perfusa periculo adhibeo, per clysterem emollientem cum oleo injectum, vel per cataplasma anodynum periculo apponendum sequidemque per balneum, moderantur hanc incommoda.

C. med. in-  
dubit.

Quae feminam ducunt, vel ex aere, contagiosa ( §. 509. ) descendens, vel aliis ex causis ( §. 513. ) oriunda, excoet medorrhoica ( §. 532. ) : haec equidem vix alibi, quam ab ipso quereis, methodo generationis tractanda est ; Interim propitiam sibi nulli locis, urbium apud incolae quotidie levitatem, opem considerationem exposcit. Quae igitur occasionem hanc foeda profluvio dederunt ( §. 513. ), et sollicitudine vel malicia eritant, — atque non illud alterius, primariae, agnitivae efficit, — non totius systematic conjuncto, non solo genitalium e vicio descendit, — non feminas majorem cum hoc foetu habundantem jamjam contraxerit, impetio di-

sexual, — ac tandem, desumptis ex hac ipsa cognitione indicationibus, symptomatum, dirigatur, ubi iam curam opportunitis auxilii debari oportet.

Cum vero ducit praeterea, quam adole-  
scens adest, quae hoc vitium: latent quam-  
plurimum, ut eorum parentum meritis periculis, a prima pubertate, cum mentis exacer-  
batione imminetis, cum proditiis ab ejus ne-  
glectis, vel a vitiosi naturae perversa, mor-  
bosi profluvii naturae congestae cognitio. A  
sola retem, quae proprii conditionem tenet,  
ac valetudinem caecumant, communis ignora-  
tia, et a male iudicata mulierum verecundia,  
quamplicitas virginitatis, mulierum, matrum-  
que juniorum segrecedit, a prima principio,  
neglectas, ac malum, principum parentum,  
adversas fides, dolores; nec eorum, quae  
jam per agere non paucam, quin de morbo  
incipientes formant, vel eandem parenti-  
bus, Medicis prodidit, pueram ex utero  
villaverit, nobis deest exempla. In genere,  
aut major in urbibus, quam opus audra-  
mus, sequens in secus phytica, et operis edu-  
catione curatio succedat; — vel matrum cor-  
pora detestata vicia, vestire, erigere curatio-  
ne, sanitas ad leges accommodata, magis;

quam voluit, sublevari firmantur; sed non  
pote in aliquibus praemissis evitari, con-  
sequens circa prolem alendam officio, et ab  
ipsa natura, sic a legibus praescribi queant?  
— ac deum, sed magis illarum, quae ci-  
ves Republicae donant, pariter sub opes, uni-  
ta spem omnes habeant: — Am Medica qui-  
dam animam mulieribus hoc ex profluvio sa-  
ltem hinc inde sustinet; sed morbum tam  
late inter illas cursum; ac natura populos  
tam tam infirmos, praesidio sola non pos-  
sit. A frequenti ingluvie paduodorum natura  
saepe, quem rodet frigus illis a subditi forte  
igne calefacit adulescentem inducit ( §. 777. )  
et quo magis cum profluvio habitudine in muli-  
tis inducitur, facilius sibi curantur.

C. interna.

Quod si igitur vel morbus quovisq; alius,  
vel totius laetitia, debilitat systemate, hoc  
profluvium inducitur, continetur: tunc illa;  
quae his ipsis opposita sit, methodos, — sub  
magis autem firmitatem laetitia, castitas impo-  
nit, manducant, cibi restrictione, risu, exer-  
citiis moderatis, balneorum frigidosum usus, —  
ac ita ut febri jam urgeat, dicitur vitiosum,  
locuste dicitur offerri sicut curatiles praesentant  
de sunt. Nec promissum est, quae interea sub-  
beatur, generalis laxandi-dicta, medicamentis

capit

nam in ipsa genitalia effectus perpetuo occu-  
runt: sed videmus: hincque hoc a fluxu vis-  
cerum verum, cui, quodam modo hincque  
stomacho ingressus, totus ille illico sub  
magis anxietate corripitur, utque maris re-  
positio, recte cognoscitur. Rarum est, hinc  
recte placuisse pro causa verum; ac si  
recensui defectus frequenter eodem procedat,  
ex eadem utroque symptoma cogens, locum  
scilicet ad uterum obstruendo, plerumque do-  
scendit. Hinc certe, si nequam, remanente  
femineque hinc fluxu subiectum non  
laedit. Nec minus ex, quod, ob uteri, ut-  
cui hincque in sanguine obstruendo hincque  
hypothalamo, totius commotio, purgatio  
verum remedia, tam ex eo, quod totius de-  
bilitatem, sensibilitatem adaugent, tam quod  
vixit pelvis stimulo contrario cognoscatur, tam  
dante praesentante. Si latet in ventricu-  
lo, intestinis, uterum hinc digne videatur:  
erodendum ex radice ipsoque, vel rha-  
barbarum cum magnesia calcinata, iuncto cin-  
nabamo, proferri oportet. Si vel soli cum  
magnesia, vel lapidibus calcis, vel aqua  
calida, proferri hoc genus aliquando utroque  
tam facile legimus: id certe, symptomaticum,  
ex ventriculo, ab acida uterum verum, hinc

opportunitatem corpori multiformem divergunt , atque percolentem per coarctatam turbant , eductam potissimum trahunt , abstrahunt . Mercurius , quem aliqui his morbi laudant , si , pro pinguis alvum remedio aegrotis præbeatur , non minus ac alia hujus classis medicamina , debilitatem præmentem adauget , — si , ob mucram , ut supponant , crebris indolentem , pro laetentis remedio officatur , ad hypochondria magis , quam veras indolentias ad longè præscribitur . Si scintilla acris venenæ , herpeticum , vel scrophulosa dispositio fluxum ex utero induxerit , aliquem sublede locum mercurius habebit .

§. *quæritur.*

Sed , vel universi debilitas symptomatis hunc modum procedat , consistat , requiratur , vel ex vitio genitalium locali hic pendat , exterius ubique requiritur subsidium ; et ultimus in casu hæc jam sola sufficiat . Tempore lateris , quo feminæ profluvium ex utero vacavit , et contractæ cum eodem debilitatis , naturam non parvam hic haberi oportet ; et utraque remedia sub majori cautela , studium utriusque a medicis ad fortius progrediendo , adhibenda sunt . Si aliter , inque major fonte , morbus a fluxu ex utero pendeat subsidium habuerit , levis profluvii suppres-



sic primarium facillime agnoscitur verum-  
nel. Plura hauriam *Antiquitatis* ex legibus in-  
fractis, quia quod in aliam linguam carceris  
reputa, deposita sit, partem, nascitur a cop-  
pita hoc profluvia salubris innocua ( §.  
334. ).

Primum, quod externe adhiberi mereatur,  
remedium est *frigida* : quae pro balneo locu-  
li genitalibus affusa, vel lumborum regioni  
aliquoties in die, a certa altitudine, instillata,  
ac sicut ex syringe est crassa, phlebotomae fo-  
runculæ instructa, in vaginam injecta, post-  
foris per stagnationem, locique calorem hic  
corrupta materies eluitur, et necrosum lacer-  
ta, et lacerata partium quae optime conglu-  
unt. Sub minori pituitae acutissimae, fortare,  
aqua calida vel oïda, vel cum cortice Peru-  
viani decocto, frigide injecta, melius conglu-  
unt. Sub magis diuturno ac rebeli profluvio,  
ad illas, quae in antiseptica medorrhoica,  
ex opio, saccharo saturni, vitriolo albo, cam-  
phorato ( §. 345. ), — sed ob microm  
vaginat, quae unthrae, sensibilitatem facie-  
tes, injectiones ( N. LXIX. LXX. ) gradum  
agnoscunt; vel has ipsas per spongiam ma-  
triam, eadè levem signa incrementum, floque  
mutam, — vel coarctam, perurii in mo-

dam, similique liquore imbutam linteam, aliquot per horas vaginam, seque simul prolapsam impediunt, committentes. Nec minus assuetis ex thuris, mastiche, aliisque resinis aromaticis, ad curam genitalia, vel simul per totum, ac calid vaporis obicit, ut longum, ad vaginam directam, commodius meretur. Equitatis in multis hoc sub modo agere conducit; non profusionem absque, ut exspectari liceat, augeri, sed manifeste impetui, intendimus.

## O R D. I L G E N. I I L

## GONORRHOEA.

\*\*\*\*\*

§. 347. *A* gonorrhoea ( §. 318. ), semina venere-  
humani morborum profluvium, Gonorrhoeae  
sub nomine, ob similem partem ab ea diver-  
sam, aurescens separatur. Ex vero gonorrhoea  
fluxus seminis, vel analogi humani, morbo-  
rum, vel continens, ac utitur (completur),  
vel sine penis erectione periturus, et a milia-  
ri, vel a nullo, libidine stimulo sine inde  
contingens ( incompletur ).

§. 348. Hominem in maturo aetate ad co-  
itus necesse, ac per vasa deferentia in veri-  
culis testiculares depositum, autem pro spe-  
ciei humanae propagatione hoc non ample  
receptaculo fluxus in vas credit: donec  
copie adactas, et ex parte receptas, gela-

hui non modo nervos, sed et totum systema ,  
 vi magna excitaret, atque animal humanum  
 generacionis ad opus levaret; vel ab illo qui-  
 busque ex causis hinc citius minime ,  
 nobis insensitis, per aetatis, constitutionis, vir-  
 tutes, ac morum rationes, capiat, aut rariis ,  
 palliativis occurrer sub nomine expellatur .  
 La vigilante interrim, atqueque vires, et stimu-  
 los extrinsecos evitet, utinam praefer volunta-  
 tem potius sit exercitio; ac ut ita in ho-  
 mine volens saturas ad finem succedat, ve-  
 neri exercitio precedat, et ad copulam fol-  
 candam praeparatur genitalia, necesse est .  
 Nec in dormiente adeo homine frequentius ,  
 quam ad sensibus collatis copia laedat, his  
 liquet sub normali lassitudine deprimatur: nimis aut  
 vigas excelsioris, patet spirituum, sub vires  
 edoce, ingenti, que intemias cum vix aitem  
 commensuram, vel aures, vel obocensuram lo-  
 crio liberum, imaginem lassivam asperat,  
 illudque colloquia, nullique in dormit de-  
 cubitus, naturam exultant . In agitata  
 vero homine, vel dormiat, vel vigili sit, ob  
 varias rationes, et imprimis vel ob tales ap-  
 petitus nervos, — vel ob specularem genita-  
 liam debilitatem, sensibilitatem, vel dormit  
 ob sensum hic partibus adnotum, sensu-

hic exordia liquoris continentur a natura liciti-  
m excedit, et cum legali secutiis deri-  
mento vel sub somno, vel, quod peius  
jam conditum signum est, sub ipse vigilia,  
a causa nasci, ac saltem hoc debita penis  
erectio, ut et sine constet voluptatis uti-  
m, contingit peccatum. Sed et alium existit,  
nec longe illi, virorum conditio: cum so-  
mno dormiant non minus, quam vigiliis  
ex ardua, prout omnes voluntatem non  
modo, sed et libidinis, voluptatis sine error,  
ac sine veru erectioe, distinet.

Sunt quidem, qui viri contra viri, quod  
sponte in cadere factum circumstant, sine  
causa voluptatis ac concupis, vel, in dor-  
mitione, sine animae ludibrio veneno, ef-  
ficere negaverit, sed quoniam hanc non Mep-  
hiorum ad verum perveniunt mysteria, deo ta-  
men nobis ipse jam pridem, quae conser-  
vare custodire, oblati sunt exempla: unum  
juvenis, sed impotentis cum matre dilecta,  
viri, qui ante culpam impotentiae in am-  
m sub somno sine quaeris, de quo ubi  
conteret, animi ludibrio, ac sine illa volu-  
pate effluente, frequentem jactant non im-  
merito apud, — alterum, quod magis re-  
rum est, viri a prima juventute carissim,

q̃, licet, ut agitata jam antea demonstrabo, plurimo casus veniat datus. Hoc semper, cum in ætate juvenili robore, hinc patitur, et a quovis alio ubi stimulo venere longe ævum, in febrem malignam incidit, et in vagam periculo versat, Medico celeberrimo videtur, et ipsa, quæ mortem his timuerat, nonne ut antea capere ubi nunquam esset, ac aliter jam de sanitate profecta pavida sit. Cum vero hujus vii jam tantis nobis communis valendo fuit, frequenter in illis uris, nisi contra hanc inde dormiens, a quo plurimum reficiebatur, perdidisset, hoc ipsum ad pediculi unius et majorum stridorem in fundo vultu detulit. Ex præteritis, et aliis puerant, hunc affectum, etiamque dentitionem, liquorem detravimus: sed cum aliquando curro necesse per vias calerrimas radiorumque veheretur, sub medio cum nobis maneat, et cum certe nulla remedia de rebus cogitare debeant, ubi lacrima ex urethra præter æthiopicam dulcissimam manam, id ipsum quod effluens, amare, odore, colore, consistens, diffundit nobis oboclit. Nihil certe obest, quin sub majori vehicularum remissum plenitudine, vel sub laxo catheletem, quibus hinc in urethram depletur,

habitu, vel sub progressu foraminulorum  
egressum molles, sub alia corporis fer-  
ricol, optatus, his liquet in vestram expri-  
matur.

Quid finitur in sua hypocrisis sub col-  
ta, non certe quavis, non omni a femina,  
sed tamen a multis, sub opaco compressu,  
probandi solitam coarctat, — quamvis cel-  
larem agnoscat: hoc, licet de re perquam  
coarctata agatur, hanc vique in diem ut cer-  
to non perperamus. Sane esse Androgyni,  
maris pro naturaliter consideramus, prescindi-  
ble; Reversionem ex magis rationibus ne-  
gamus: sed, fortasse minori veritate argumen-  
to, a muliere, deca utrimque vaginam, farti-  
bus prestat dicimus. Hanc scilicet coarctio,  
in muliere, — copia, celebritate, et impetu  
majori, quam a crypsis masculis regi ut quare,  
concligit; nec humer copulans tenorem, ut  
moxa, huiusmodi detendit. Augetur quidem et  
latius, sub astra, per vaginam, coarctio: sed  
quam sub illam ac in vitro phantasmata  
per pauca nocturna copulata concligit, et  
non minus in vasa equaliori, quam molis in  
vitis effuso, veloptatum ex astra preceptum,  
vestramque venis promptissime entlogat,  
vel, alando coarctato, huius, aut minit-

ant, succedit; vel, si frequentius precoritur, eadem, quam major in viâ pectus terrinâ, laete valitudine incommoda ( §. 149. ) producit. Haec denique, diversa a mensu-  
gine, materia, non minus ac inter visco-  
rum, rub. accepti labellis, sine quavis genita-  
lism irritatione externa, molitur e sua hinc  
inde profundius; et committit similis utrum-  
que apud amari intermedietate vixit, ne-  
quale in utroque materia, conspigit, nequale  
demon valis artem potius configitur.  
Frequentius in aquarum, plurimum equorum,  
quo vixit apponitur, et ad conceptionem  
eius cuncta pectus, cunctis utroque dactylis-  
quis. Uno hic ab aqua plura ad vixit  
equi, ad materiam, genitum, admodum capi-  
te, lentari, et non generationi ad opus  
prospiciendum largiuntur. Inquit, flavescen-  
tis, pollicis, ex genitum explosione si-  
gnificati, observantur. Quod esse, in uno  
ex gradiorum clare structuram observantur,  
non conspicere phenomenon, quid in fœtu  
humani conceptionis ipso opere contingit,  
ut clare manifestet.

Quod si vero, quae ad prolem genera-  
dam utroque in una contingit, auti spem  
vixit, quae humana apud feminas



analogi, cunctis, vel a viculis aequo mil-  
lariis, vel prout arbitrium, intelligere,  
moderat: cum morbus, quem gonorrhoeam  
vocamus, oritur, cujus fibiles in ipso non  
minus arguentes, quam in gravis humani  
propagationem, effectus decalbere consi-  
mitur.

§. 349. Non modo qui prout arbitrium arguuntur,  
aut modis sub sono, aut rigide, discor-  
dam liquorum e genitalibus, minori sub ob-  
scuro, dependent (§§. 347. 348.); sed et  
illi, qui, auctam gonorrhoea laborantes, ta-  
men, ultra quam aut actus, aut virus per-  
mittunt, vacuam proutque libidinis ex-  
ilar, aut semelipsum mactant, juncione im-  
pulsu quod, uxoribus, humanitate actus per-  
et, puellas, aut actus modici matrimonio ju-  
gare: cum ferreus juncione, et sollicitudine, li-  
cet pater, liquoris dispendio non cunctis,  
quam ex sexualibus, quas singulos coitus co-  
mittunt (§. 347.); et quem in ipsum ap-  
pulsionem transiunt: ex variis exemplis utro-  
que in uno capite recordamus, totius syste-  
matis agitatione frequente, primata, viribus  
languentis, de fluitibus, de stomachi infuere  
uere, consequuntur, pallentis, ac puerilis

lirum elegantiae deponunt; capite gravantur, rursus acrius, oculis uoluntat immutatis, semini morosum, asiduum, — sub sono recepto, dyspnoeam coeque palpitacionem accipiunt, tremunt manibus, et crucibiles vacillant. Interus lēris haud adest, ac cibos ut aride sumant: sed in corpore nutritionem coarctari, quotidie magis magisque macilentum, non sentiant.

Tales desolati.

Huc vero malorum cum venturo est, vel et illi, qui ex propria sensu voluntate jam satis sperarunt, aut cum uxor, aut soli decumbant, cum palpebris vic. claudunt, mox, impietate in domum carendi, ac lecto molliori cubantem, uxorē sub vocem lēdibria, ac novam sensibile iacturam periculator. Jam vero, si uxor concubitu id mali praevenire contendant, ac minus apoc ad exitum procedant, ac saepe sub almidia, vel nulla, penis erectione, priusquam uirum molliorē adire possint, — interdum jam a sola femine dilectae aspectu, vel, oblecta vel lascivae imagine, commotionem, sponte liquoris seminalis sub vulgus, aut for nulla, volapise amittunt, ac vera gonorrhoea labant. Interdum, quod jam diu medici non tandem intelligit, cum urinae, aut inter-

en valent, utero gravitate cognatum et si-  
quidem profundant. Ea praeterea partem in-  
tina vesicae, cum valent astringit, sed ma-  
gis, quae hoc profluvium insequuntur, debi-  
litas, acutum symptomata, et talia, nobi-  
lissima hic simul liquorem deponi; et ex  
partem, quae hoc accendunt, violento et in  
longam continuata viscida, coarctationem in-  
timam coarctat, et cum totius interioris as-  
trictione, augeri, demonstrant. Spiculis vero  
serratis medullae hic magis, quam alibi, hoc  
sub morbo verum, cum formidat, ac et  
frigida, et talia per columnas vertebrales  
longitudinem deorsum ascendunt, cum lam-  
bellae vasculorum major, quam aliorum,  
et spinae dorsi prominent, coarctatione, talia  
accident, ac talia deorsum accedunt, sunt  
aliam hanc originem interdum, quae ex co-  
lumbae, agnoscunt, non improbi hoc confirmant.  
Non raro coarctat ad caput, moxque, lam-  
bellae, vesicae, utrumque, dolores hic augent,  
viscerumque hae ipso in Clinica hinc  
provenit, qui, Coarctat et crinit, cum ver-  
tigine talia, cum pedum talia, ut quidem  
hinc accedunt, debilitat, cum talia  
que crinit, ad articulos imprimi, quia ma-  
gis jam magis addunt, dolores vehementer

liberaret. Alium occupant, qui sub impio casuali delicto, cum tunc accedens spermatis omnimodum excessusque violenter cohibetur, a dimidi corporis paralyti correptus fuit.

Quod si nunc male, quotidie incrementum sumunt, obicem non ponant, febris lenta accendit, et sub pulso cili, ciliis, pomeridiana horrorem, ruborem genarum, calorem interni, urinae, colicis, nocturni, colliguntur sequuntur; hebetes hincque fruct, naderunt species ambiguae struunt, vel corpore obliquo rigescunt; tument ordemate pedes; variat ad eumque manibus, vel pedibus, vel ut videri videntur; oculi in profunda, et tunc vana orbita repulsi, caeculant; diarrhoea accedit, deciditque capilli; et qui aliam, plerumque vnam, de alia generandis operam dederunt, hi vnam vel ipso parentis sub flore ephemero aut opere effugit, aut truci violenta, vnam, quae morte calidissimum caput non, ducunt peracti, concludunt. Non raro est, epilepticum convulsivum hanc originem agnoscere, et qui sub fortioribus epilepticis altius insulibus frequentius polleant, hi citius non adeo primarios ob morbum, quam ex tale derivati per seminis perorantur.

dant, accutur. Nec fortuitos animalis hoc furore libidine effrenis excipiantur affectu et red, equos muros tutum proli, qui sibi ipsi, sub violente lumborum motu, semen elicere solent, in talem eandem incidit, ac perveras potius voluptatis deducit, membra tenemus.

§. 330. Varias ad gonorrhoeam (§§. 345. <sup>Contar.</sup> 349.) causas contribuat. Nunc etiam *debilitas, mollioritas corporis, animalis, non illa genitalium potestate, tuberculo observatur.* Gonorrhoeam hinc inde semem ex illa, sub securo, frequenter, quam sub ipso fertur, audiamus, ac vici deperitis difficiliter recuperant. *Inedia, mediocritas, ac studio profunda, morituris, non minus hoc spectant:* ut qui cibulis vacuis capistrum: *pyramis, antequam laceris lacerationibus, autem conetur, necesse pollicetur cauum nepe longe aduigant.* Sed frequentior certe ipse *verris adeo* tam ob aequum systematis universi debilitatem, quam ob genitalium laceram robur, ac morbosam constitutionem, hunc morbum inducit. *Debilitatem genitalium maiorem progeniturum nimium harum partium in eade fructuibus adimplendis executionem, utatur*

coriorum, sanguinis coagulis, ac frequen-  
tior venarum receptaculorum depletion; vel  
illa, quae incorum foraminibus cauteriis vim  
facit, ac eadem laxat, eroduntque. Hinc,  
multo obiecto destituta, et vi solius phanta-  
siae diffidit praeservanda, necesse per ma-  
nubationem capulis; — hinc soltas brevi  
temporis intervallo frequentiae, quam natura  
exponat, certatur, sub quo sanguinem inter-  
dum, loco spermatis, a viris fluidis excre-  
tam salis, deicit expulsi; — hinc semi-  
ple violenta, sub ipsa ejaculacione, ob terro-  
rem locorum recedo; — distentia voley-  
larum seminatium ab heryis vadque, tumore  
scitibae, tam proprio, tam vicine adacen-  
dis; — spermatis collectio in corpore haur  
nutrito, nec sibi cede a miculis ventris ca-  
vitate, nimia; — frequentes plenarum vey-  
cularum, sub alio ad alium deponendam for-  
dori, compensio; — equitatio diuturna ac  
incoherenda; — lapsus in perineal regionem,  
vel vulvam ostendo; — actio calculi prae-  
gressa; — frequentes urthrae, interdumque, sub  
medochocis aceto, irritatio, postulans hac spe-  
quant.

. Similitudines mercuriales hic in organo in-  
ducunt tam ex ipsa, quae pbor haurum in-  
firo-

fringunt, tum impetigis crassi verticis, pro-  
trax, vesicæ, vaginæ, ureth, ovariorum;  
æque intestinal, præputii, ac litore me-  
dianæ acutæ, spæmæ vesicæ, calculi in  
fura, vel in ipsæ vesiculis seminales hæ-  
sentes, diuresis remota, vel diarrhoea, apud  
viros, testiculi, *splendens*, imprimis cantha-  
rides; acæ quodcumque venæ admittit;  
rheumaticam, arthriticam, herpeticam, ve-  
nericam, leprosam, omnes ipsam varie ob  
causas corruptam; — vel quævis hæc in par-  
tibus phlegmæ, vel suppuratis, sub fœcula  
acæ, sicut cancrosum, venereum præstat;  
ciliæ venicæ, seminis excretionem, — ac  
semper per urethram, sed, quibus patet via  
*directa*, per loca, propeque sunt via. Sed  
vel ipsæ seminis acque frequentius excretioni  
labilis cancrum accepi hæc, ut, ad minus  
voluntatem reducere seminis vesiculas, vel pau-  
co et aquoso a semine ad acras depletiones  
facilius transmutetur. Quia sollicita magis, quam  
corporis, nutui ac vegeti, utique cordis,  
ac a vitam laetiori, ac a acra aliorum con-  
sortio sibi acris excretionis, condicio id condit;  
supra venis, in quibusdam a natura infir-  
mitatibus hominibus, pollutis nocturnis ac  
alibi causis hægit; ut venis acris

non raro ipsa conjugata in venter sit posita  
moda. Hæc ipsa vero ex genitali humore  
abundantia descendens pollutio, si diutius con-  
duret, in hæmorrhœam converti, et a curâ non  
magis in corporis detrimentum, quam disfrequen-  
tia recedit.

Sed majores vero tum universi symptomatis,  
quam genitalium ipsorum debilitate, tum sensi-  
bilitate lacrimarum morbo commixta, vel so-  
la imaginatio, vel longinquæ adeo partium non  
remota irritatio, ad mirum frequenter pedes-  
da veneream provocant. *Hydrophelia* et  
non infædum erectiones, et tum hæc diem  
triginta pollutiones, induit. Apud alios fi-  
stulas, hypochondiacas, aliis frequen-  
tius sæpius jactura est. Jam sola de rebus  
venereis cogitatio, vel papillarum ad mam-  
mas irritatio, quibusdam ex terra exquiri,  
genitalia secernere liquoris induit. Ipsa per-  
guria medicamenta, quæ in videri et uen-  
stram proprie non agunt, ab uteroque ti-  
men communis principia, erectiones faciunt.  
Temporalis ex mensali vulnere, pollutio  
hæmorrhœa occidit. Dum virgo cadaveris post  
jam puteris, non erectionem modo, sed et se-  
minis jacturam aliquando patitur. Vel sola  
jactu elixir calidiori ex aqua injectum, polli-



nam indicat. Ex medica spermatica ischell  
pallio revoca est.

§. 351. Jam ex sola, quam hic expendi-  
mus, morbi historia ( §. 349. ), quidem  
sua potestate non clare cluceat. Nulla qui-  
dem tam aperta fuit, quam temperantiae amor  
legis violavit, artes; sed multa sunt, in  
quae descendere, praescripta hic vixit brevi-  
tas, et quae mores hominum ab antiquis di-  
scere, ac talis, in omnes quasi greges,  
vidis promptus fecerunt. Tam late scilicet  
lavarum per urbes, per plures utriusque  
arvis proli abeas, educandas dicam hospi-  
tis, per longas viarum, mari terraque  
que conjuncto consortio veterum, societas,  
expansum Gensile virum, quemadmodum a  
selle Medicorum huncce nostrisque collegi  
omne non potest; ita promptus a bonis legi-  
bus ac morum disciplina certioris, quam ab  
arte saluti, auxilium expectat. Ingentis  
hoc ex ipse in quavis Republica, ob dele-  
tam in prima juventute cum utroque consedi  
petentiam, divortia, orbata probris conjugia,  
ac postquam civem laeta quampiorum re-  
petenda sunt. Quot non cyrenensis merendi  
vicia, convulsiones, epilepsiae, paralyses, he-

hereditas, amissiones, vitæ caussa, — quos non hæmoptoe, phthisis, febres lentæ ac hecticæ, — quos non leucorrhoeæ, utriusque hæmorrhagiæ, prolapsus, et hæc unica obsecro naturæ propellatur / . . . Quas mirabili aliam symptomata est, et prognostic illius fore inglorius, vel exacerbat, atque tunc facile, nunc vero difficulter ingenerat, gonorrhoea. Tristior ex status viri, cui cernens vigilanti, et potius non curio, vel facido, afficit; tristissimus, si ulcus, nec fluxus, quos naturæ non pender, aliam hinc fluxus vias speraverit. Ubi lentæ jam febri hominem aduenit, et in exhaustis a manu iacuerit, vel longam per vacuum corporibus, non spargendorum, quos, sola hinc morbo, totius, generandi impotentia, medicam viæ non omnem recusat; ac ingens, proventus, viæ unquam, — quos totius est, non facile, gonorrhoea curatur.

Cura.

§. 552. Ex ipsa causam (§. 550.) cognitione, hæc etiam in morbo, curandam putanda sunt regulæ. Vel quavis in casu, quos totius symptomatibus arduos paulo floridius lenire, ac sanguinis ad lactaria, sensibilia, genitalia afflicta augere quæmus, potius

## GONORRHOEA:      est

gravidus, urinaeque, lacrimae lacrimosa, de-  
cubitus in lecto molliori ac in dorsum, fa-  
gienda sunt. Subita et continuata coeundo a  
concohibere abstinenda praesidio non vacat. Qui  
similis veneris ac colitis, cum somno indol-  
gant, palliantur: hos ex lecto interdum de  
nocte expungendi, ac loquens, si possint, ut  
mittant, moneri oportet. Si simulam pau-  
serint, tunc lectulum quatuordecim dormiendo,  
palliationemque suo arceant. Cui sub somno  
ex parte erecto sensus effluere censeant, huius, ut  
si prius catadactyla ardeant, erigant, suspen-  
sorio et scrotum et coelocircum munita sunt.

Palliationis motumque ac similes, ex ur-  
inis, ut analogi apud feminas liquorem  
abundantia oriuntur, non aliter, ac diximus  
( §. 110. ), quam veneris calidari prodromi  
concreta tunc dormiant. Interdum vires ce-  
nae, vegetabilis, corporis exercitium ac la-  
bor, vini, et citrum, quae stimulum gyna-  
libus addant, evitare, in plethorico venae-  
secto, iacturam moderantur: vel proci re-  
mittis particulam majoris, cum auxilio, quod  
optimam la debium est priorem convertat  
valcudinem, subere si possint, libenter re-  
solvant; ac carpe, ex cetero organi simili-  
ris constructione prodens abundantius secre-

rio, a quovis artu, nisi male, modicum, ubi leges imponi fuisse debet.

Quae vero doctrinae, diutius, polidones, georrhoeae, debilitantes pro curagagantur: has vias faciles, sed multas, parvas, serpias, potiones, ex carne tincta, succosa, — cantharum, terrarum, sanctorum yuccalis non calida, cum ura, — et amygdalis, olive-  
colide, ut vocant, ex roboribus, ac paucis aliis vegetabilibus, farinosis parigendos; — potus ex frigida, cum vini generis non magna quantitate, — motus corporis, pro viribus, in aere sereno, nec frigido nimis, nec calido, conceptus, frigidum cum panis asper-  
gis fatis aromaticis iunctis, cura, genitalia ne laedat, equitatio, amica propolis cum vino coarsita, non parum moderabunt. Evacuatio hic quovis, nisi alius ut fortes rationes hanc exigant, vitanda: sed siue quae subse-  
rent, caudine, ac simulam atquanda, fluxum urinis non struere, longe tempore abstinenda sunt.

Peruicax hinc cortex cum aqua deoctor, emulsionis Arctica, et aquae diamentum per-  
dices suspendit, egregia hic praestat. *Ague*  
non minus miserabilis, ob validam in artu  
pellenda potentiam, non tale tunc apud o-

man videtur; et facile mentis alienatio cum me-  
co pomerum parva, vipe sumuli, suppletur.  
Vel et ferrum in pulvere, cum cortice cin-  
namoni ac methuro potestant, potestant.  
Spadentur incipit non raro hic cum fructu  
vel solas, vel lase seminat, potestant. Ex  
defecant, nisi obstat, hic parva expecta-  
tione anall. Adrelogentia jactat potestant,  
cum in ceteris quodlibet raris duntaxat cohi-  
bitur dicit vix, parva quoque ac nihil in  
tota se videtur utinam optant videretur:  
hervit, cum major aliquid videretur optant;  
hoc in morbo, quoniam hanc quoniam habitant mor-  
dant, debilitat occurrat, adrelogentia hanc  
man potestant, qua ipse cortex et ferrum vi-  
tute prout, lantant condant. Potestant  
hic lantant mentis frigida, dantant, lantant,  
potestant, gentilibus ipse, hanc optant, ac  
incipit adrelogentia, vel per aliquid hanc lantant,  
sed parva quantitate, in quoniam lantant,  
lantant. Apud lantant, nisi jam lantant hanc  
in parva lantant, frigida per quoniam la-  
jactant videretur est. Sub corpore non jam ex-  
tente debilitat, hanc, ac lantant lantant  
in frigida, potestant. Sed cum lantant in quoniam,  
per lantant lantant lantant, lantant.  
Aliter, hic lantant: optant a multis hanc in mor-

be laedere, reperi ob alia, videntur. Nam ratio hoc praece remedii, ob stimulum, quem prima actioe laedit, ob lascivias ineptias, quas in praedispollis praecur, non videtur quam ob vitium inertiam, quem illo evanesce relinquit, cum dantes porrigitur: sed quoadmodum in penis, sub acuta mordetur, erigitur, curatur violenta (§. 537.), sub tantum remore symptomatico (§. 539.), indiget opiam vitium praecuritur ac vitium, de quoque sub hoc morboque sensitivitate ad genitalia efform, impetis per alijures exstingida, vaginac, vel ano injectum, non minora aegrotis beneficia praestabit.

Præcoram vero Medicorum consilio, lassis, in gonorrhoea et tunc donali, una non hominis commendatur. Hoc igitur tam ad vitium, quam alia ratione, qua corpus debile et in solidum regulam potius a stomacho perfertur, imprimis cum latens acido genitalia continuat, concedi, ac domanum, et ipsis, nisi stimulat, apud viros dicendum, hoc sciet, uberibus sugi, vel mollem recentem ex capris, aut vaccis, quod magis hanc animo, tenuiori, hoc acrior, praebere comfretu potest. Si flatur, pondus ad ventriculum, ructare aliud sequatur: hoc illud capendi;

ut post sedata cum creta calcaria, et rhabarbari perisillo, turbas, iterum, cum aqua calca, vel apudana resolutam, tentari, — si vero facilis ab aegro poteri non queat, in totum seponi mereatur.

Si laetitia machinosa gonorrhoea, et calculo, fenda, tumore, ulcere cancro, agnoscat originem: nil aliud latendum Chirurgia hic offert, — nullum Medicus hic augendi consilium.

\*\*\*\*\*

## ORD. II. GEN. IV.

### *GALACTORRHOEA.*

\*\*\*\*\*

DECTHIA  
LIII. 100.

§. 343. **D**uplicem vias ducunt natura pu-  
ellae humano matrem ad pectus aperit ,  
et magna *cyti*, hanc plurimum mater, co-  
pia has vias per glandulas quodam, qui-  
visis sine ducit, in filium transmittit. Per  
longam anconem videri via alia, quam ipso  
vili in usu, hanc mactancaturigine varigia  
comperit; ac puella non magis, quam pu-  
er, via utro excludit, mactat hinc inde  
videri, videri, videri, ac tametiam utrum  
liquorem profundum. Quod si pinguis lactem,  
vel ex morbo, vel ubero matris pro-  
mota, lac utrum ducit, experientia aliquan-  
do docuerit: id et pinguis lactem utrum,  
quod videri, et mactat, quod alio, aut no-  
lum in utro gerbat, aut cui mactat dep-



*præter* lactem, ex mamma sat abunde  
 stillasset, docet eadem *præter* magis.  
 Sed ab ætate desiderio fieri necesse, in qui-  
 busdam scilicet, asportat hancque glandulam  
 ex virgine thorace amarguet, protuberant, et  
 globosam firmamque in matrem adhaeret, tat-  
 diaz utri ventrem tributum asportant.  
 Hoc tandem soluto, per ærigera vix non an-  
 nos, facilius subeundæ promptitudinem in  
 virgine, perpetuo *avæta*, viriliter conservat,  
 et cum cum utro concubum *præstare* non  
 regit, tangitur, dolens, extendit; sed et  
 sanguinem hinc lode, extrahitur per uterum,  
 donec morbo conceptum, negat, tandem ad  
 legem restituitur.

" Sed utro vix humano ac ferendo a m- in gravia,  
 mine irrita, maneat post *præter* jam  
 memem, in illis a quinto ad octavam, a se-  
 re, vel sat denso interdum a lacte, ducem  
 volumine loquens, tradatur ac dolent, vel  
 in illis, quas parum jam expertæ sunt, se-  
 cretum non raro liquorem sponte effundat.  
 Ex tunc, ubi aliter ut accidit, et vidi-  
 mus multum, ea maneat, cum gravis  
 non erit, condono, ad novum inquit conce-  
 ptum, hic matrem faciebant; quando *præ-*  
 mura vix utro conceptum, hic erat dispo-

non solvant. Quo partu vicinior est gyrtida; eo magis immutatur, et atroci humore circumdatus magis magisque angitur.

In pueris.

Exclusio lactis, namque lactuendi curam intergit: vasa prius extensa, dilatata, retrahit; coarctat, exprimit, emangit; affertum sanguinis superficiali aruit, ac minorem, rariorem hujus tumentis, diametros opponit; unde, ex-empto, qui lactiferam sub nomine vocat, conglutinatione, partemque reliquam remanente humore, tertia hora, aut quarta etiam die, magnum jam opus quodammodo absolvit, utrumque ad illum statum reuertat, quo mater partu sic preperitibus contentis operatur, reducit. Nunc hinc sanguini leges imponantur; neque sine omni cura studii, tum naturam systematis tuta, hoc opus absolvi-  
tur. In illa scilicet, cunctis visceribus liquidi per breve tempus quodammodo languet, tenuescit, pleuritidis morbo in petri percipitur; — in hoc, mater febrilis horugant: levit, et sub cute quod reperit, aut per columnam vertebalem descendens horripilatis perperam carpit; hinc acquirit calor auctus, febris accenditur, caput doluit, sinit accedit, pedum inquietudo, pleuritidis aggratur, inquietudo cum horumque turbulencia, pectoris quodam ang-

nia, dolor glandularum axillarem, brachio-  
rum movendorum difficilis, molestant mu-  
lierem: caput obesa magis tunc aurguat,  
venterque, dolens, ac vel albeceris majori  
constrictioni indulget. Sudores, nocturnum spi-  
rantem odorem, copiosius trahunt; et post unam  
alimentum diem, his moribus a natura impen-  
sam, facie demum quidquam aurgatur: aut  
rososa, macula magis, et albida, et purifor-  
mis duratur, conduransque in illis, que  
maxime parvo agendum prebent, per quie-  
dum fore diu; in illis vero, que hoc fungi  
officio aut non possunt, aut fungi, in filum  
credider, resque, per eos aliquando, et ul-  
tra, adducuntur. Hinc lympha febris, et co-  
lo mammarum tergendum, dolentium, ac la-  
tis nase auti phænomeno, *Lactem Me-*  
*dici dicunt.* Interim hanc ipsam uberrimam,  
jam prius ac febris illa accendit, lactis hu-  
more placentem affectionem, symptoma po-  
tius laborantis adhaer, velacuti quasi, ac se-  
ne deprensis utri dicitur, et statu virginitatis,  
quibus menstrua paratur, et quibus tunc obe-  
ra tangere, coarctari, dolere, ac labella in-  
terdum symptomata valentem observantes, ma-  
culare docetur. Nec enim ad solam *lactis*  
evanescens ut motus cunctis diem: cum

tralla sit, quae febris, utroque turbos sibi  
 addit, accendit. Certe, quod in gravidis ad  
 mammae aperitur, — id sine alio modo indiget  
 perficitur, secretoria est amplius, in multis ne-  
 gottum; nec sub ipsa mammarum ut magna,  
 alio indolens sub tactu vacua, inflammatio;  
 aequalis, per universum systema, symptoma-  
 ta, — quam in puerpera ut ante succidantur —  
 inducit. Quid si febris, quam lactare ve-  
 rant, majorem ad gradum accendat, neque  
 lockia restituantur; non alio in mammarum  
 angustiam, quam in uterulum (§. 246),  
 aut in puerperalem peritonitidem (§. 247),  
 illa moratur, ac utroque, vasa fidei lactare  
 sub studio, utroque modo primordia, a Me-  
 dici neglecta, in fuentem puerperae febris  
 coarctari solentur. Si major febris lactare in  
 illis esse dicatur, quae robore ac bene as-  
 trito corpore laedunt: hoc non alio ex  
 laesi copia majore, quam haec ipsa ma-  
 jor utero, — et fortiori utrius in mammae  
 actione, et ex lege stimuli interioris, repen-  
 dum est.

Utero humano a sale post partum reco-  
 mentis, per superficialem quasi phlogosin ac  
 febrilem, quam uterinam *epilepsiam* dicunt,  
 quam lactare, melleum, repurgant; et ab-

ni, modo pectore ad sugendam parata, tensionem, sensibilitatem majorem deponat, atque lactis in dies copia, albedo, dulcedo, augeatur. Manifestae prius reactione ex matricis est in utero deperendum, et afflu-  
( §. 467. ) jam maxime, efficitur; atque sub quavis papillae sensibilitate tractatione, reliquae ex parte matris in diu materiae abundantia fluxit, a sensu percipiunt. Hoc etiam beneficio, quae longae ante illis matris non dunt, aut quae ante lactare non possunt, genitrici perveniunt: sed quamvis post paucos jam dies, chyli ad mammas torrentis sub auxilio, et affluendo, periculis diverant, per longos tamen menses, vel etiam plures per annos, lactis portio aliqua in ubiibus detegitur. Quae vero mater-  
nas pectore sugendas affert vel matris, vel matris, in modo lactis succidat, aut tactus, aut organi incrementis, vitio laborat, lactis quantitatem quae proli etiam genitrici aliis diebus dabit, donec dunt, his quodammodo subigendis idonei, proruperit, nutriendi sufficiat, quotidie suppedit. Non paucas ubi-  
veritas, praeter illam, quam pectus, ad plenam usque saturationem, accipiat, lactis portionem, aliam ut magnam spem ex ubi-

alios plerumque dependunt; sunt aliae, quae, alteram jam prolem in utero gerentes, primam, saepe tunc damno illam, pluri peragones lactantur; — aliae, quae, forti sub levi coelestium, dilatare tamen filiam teneram, aliam repellere solentem, hoc, a quibus aliquando infectum, subito alteris in fauces iam ingenti charitate contritus effluunt. Nec pauci certe mures, quibus ubera primo a patre, ad mundum, vel ventrem, hauri, interdum aut multo, nunquam cessant, coarctantur, et sic per annos in amplius tam copiosa nutritio principii ex uberibus, quin modum induat, excretio continet.

SYMP-  
TOMATA.

§. 554. Sed aliter in aliis res utique succedit. Vel enim longiori tempore, quam par est, intervallo lactatio protrahatur; — vel plures auris patres diuul alendos accuset; — vel a natura, nimio labore, tumescit nutritiois defectu, jam debilis et viribus exhausta, vel acuta nimis tenera, et proprii incrementi accretione sub epe, hoc sibi vix imponat; — vel morbo distento, ac cum in plethoric pulmonalem dispositione afflata, hinc in officio societur; — vel quatuor partum nimis

mis rapide, quæ lactario acutiores, ut solet, conceptionem retinet, sequatur; — vel demum major, quam par sit, chyli, nutritivæ principii copia quoties per ubera percipiet: in quavis certe casu, lactis tantum matris corpori ex lassitate intrinsecam præparabit.

§. 333. Morbum vero ex lactis redundantia et profusione, contrahere, uti corporis naturalis atrophie, productam, *galactorrheam* vocamus.

*Notatio.*

§. 334. Lactis tamen minus hoc morbus, quam utriusque videtur, hic utitur: nec modo excessu majorem ex ubervis accedat, non, et sequenti ex lra conditione jacturam, — sed quadam lactem ex mamma, quod corpus nutritis, propriam sine virium notabili consumptione, perire hæc possit, profusam, *galactorrheam*, — illic *atrophiam*, — hic incompletam, dicimus. *Lex* tamen alia interdum ex partibus, quam per ubera papillis, profluit, nisi atrophie, nec quavis in corpore mammarum præparatione, prætere sine magno utique fundamento declarare videtur, quod generosius *galactin-*

*dicimus.*

aberae cruentam vocatur, non facile admittitur. Clyster per horas in coquina, haud multum ab indole mutatum, Acrius, frequenter nos ipsi lactantes. Sanguinem etiam forte affusa prae rubro colorem habuisse, et similem humorem, crystallini sub forma, per salivam, quibus specie viscosa, ex oculis, umbilico, aliisque ex partibus distillare. Medicorum non paucis observationes testatur. Sed quare hic est marasmi conceptus, donec in sanguinem convertatur, hoc noscitur variis, nil aliis: vix tamen ex utero effluente marasmo scire, vel ex aliqua in ceteris cum lacte similitudine, hoc conquirimus, aut latere in parte mutantis habere, cum aliqua contradictione videtur ( §. 229 ). Imprimis non exigua, galactorrhoeam vocem ferre ac ipsum diutius, affinitatem agnoscimus; ne fortiter non tam ferris ipsius, quam principii asperitatis magis, quam per est, contenta in lacte mulierem quendam, copiam, atrophiam, et moderatam licet pueri nutritione variatis, est causa. Quam alii viderunt, diutius stylium ( §. 480. ), aut flatus per ventriculum, ut vari dixerunt, in cunctis ipsa galactorrhoea haud parum conspicitur: in hoc tamquam, praeter locum originis, ducitur,



quod particulae nutritivæ ex lege naturæ providentia præstiteruntque minus pertransierant, et ex causâ plurimæ minas obstitit, citius copia naturalem excedit.

§. 553. Non dumtaxat modo feminæ, sed etiam viri, animalium classis mammalia, huic morbo subjecta esse videtur. Frequenter nascitur, ob excessum lactis, quem sub vicia coctæ præ vitiâ quotidie largiuntur, quantitatem, atrophice redduntur; ac talia sæpe videntur, quæ, in cæteris animalibus, et pabulo perculsis accitis, vel hoc solo, quod omnes ejusdem stabuli vacca; forte vitula lactis optimâ parte sapientes, ad largiendam præter naturam reducia sunt.

Galactorrhœa symptomatica ab illis, quæ tabent, ex hæmorrhâ jactura levi, quicunque aliam ( §§. 475. 483. 516. 544. 552. ) circumducit, haud diffinit. Si vera lactis redundancy hæc morbum producat: tunc nixus hic, et varietas præ aliis liquor, vel clausa potentia papillarum actione, copiose ex ubertibus pectus parvas a pectus horis effuditur sponte, ac pluvia; quæ mammae apponit mulier, lacta pectus hoc forte profusius hauriet. Vel, sub lactis acc tam insi-

gal profluvio, cum autem illis in corpore materialibus defectus nutritum potius, aut alia ex diptis ( §. 154. ) ratio præcederit, majorem famem ex quavis parvi ratione debilitantis præstat. Sub ciborum dandulo et victu majoribus macies quotidie laetescit, debilitatio a quavis corporis exercitio major, cordis palpitatio, dyspnœa, vasis tæta, facies pallida, ad genus rubella, comparet. Hæcque labels a pulsa non prodit: sed aliquantisper post moram, appetitus ciborum delectat; accedunt anxietas, symptomata nervosa, cephalata insignis, tussis incessiva, ac mœlancholia ad hanc, proelio subinde hærens, cutis levis excutitur, et dext. major, dolens artus ac dorsum, debilius quotidie augetur, quam velox succedens nocturnus gemituum mori reddit. Jam dolor thoracis, vel urini, sub tuss, dyspnœa, vel brachiorum sub motu, pectoris, — polterque duriore, æthere, vel parvi, hæmoptysis ipsa, ac plerumque affecti pulmonis indicia, spatium periclitatus, tabes aperta, colligendi sedens, vel alvi fluxus, lipochymisæ, sequuntur. Sanguinis copiose ex mammae rucalis, et liquidi sumpti ita quidquam morati ex abundant præstat, descripta ab aliis, exempla non vidimus.

§. 338. Galactorrhoea compleretur (§. 336.) causa, vel ex ipsa profusantis principii nutritivis jectura pernoctatur. Sed quid sciamus quasi abylam mulieris e sanguine ad ubera, quasi sola, perducatur: id, nisi fertiles parviavidioris, et jam nihil adoli curio illustret, non facile videamus. Nihil fertiles mammaram sensibilitas, debilitas localis, aliquid contrahit: sed covinum pluri, et terna bonas indolis, filias, hoc aequo copiosum ac pingue deducit; alias, non abnormi laetitudine, sub optimo licet pabulo, nec diuturno quidem lacte, non optimi, quantitate concessit. Nec in feminis summas id aliter procedere, sed, facilius quasi, jam, maneat hoc pabulum, aut multum incrementum videatur. Ipsa lactem matrem, proles ab uberibus accendi, aut singulas lacte proprio nutriendi, committit, in filias actionem erogat. Nullas tres partu tunc diversas inter populos, quam uberum, occurrat diversitas: et quocumque ipse ratio curritur quamplurimum hoc faciat, sentiant integritas, in quibus ubera fertiles vix multum exerceant, — alias, in quibus mammae, sub vestigio licet inique, indignam ob molem deformes hac reddant, praevident. Sed cum pinguis, lactis non plurimum ut-

cationi favore, ubi videtur: fortiter, et  
 eodemque hunc sub voluntas, non minus  
 quam ex patuli divinitate apud carer, me-  
 liorem, pro lactis copia, acutiori virtute  
 majori, tartar. regiones, quam alia, cibus  
 longior; nec omnia, que eorumque melle  
 nutritur, — sed etiam imprimis lactis, quod  
 nutritur bene, — sed Melles, has in res pa-  
 ram attenti, subterit alia, distinguunt,  
 pinguendo vel melle lacti coadunant. Inter  
 ram hinc delens, — crassior, sub melle  
 la "dix labore, matrem tartarorum lactis, —"  
 protrahunt apud laro, et novae prolio me-  
 to, sue presentis amore, lactatione, ad par-  
 ti jam loquenda accitum, effluunt, — lac-  
 ci, apud matrem portio coadunant, vel pingu-  
 res, vel diutius quam possit, filio nutritu-  
 re, cupido, pinguentia nobis ex lacti ha-  
 motis pectus celandis crassior nobis offerant,  
 Incompletas causas galactorrhoeas, modis pra-  
 sentes, pinguentia, ac nota corporis dispo-  
 sitione, interdum curis hidentur: sed frequentius  
 videmus, ut pinguis et lacte parva coadun-  
 tum magis in matris debilitate ac melior se-  
 quantur, — hinc, et alia morborum causas  
 pinguentia, alia ignorant.

§. 333. Omnia præparata, quæ ex §§. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. jam apte eligeant, conceptis, ad ea, quæ galactorrheam adnoscunt, accommodant. Nec tamen magna circa methodum hinc citatis opportunitatem dubia non poterunt: sed quia, prolem ibi uberrime quancumque remanendam esse, vel sponte concludit. Est tamen et hoc in consilio, ne tam largam secretionem precipitante suppressione, prædonaæ castitæ, et aliaque in comparando a matre alieno quantificationis, secretiones. Major quidem exhaustio nutritiis debilitat, ut illa in tabe, alimenis nutritiis principio destituta, expetere videtur: sed via talibus nullius conceptus, qui sanguinem intrauit, max per ubera chyli præcipitur; atque hinc aliquam prius remotionem hinc potest, atque largiens cibum, donec profusionem per mammae moderari poterit, conceptus secretio est. Nihilam hæc ad glandulas affluere varia insinuant: sed, ne plenis et a lacte replendis hæc mammaris induritionem admoveantur, vetat lactis concepti lactis hæc ad parietes uterique, ac in coagulum præclivitas; utque varia, ex cohibitis secretis cum lactis secretione, timenda incommoda. Videtur perpetuum, quæ parum lactis secretio, ab in-

liquorem, & lacte, matrisque tandem, va-  
porem anasitum iterum adhibuit. Jam al-  
tera die, ubi tollere, .<sup>va</sup> vel crastin die-  
ri aliam extorere, abstinereque tamen  
non, dolores atrox per tunc et ultra  
extorere, observavit. Bine uberibus prius  
ab alimento depletis, ac tempore a cibis  
sumptis magis tunc, extorere, quam chy-  
li aliterum infringat, adhibenda sunt, re-  
media. Tunc scilicet cum tepido vel spi-  
ritu matris levi, max. vero panno et je-  
ga, vel emplastro diachilo obteg, et per  
fasciam, ne pendat ex collo, firmari queret.  
Interes omni brachiorum mori a matre  
extorere, potes aliosque in die aquas in-  
miscendi; ac alia, que tunc debilitat,  
severius modeste impedit tunc. Hoc  
salus impedit, ac matris perit extorere;  
quam potu inferi culras, carboni aquo,  
ac tepido, vel lacte calido, vel ali-  
quo, ad eam quantatem, ac aliam aliam  
moveat, pariter, impedit.

Postquam sic et pariter gradatim ab ubi-  
bus remota, etiamque chyli ex ubi inge-  
rit ad matrem impedit, et lactis spontaneum  
ex ubi dependentem frangit; ad ea, que  
vires matris extorere, nutritis, extor-

bonis remedia, necnon singulaque, secundum regulas jam abbe ( §§. 473. 483. 508. 546. 552. ) expedita, succedunt. Hinc Peruvianæ imprimis cortice deoctum, infusum frigidum, mercuria medicamentosa, — sub febris vero lentius procedenda, elixir virgali, aut potus, crassus, potissimum auxilium suppeditant. A venæsectionibus, licet tunc, dyspnoea ac dolor pectorales accedant, hic parum, nisi veræ inflammationis signs compareant, abstinendum, et ad aquas sulfureas, aut similes, cum lacte rosarum, ad emulsionem Amygdæ, ad vesicantæ emplastrum loco dolenti, quæ suppurationem hic inducat, applicandas, ad optum, mortis tempus, nisi maxime hoc videri impedit, pergendum, venicolum est. Interdum generâ myrrhæ, cum oleo mandæ et cortice chinæ ( N. LXXI. ) portectum, hic proficit. Si occupamentis his pectoris symptomatibus, et tibi, et cæci, diuol subferri: nec late, nec alia quæcumque, vitam servabant remedia.

De præfatis parientis loquendi hic locus non, videri quidem potest: sed, præter illud, quod pars plurima earum, ad chirurgicæ magis forum scintillæ pertinet, aliam, præfatis præsticanda, cognitio

385 GALACTIRINOLA.

nocturnum, — in castris Natus, cum Ne-  
 bulis, violentiam solentibus, non parum,  
 quae hic de fluitibus decedat, alia in  
 loca transiret indiget.





# FORMULÆ MEDICÆ

IN §§. PRÆCEDENTIBUS CITATÆ.

\*\*\*\*\*

Nam. LIX.

*Pulvis aluminis.*

**R**ecipe Aluminis drachmam unam,  
Gummi Arabici drachmam dimid.  
Misce, hoc pulvis, dividatur in quatuor por-  
tiones æquales.

N. LX.

*Serum lactis aluminis.*

**R.** Lactis vaccini libram unam.  
Ebulliat in vase terreo, donec adda  
Aluminis drachmam unam.  
Lac coagulatum coletur per chartam expresso-  
riam.

## N. LXI.

*Tinctura cathartica.*

R. Castoreum ponticum rectum dimid;  
 Spiritus vini rectificati Ibissus unum,  
 Digere per triduum, et filtra.

## N. LXII.

*Tinctura Thalaica.*

Vid. Formul. Medic. N. XVIII. NB. per  
 errorem, verba Nq. recte indicata est.

## N. LXIII.

*Solutio opii.*

R. Opii puri grana quindocim  
 Solve in  
 Aquæ distillatæ rectæ decem.  
 Cola.

N. LXIV.

*Solutio opii catenaria.*

℞. Opii puri grana quindecten.

Solve in

Aquæ distillatæ rosæ decem; addis

Sacchari saturi grana decem.

M.

N. LXV.

*Injectio mercurialis.*

℞. Mercurii sublimati siccissimi grana unum

Solve in

Aquæ distillatæ fervidæ uncia una.

Datur pro uno interno.

N. LXVI.

*Piruliæ rosatæ.*

℞. Viridiæ albi granum unum

Solve in

Aquæ distillatæ uncia una.

Cela.

## N. LXVII.

*Lapidis caustici interioris.*

℞. Lapidis caustici Chirurgorum drachmam  
dimidiam

Solve in

Aquæ distillatæ acetis ana.

Cola per chartam expanderem.

Datur pro usu caustico.

## N. LXVIII.

*Solutio myrrhorum.*

℞. Sacchari saturi drachmam octavam

Solve in

Aquæ distillatæ acetis ana ; addo

Liquoristis myrrhorum acetis ana ;

Thurisæ Thebaicæ radium unam.

M.

## N. LXIX.

*Infusio vaginalis aluminis.*

℞. Aluminis,

Vitrioli albi, ana drachmam unam

Solve in

Aquæ distillatæ plantæ ana.

Frigida colatur per chartam.

N. LXX.

*Injunctio vaginæ maris.*

- ℞ Mucosi dulcis,  
 Gummi Arabici, ana drachmas unam,  
 Aquæ cistæ,  
 Fossis, ana uncias sem.

M.

N. LXXI.

*Mistura anodyna.*

- ℞ Myrras electæ drachmas unam,  
 Salse opendo in mortario cum  
 Intest. chamœmilæ uncia sex,  
 Aquæ cinnamonæ uncia una; addit  
 Sali maris grossæ quindiesim,  
 Symplicis corticis aurantiorum unc. sem.

ML

*Fine Lib. F.*













